$\boxed{\Gamma \vdash t \cong_{\mathrm{h}} t' \lhd A}$ Reduced terms t and t' are convertible at type A

$$\textsc{TFun}\ \frac{\Gamma \vdash A \cong A' \lhd \mathcal{U} \qquad \Gamma, x\colon A' \vdash B \cong B' \lhd \mathcal{U}}{\Gamma \vdash \Pi\, x\colon A.B \cong_{\mathrm{h}} \Pi\, x\colon A'.B' \lhd \mathcal{U}} \qquad \textsc{FunExp}\ \frac{\Gamma, x\colon A \vdash f\ x \cong f'\ x \lhd B}{\Gamma \vdash f \cong_{\mathrm{h}} f' \lhd \Pi\, x\colon A.B}$$

$$\textsc{TSucc}\ \frac{\Gamma \vdash t \cong t' \lhd \mathbb{N}}{\Gamma \vdash \mathrm{S}(t) \cong_{\mathrm{h}} \mathrm{S}(t') \lhd \mathbb{N}} \qquad \textsc{NePos}\ \frac{\mathrm{isTy}_{+}\, T \qquad \Gamma \vdash n \sim n' \rhd S}{\Gamma \vdash n \cong_{\mathrm{h}} n' \lhd T} \qquad \ldots$$

$\boxed{\Gamma \vdash t \cong t' \lhd A}$ Terms t and t' are convertible at type T

$\boxed{\Gamma \vdash t \sim_{\mathrm{h}} t' \rhd T}$ Neutrals t and t' are comparable, inferring the reduced type T

$$\textsc{TTmRed}\ \frac{T \rightsquigarrow^{\star} U \qquad t \rightsquigarrow^{\star} u \qquad t' \rightsquigarrow^{\star} u'}{\Gamma \vdash u \cong_{\mathrm{h}} u' \lhd U}{\Gamma \vdash t \cong t' \lhd T} \qquad \textsc{NRed}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim n' \rhd T \qquad T \rightsquigarrow^{\star} S}{\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd S}$$

$\boxed{\Gamma \vdash t \sim t' \rhd T}$ Neutrals t and t' are comparable, inferring the type T

$$\textsc{TVar}\ \frac{(x\colon T) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x \sim x \rhd T} \qquad \textsc{TApp}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim_{\mathrm{h}} n' \rhd \Pi\, x\colon A.B \qquad \Gamma \vdash u \cong u' \lhd A}{\Gamma \vdash n\ u \sim n'\ u' \rhd B[u]} \qquad \ldots$$