$\boxed{\Gamma \vdash n \sim n' : T}$ Neutrals n and n' are convertible at type T

$$\textsc{NConv}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim n' : T \qquad \Gamma \vdash T \cong S}{\Gamma \vdash n \sim n' : S} \qquad \textsc{NVar}\ \frac{(x : T) \in \Gamma}{\Gamma \vdash x \sim x : T}$$

$$\textsc{NApp}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim n' : \Pi\, x : A.B \qquad \Gamma \vdash u \cong u' : A}{\Gamma \vdash n\ u \sim n'\ u' : B[u]} \qquad \textsc{NSig}_1\ \frac{\Gamma \vdash n \sim n' : \Sigma\, x : A.B}{\Gamma \vdash \pi_1\ n \sim \pi_1\ n' : A}$$

$$\textsc{NSig}_2\ \frac{\Gamma \vdash n \sim n' : \Sigma\, x : A.B}{\Gamma \vdash \pi_2\ n \sim \pi_2\ n' : B[\pi_1\ n]}$$

$$\textsc{NNatElim}\ \frac{\begin{array}{c}\Gamma \vdash n \sim n' : \mathbb{N} \\ \Gamma, x : \mathbb{N} \vdash P \cong P' \qquad \Gamma \vdash b_0 \cong b_0' : P[0] \qquad \Gamma, x : \mathbb{N}, y : P[n] \vdash b_{\mathrm{S}} \cong b_{\mathrm{S}}' : P[\mathrm{S}(n)]\end{array}}{\Gamma \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{N}}(n, x.P, b_0, x.y.b_{\mathrm{S}}) \sim \mathrm{rec}_{\mathbb{N}}(n', x.P', b_0', x.y.b_{\mathrm{S}}') : P[n]}$$

$$\textsc{NEmptyElim}\ \frac{\Gamma \vdash n \sim n' : \bot \qquad \Gamma, x : \bot \vdash P \cong P'}{\Gamma \vdash \mathrm{rec}_{\bot}(n, x.P) \sim \mathrm{rec}_{\bot}(n', x.P') : P[s]}$$

$$\textsc{NIdInd}\ \frac{\begin{array}{c}\Gamma \vdash n \sim n' : \mathbb{I}\mathrm{d}(A'', a'', b'') \\ \Gamma, x : A, y : \mathbb{I}\mathrm{d}(A, a, x) \vdash P \cong P' \qquad \Gamma \vdash h \cong h' : P[a, \mathrm{refl}_{A,a}]\end{array}}{\Gamma \vdash \mathrm{rec}_{\mathbb{I}\mathrm{d}(A,a,\cdot)}(n, x.y.P, h) \sim \mathrm{rec}_{\mathbb{I}\mathrm{d}(A',a',\cdot)}(n', x.y.P', h') : P[b'']}$$