
M, - , -
N, - , -
V, - , s_l
V', - , -
ret(F)
◊ , - , s_l
◊ , - , -
ret(0)
$s_l = \{l \mapsto 0\}$
call(F,α_1)
E = [-]; !l
E'= [-]; 0
$V\alpha_1$, - , s_l
$V'\alpha_1$, - , -
α_1(); !l , - , s_l
α_1(); 0 , - , -
call(α_1,())
E , - , s_l
E', - , -
ret(())
(); !l , - , s_l
(); 0 , - , -
call(F,α_2)
ret(0)
$V\alpha_2$, E, s_l
$V'\alpha_2$, E', -
α_2(); !l , E, s_l
α_2(); 0 , E', -
call(α_2,())
E , E, s_l
E', E', -
ret(())
(); !l , E, s_l
(); 0 , E', -
call(F,α_3)
ret(0)
$V\alpha_3$, E ::E, s_l
$V'\alpha_3$, E'::E', -
call(α_3,())
E , E::E, s_l
E', E'::E', -
ret(())
(); !l , E::E, s_l
(); 0 , E'::E', -
call(F,α_4)
•••
call/ret : proponent calls/returns
call/ret : opponent calls/returns
M, -
N, -
Σ_0, ◊
V, s_l
V', -
Σ_0, ◊
ret(F)
◊ , s_l
◊ , -
Σ_0, ◊
ret(0)
ret(0)
call(F,α_1)
$V\alpha_1$, s_l
$V'\alpha_1$, -
Σ_1, β_1
α_1(); !l , s_l
α_1(); 0 , -
Σ_1, β_1
call(α_1,())
E , s_l
E' , -
Σ_1, β_1
ret(())
(); !l , s_l
(); 0 , -
Σ_1, β_1
$\Sigma_1 = \Sigma_\diamond[\beta_1 \xrightarrow{\diamond,\diamond} \diamond]$, $\beta_1 = \ulcorner V\alpha_1, s_l, V'\alpha_1, - \urcorner$
call(F,α_2)
$V\alpha_2$, s_l
$V'\alpha_2$, -
Σ_2, β_2
α_2(); !l , s_l
α_2(); 0 , -
Σ_2, β_2
call(α_2,())
E , s_l
E' , -
Σ_2, β_2
ret(0)
ret(())
(); !l , s_l
(); 0 , -
Σ_2, β_2
$\Sigma_2 = \Sigma_1[\beta_2 \xrightarrow{E,E'} \beta_1]$, $\beta_2 = \ulcorner V\alpha_2, s_l, V'\alpha_2, - \urcorner$
call(F,α_2*)