| $(X, \gamma)$ | $\lvert X\rvert$ | Time (s) | | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| | | non-local algorithm | local algorithm | |
| $S^1$<br>$\gamma_1 = -\text{height}$<br>$\gamma_2 = \text{height}$ | 500 | 1.76 | 1.88 | 0.93 |
| | 1000 | 8.10 | 8.61 | 0.94 |
| | 2000 | 37.64 | 39.72 | 0.95 |
| | 4000 | 174.58 | 181.88 | 0.96 |
| $[0,1]^3$<br>$\gamma_1 = \text{random}$<br>$\gamma_2 = \text{random}$ | 500 | 13.83 | 4.13 | 3.35 |
| | 1000 | 56.01 | 11.36 | 4.93 |
| | 2000 | 226.25 | 29.61 | 7.64 |
| | 4000 | 962.79 | 70.97 | 13.57 |
| $S^1 \times S^1$<br>$\gamma_1 = \text{density}$<br>$\gamma_2 = \text{random}$ | 500 | 18.43 | 5.45 | 3.38 |
| | 1000 | 82.00 | 16.79 | 4.88 |
| | 2000 | 340.38 | 44.98 | 7.57 |
| | 4000 | 1416.12 | 124.28 | 11.39 |