$$\frac{P \vee Q \,\langle \boldsymbol{a} \,|\, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta} \rangle\, R}{Q \vee P \,\langle \lambda c.\tilde{\boldsymbol{a}}\bar{c} \,|\, \lambda c.\tilde{\boldsymbol{\beta}}\bar{c}, \lambda c.\tilde{\boldsymbol{\alpha}}\bar{c} \rangle\, R}\; {}^{p\vee'_L} \qquad \frac{P \,\langle \boldsymbol{a} \,|\, \boldsymbol{\alpha} \rangle\, Q}{P \,\langle \lambda \boldsymbol{x}.0, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b} \,|\, \boldsymbol{\alpha}_\pi \rangle\, Q \vee R}\; {}^{\vee'_R}$$

$$\frac{P \,\langle \boldsymbol{a} \,|\, \boldsymbol{\alpha} \rangle\, R \quad Q \,\langle \boldsymbol{b} \,|\, \boldsymbol{\beta} \rangle\, R}{P \vee Q \,\langle \lambda c, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}.\mathtt{if}(c = 0, \boldsymbol{a}\boldsymbol{x}, \boldsymbol{b}\boldsymbol{y}) \,|\, \alpha_\pi, \beta_\pi \rangle\, R}\; {}^{cond'_L}$$