

Семинарский лист 4

Александр Богданов
[Telegram](#)

Алиса Вернигор
[Telegram](#)

Анастасия Григорьева
[Telegram](#)

Василий Шныпко
[Telegram](#)

Денис Козлов
[Telegram](#)

Елизавета Орешонок
[Telegram](#)

Иван Пешехонов
[Telegram](#)

Иван Добросовестнов
[Telegram](#)

Настя Городилова
[Telegram](#)

Никита Насонков
[Telegram](#)

Версия от 01.10.2020 12:06

Вычислите бесконечное произведение как предел частичного

Задача 1

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$$

$$\prod_{n=2}^N \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \prod_{n=2}^N \frac{n^2 - 1}{n^2} = \prod_{n=2}^N \frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \cdot \dots \cdot \frac{(N-1) \cdot (N+1)}{N \cdot N} = \frac{N+1}{2N} \rightarrow \frac{1}{2}$$

Задача 2

$$\prod_{n=1}^{\infty} e^{\frac{(-1)^n}{n}}$$

$$\prod_{n=1}^N e^{\frac{(-1)^n}{n}} = e^{\sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n}} = \diamond$$

$$\ln n + \gamma + o(1) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \implies \frac{1}{2} (\ln n + \gamma + o(1)) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n} - \text{чётные члены суммы} \sum_{n=1}^N \frac{(-1)^n}{n}$$

$$\ln(2n+1) + \gamma + o(1) = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2n+1} \implies (\ln(2n+1) + \gamma + o(1)) - \frac{1}{2} (\ln n + \gamma + o(1)) =$$

$$= 1 + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2n+1} - \text{нечётные члены суммы} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}$$

$$\diamond = e^{\frac{1}{2}(\ln n + \gamma + o(1)) - (\ln(2n+1) + \gamma + o(1)) - \frac{1}{2}(\ln n + \gamma + o(1))} = e^{\frac{1}{2} \ln n + \frac{1}{2} \gamma + o(1) - \ln(2n+1) - \gamma + o(1) + \frac{1}{2} \ln n + \frac{1}{2} \gamma + o(1)} = e^{\ln n - \ln(2n+1) + o(1)} =$$
$$= e^{\ln \frac{n}{2n+1} + o(1)} \rightarrow e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

Исследуйте бесконечное произведение на сходимость

Задача 4

Формулы Тейлора:

$$(1+x)^a \sim 1+x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+3}}$$

$$\prod_{n=1}^N \frac{n}{\sqrt{n^2+3}} = e^{\ln \prod_{n=1}^N \frac{n}{\sqrt{n^2+3}}} = e^{\sum_{n=1}^N \ln \frac{n}{\sqrt{n^2+3}}}; \quad a_n = \ln \frac{n}{\sqrt{n^2+3}} = \ln \left[\left(1 + \frac{3}{n^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \right] \sim \ln \left(1 - \frac{3}{2n^2}\right) \sim -\frac{3}{2n^2} \Rightarrow$$

\Rightarrow ряд сходится.

Исследуйте бесконечное произведение на сходимость и абсолютную сходимость

Задача 7

$$\prod_{n=1}^{\infty} n^{\frac{(-1)^n}{n}} = e^{\sum_{n=1}^{\infty} \ln n^{\frac{(-1)^n}{n}}}; \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n} \Rightarrow a_n = \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0;$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \Rightarrow f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{x^2} < 0 \Rightarrow \text{монотонно убывает} \Rightarrow \text{ряд сходится по Лейбницу}$$

$$|a_n| = \left| \frac{(-1)^n \ln n}{n} \right| \geq \frac{\ln 2}{n} \Rightarrow \text{ряд расходится абсолютно.}$$

Исследуйте функциональную последовательность f_n на равномерную сходимость к поточечному пределу f на множестве D , оценивая $\|f_n - f\|$.

Задача 10

$$f_n(x) = \sin \frac{x}{n}, \quad D = [-1, 1]$$

$$f_n(x) = \sin \frac{x}{n} \rightarrow \sin 0 = 0 \Rightarrow f \equiv 0$$

$$\sup_D \left\| \sin \frac{x}{n} \right\| = \sin \frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow \text{равномерная сходимость.}$$

Задача 11

$$f_n(x) = x^n - x^{2n}, \quad D = [0, 1]$$

$$f_n(x) = x^n - x^{2n} \rightarrow 0 \implies f \equiv 0$$

$$\sup_D \|x^n - x^{2n}\| = \diamond$$

$$f'_n(x) = (x^n - x^{2n})' = nx^{n-1} - 2nx^{2n-1} = nx^{n-1}(1 - 2x^n) = 0$$

$$\text{Критические точки: } x = 0, f_n(x) = 0; \quad x = \sqrt[n]{\frac{1}{2}}, f_n(x) = \frac{1}{4}; \quad x = 1, f_n(x) = 0;$$

$$\diamond = \frac{1}{4} \neq 0 \implies \text{отсутствие равномерной сходимости.}$$

Задача 15

$$f_n(x) = n \sin \frac{1}{nx}, \quad D = (0, 3]$$

$$\frac{1}{nx} \rightarrow 0 \implies \sin \frac{1}{nx} \sim \frac{1}{nx} \implies f_n(x) \sim \frac{1}{x} \implies f(x) = \frac{1}{x}$$

Расширим D до компакта: $D = [0, 3]$

$$\sup_D \left\| n \sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right\|$$

$$\text{Возьмём последовательность аргументов } x_n = \frac{1}{n} \in D. \text{ Тогда } \sup_D \left\| n \sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right\| \geq \sup_D \|n \sin 1 - n\| \rightarrow +\infty \implies$$

\implies Отсутствует равномерная сходимость.

Докажите равномерную сходимость функциональной последовательности на заданном множестве, применяя теорему Дини (о монотонной сходимости)

Теорема Дини: Если $f_n \rightarrow f$ на множестве одновременно выполнены следующие условия:

1. D — компакт
2. f_n — монотонна
3. f_n — непрерывна
4. f — непрерывна

тогда f_n равномерно сходится к f .

Задача 16

$$f_n = \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n, \quad D = [1, 2]$$

$$\begin{cases} f_n - \text{непрерывна, монотонна} \\ D = [1, 2] - \text{компакт} \\ f_n \rightarrow f(x) = e^x - \text{непрерывна} \end{cases} \implies f_n \text{ равномерно сходится к } f \text{ по Т. Дини.}$$

Задача 17

$$f_n = nx^2 e^{-nx}, \quad D = [1, +\infty)$$

Расширим D до компакта: $D' = [1, +\infty]$

$$f'_n = 2nx \cdot e^{-nx} + nx^2(-n) \cdot e^{-nx} = nxe^{-nx}(2 - nx) = 0 \implies \text{при } n \geq 2, \quad x \geq \frac{2}{n}, \quad f'_n \leq 0 \implies f_n - \text{монотонна.}$$

$$\begin{cases} f_n - \text{монотонна} \\ f_n - \text{непрерывна} \\ f_n \rightarrow 0 - \text{непрерывна} \\ D' = [1, +\infty] - \text{компакт} \end{cases} \implies f_n \text{ равномерно сходится к } f \text{ по Т. Дини.}$$

Докажите неравномерную сходимость функциональной последовательности на заданном множестве, используя локализацию особенности.

Теорема: Если f_n непрерывна, и на множестве D равномерно сходится к f , то f — непрерывна.

Задача 20

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + nx}, \quad D = [0, 1]$$

$$f_n(x) = \frac{1}{1 + nx} \rightarrow f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases} \implies \text{т.к. } f \text{ разрывна в } 0, \text{ то равномерная сходимость отсутствует.}$$

Задача 24

$$f_n(x) = \frac{n^2}{4 + n^2 x^2}, \quad D = (0, +\infty)$$

Добавим точку 0 в D : $D = [0, +\infty)$

$$f_n(x) = \frac{n^2}{4 + n^2 x^2} \rightarrow f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ +\infty, & x = 0 \end{cases} \implies \text{т.к. } f \text{ разрывна в } 0, \text{ то равномерная сходимость отсутствует.}$$