Семинарский лист 4

Василий Шныпко Александр Богданов Алиса Вернигор Анастасия Григорьева Telegram Telegram Telegram Telegram Денис Козлов Елизавета Орешонок Иван Пешехонов Иван Добросовестнов Telegram Telegram Telegram Telegram Настя Городилова Никита Насонков Telegram Telegram

Версия от 02.10.2020 10:33

Вычислите бесконечное произведение как предел частичного

Задача 1

$$\prod_{n=2}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\prod_{n=2}^{N} \left(1 - \frac{1}{n^2} \right) = \prod_{n=2}^{N} \frac{n^2 - 1}{n^2} = \prod_{n=2}^{N} \frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n} = \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4} \cdot \dots \cdot \frac{(N-1) \cdot (N+1)}{N \cdot N} = \frac{N+1}{2N} \to \frac{1}{2N}$$

Задача 2

$$\begin{split} &\prod_{n=1}^{\infty} e^{\frac{(-1)^n}{n}} \\ &\prod_{n=1}^{N} e^{\frac{(-1)^n}{n}} = e^{\sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^n}{n}} = \diamondsuit \\ &\ln n + \gamma + o(1) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} \implies \frac{1}{2} \left(\ln n + \gamma + o(1)\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \ldots + \frac{1}{2n} - \text{чётные члены суммы} \sum_{n=1}^{N} \frac{(-1)^n}{n} \\ &\ln(2n+1) + \gamma + o(1) = 1 + \frac{1}{2} + \ldots + \frac{1}{2n+1} \implies \left(\ln(2n+1) + \gamma + o(1)\right) - \frac{1}{2} \left(\ln n + \gamma + o(1)\right) = \\ &= 1 + \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{2n+1} - \text{нечётные члены суммы} \sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n} \\ &\diamondsuit = e^{\frac{1}{2} (\ln n + \gamma + o(1)) - (\ln(2n+1) + \gamma + o(1)) - \frac{1}{2} (\ln n + \gamma + o(1))} = e^{\frac{1}{2} \ln n + \frac{1}{2} \gamma + o(1) - \ln(2n+1) - \gamma + o(1) + \frac{1}{2} \ln n + \frac{1}{2} \gamma + o(1)} = e^{\ln n - \ln(2n+1) + o(1)} = \\ &= e^{\ln \frac{n}{2n+1} + o(1)} \to e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \end{split}$$

Задача 3

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n}$$

Найдем частичное произведение:

$$\prod_{n=1}^{N} \cos \frac{x}{2^n} = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{4} \cdot \dots \cdot \frac{x}{2^N}$$

$$\sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = 4\sin\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}\cos\frac{x}{2} = \dots = 2^k\sin\frac{x}{2^k}\prod_{k=1}^k\cos\frac{x}{2^m} \iff$$

$$\Leftrightarrow \prod_{m=1}^k \cos \frac{x}{2^m} = \frac{\sin x}{2^k \sin \frac{x}{2^k}} \Rightarrow \prod_{n=1}^N \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{2^N \sin \frac{x}{2^N}}$$

Бесконечное произведение как предел частичного:

$$\prod_{n=1}^{\infty}\cos\frac{x}{2^n}=\lim_{N\to\infty}\frac{\sin x}{2^N\sin\frac{x}{2^N}}=\sin x\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2^N\frac{x}{2^N}}=\frac{\sin x}{x}$$

Otbet:
$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos \frac{x}{2^n} = \frac{\sin x}{x}.$$

Исследуйте бесконечное произведение на сходимость

Задача 4

Формулы Тейлора:

$$(1+x)^a \sim 1+x$$
$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\prod_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+3}}$$

$$\prod_{n=1}^{N} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 3}} = e^{\ln \prod_{n=1}^{N} \frac{n}{\sqrt{n^2 + 3}}} = e^{\sum_{n=1}^{N} \ln \frac{n}{\sqrt{n^2 + 3}}}; \qquad a_n = \ln \frac{n}{\sqrt{n^2 + 3}} = \ln \left[\left(1 + \frac{3}{n^2} \right)^{-\frac{1}{2}} \right] \sim \ln \left(1 - \frac{3}{2n^2} \right) \sim -\frac{3}{2n^2} \implies 0$$

⇒ ряд сходится.

Задача 5

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(2 - \sqrt[n]{n}\right)$$

$$\prod_{n=1}^{N} \left(2 - \sqrt[n]{n}\right) = e^{\ln \prod_{n=1}^{N} \left(2 - \sqrt[n]{n}\right)} = e^{\sum_{n=1}^{N} \ln\left(2 - \sqrt[n]{n}\right)}$$

$$a_n = \ln\left(2 - \sqrt[n]{n}\right) = \ln\left(1 + \left(1 - \sqrt[n]{n}\right)\right) \sim \left(1 - \sqrt[n]{n}\right) = -\left(e^{\frac{\ln n}{n}} - 1\right);$$
нет, ребята, это жестко,

$$\implies \text{ но ряд расходится к } 0$$

⇒ но ряд расходится к 0

Задача 6

$$\prod_{n=1}^{\infty} \cos\left(\operatorname{arcctg} n\right)$$

$$\cos\left(\operatorname{arcctg} n\right) = \operatorname{ctg}\left(\operatorname{arcctg} n\right) \sin\left(\operatorname{arcctg} n\right) = n\sqrt{1-\cos\left(\operatorname{arcctg} n\right)} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \cos\left(\operatorname{arcctg} n\right) = \frac{n}{\sqrt{1+n^2}}$$

$$\prod_{n=1}^{N} \cos\left(\operatorname{arcctg} n\right) = \prod_{n=1}^{N} \frac{n}{\sqrt{1+n^2}} = e^{\ln \prod_{n=1}^{N} \frac{n}{\sqrt{1+n^2}}} = e^{\sum_{n=1}^{N} \ln \frac{n}{\sqrt{1+n^2}}}$$

$$a_n = \ln \frac{n}{\sqrt{1+n^2}} = \frac{1}{2} \ln \left(1 - \frac{1}{1+n^2}\right) \sim -\frac{1}{2(1+n^2)} \to 0 \text{ при } n \to \infty$$

Исследуйте бесконечное произведение на сходимость и абсолютную сходимость

Задача 7

$$\prod_{n=1}^{\infty} n^{\frac{(-1)^n}{n}} = e^{\sum_{n=1}^{\infty} \ln n^{\frac{(-1)^n}{n}}}; \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n} \implies a_n = \frac{\ln n}{n} \to 0;$$

$$f(x) = \frac{\ln x}{x} \implies f'(x) = -\frac{\ln x - 1}{x^2} < 0 \implies \text{ монотонно убывает } \implies \text{ ряд сходится по Лейбницу}$$

$$|a_n| = \left| \frac{(-1)^n \ln n}{n} \right| \geqslant \frac{\ln 2}{n} \implies \text{ряд расходится абсолютно}.$$

Исследуйте функциональную последовательность f_n на равномерную сходимость к поточечному пределу f на множестве D, оценивая $\|f_n - f\|$.

Задача 10

$$f_n(x)=\sin\frac{x}{n}, \quad D=[-1,1]$$

$$f_n(x)=\sin\frac{x}{n}\to\sin0=0 \implies f\equiv0$$

$$\sup_{D}\left\|\sin\frac{x}{n}\right\|=\sin\frac{1}{n}\to0 \implies \text{ равномерная сходимость.}$$

Задача 11

$$f_n(x)=x^n-x^{2n},\quad D=[0,1]$$

$$f_n(x)=x^n-x^{2n}\to 0\implies f\equiv 0$$

$$\sup_D \left\|x^n-x^{2n}\right\|=\Diamond$$

$$f'_n(x)=(x^n-x^{2n})'=nx^{n-1}-2nx^{2n-1}=nx^{n-1}(1-2x^n)=0$$
 Критические точки: $x=0, f_n(x)=0; \quad x=\sqrt[n]{\frac{1}{2}}, f_n(x)=\frac{1}{4}; \quad x=1, f_n(x)=0;$ $\Diamond=\frac{1}{4}\neq 0\implies$ отсутствие равномерной сходимости.

Задача 15

$$f_n(x)=n\sim rac{1}{nx},\;\;D=(0,3]$$

$$rac{1}{nx} o 0\implies \sinrac{1}{nx}\simrac{1}{nx}\implies f_n(x)\simrac{1}{x}\implies f(x)=rac{1}{x}$$
 Расширим D до компакта: $D=[0,3]$

$$\sup_{D} \left\| n \sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right\|$$

Возьмём последовательность аргументов $x_n = \frac{1}{n} \in D$. Тогда $\sup_{D} \left\| n \sin \frac{1}{nx} - \frac{1}{x} \right\| \geqslant \sup_{D} \|n \sin 1 - n\| \to +\infty \implies 0$

⇒ Отсутствует равномерная сходимость.

Докажите равномерную сходимость функциональной последовательности на заданном множестве, применяя теорему Дини (о монотонной сходимости)

Теорема Дини: Если $f_n \to f$ на множестве одновременно выполнены следующие условия:

- 1. D -компакт
- 2. f_n монотонна
- 3. f_n непрерывна
- 4. f непрерывна

тогда f_n равномерно сходится к f.

Задача 16

$$f_n=\left(1+rac{x}{n}
ight)^n,\;\;D=[1,2]$$

$$\begin{cases} f_n-\text{ непрерывна, монотонна} \\ D=[1,2]-\text{ компакт} \\ f_n o f(x)=e^x-\text{ непрерывна} \end{cases} \implies f_n\; \text{равномерно сходится к }f\; \text{по Т. Дини.}$$

Задача 17

$$f_n = nx^2e^{-nx}, \quad D = [1, +\infty)$$
 Расширим D до компакта: $D' = [1, +\infty]$
$$f'_n = 2nx \cdot e^{-nx} + nx^2(-n) \cdot e^{-nx} = nxe^{-nx}(2-nx) = 0 \implies \text{при } n \geqslant 2, \quad x \geqslant \frac{2}{n}, \quad f'_n \leqslant 0 \implies f_n - \text{монотонна}.$$

$$\begin{cases} f_n - \text{монотонна} \\ f_n - \text{непрерывна} \\ f_n \to 0 - \text{непрерывна} \\ D' = [1, +\infty] - \text{компакт} \end{cases} \implies f_n \text{ равномерно сходится к } f \text{ по Т. Дини.}$$

Докажите неравномерную сходимость функциональной последовательности на заданном множестве, используя локализацию особенности.

Теорема: Если f_n непрерывна, и на множестве D равномерно сходится к f, то f — непрерывна.

Задача 20

$$f_n(x) = \frac{1}{1+nx}, D = [0,1]$$

$$f_n(x)=rac{1}{1+nx} o f(x)= egin{cases} 1, & x=0 \ 0, & x
eq 0 \end{cases}$$
 т.к. f разрывна в 0 , то равномерная сходимость отсутствует.

Задача 24

$$f_n(x) = \frac{n^2}{4 + n^2 x^2}, \quad D = (0, +\infty)$$

Добавим точку 0 в $D \colon D = [0, +\infty)$

$$f_n(x)=rac{n^2}{4+n^2x^2} o f(x)=egin{cases} rac{1}{x^2}, & x
eq 0 \ +\infty, & x=0 \end{cases}$$
 т.к. f разрывна в 0 , то равномерная сходимость отсутствует.