

Anhang D. YUCT BIOLOGISCHE VORHERSAGEN

Vollständig wiederhergestellte Ausgabe mit umfassenden Datentabellen,
erweiterter empirischer Validierung und expliziten Verknüpfungen zu
BCLM/BCLM-EC

Alexey V. Yakushev
Yakushev Research
<https://yuct.org/>
<https://ypsdc.com/>

März 2026
Version 3.2 (Wiederhergestellte Tabellen & vollständige Integration)

Zusammenfassung

Dieser Anhang präsentiert testbare biologische Vorhersagen, die aus der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) abgeleitet und nun vollständig mit dem Biological Coordination Lagrangian (Anhang BCLM) und den BCLM Coordination Clocks (Anhang BCLM-EC) integriert sind. Wir zeigen, dass die halbzahlige Quantisierung der Fermionmassen (Anhang Y) und das Skalierungsquant $q = (3/2)^{1/3}$ auf lebende Systeme übertragbar sind und Proteinkomplexe, Viren, Bakterien und ganze Zellen auf dasselbe Koordinatengitter wie Elementarteilchen setzen. Das universelle Fehlergesetz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-0.67}$ bestimmt Mutationsraten (68 Wirbeltierarten, $R^2 = 0.91$), metabolische Skalierung (1016 Pflanzenbeobachtungen, Exponent 0.68 ± 0.04), neuronale Synchronisation, somatische Mutationsanhäufung, epigenetische Uhren, Kalorienrestriktion, Quorum Sensing und Proteinfaltungskinetik. Die kombinierte statistische Signifikanz übersteigt $p < 10^{-18}$. Alle zuvor validierten Datentabellen sind wiederhergestellt und mit dem mathematischen Rahmen verknüpft. Die Große Vereinheitlichte Koordinationsleiter zeigt alle bekannten stabilen Objekte auf einer einzigen Linie mit der Steigung $\ln q$. Explizite Querverweise auf BCLM (Codon-, Aminosäure-, Enzymeffizienzen) und BCLM-EC (methylierungsbasierte Koordinationsuhren) belegen die vollständige Konsistenz des biologischen Sektors von YUCT.

Schlüsselwörter: YUCT, Koordinationstiefe, Massenleiter, halbzahlige Quantisierung, Fermionmassen, biologische Skalierung, Stoffwechselrate, Mutationsrate, neuronale Synchronisation, somatische Mutationen, epigenetische Uhren, Kalorienrestriktion, Quorum Sensing, Proteinfaltung, universelle Leiter, falsifizierbare Vorhersagen.

Zitierweise: Yakushev AV. Anhang D. YUCT Biologische Vorhersagen mit integrierten physikalischen Grundlagen (Wiederhergestellte Tabellen). 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (dieser Band).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Grundprinzipien	3
1.2	Retrospektiver Validierungsansatz	3

2	Die universelle Massenleiter und ihre physikalische Basis	4
2.1	Herleitung des Skalierungsquants	4
2.2	Erweiterung auf Kerne und biologische Makromoleküle	4
2.3	Große Vereinheitlichte Koordinationsleiter	4
3	Hypothese 1: Mutationsraten und DNA-Reparatureffizienz	5
3.1	Mathematische Formulierung	5
3.2	Keimbahnmutationen: 68 Wirbeltierarten	5
3.3	Somatische Mutationen und Krebsgenomik	6
3.4	Epigenetische Drift als Koordinationszerfall	6
4	Hypothese 2: Metabolische Skalierung und Allometrie	6
4.1	Mathematische Formulierung	6
4.2	Retrospektive Analyse: 1016 Pflanzenwurzelbeobachtungen	6
4.3	Taxonübergreifende Validierung und mitochondriale Skalierung	6
4.4	Temperaturabhängige metabolische Skalierung	6
5	Hypothese 3: Neuronale Synchronisation und Lernen	6
5.1	Mathematische Formulierung	6
5.2	Retrospektive Analyse: Kultivierte neuronale Netze	7
5.3	Kritikalität und psychedelisch induzierte Plastizität	7
6	Metabolische Skalierung, Kalorienrestriktion und Langlebigkeit	7
7	Universalität über Skalen hinweg: Isomorphismus physikalischer und biologischer Hierarchien	7
8	Quorum Sensing und kollektive bakterielle Koordination	7
9	Synthetische Biologie: Die Minimalzelle und die Massenleiter	7
10	Proteinfaltungskinetik	8
11	Konsistenz mit dem BCLM-Rahmen	8
12	Kombinierte statistische Signifikanz unabhängiger Tests	8
13	Falsifizierbare Vorhersagen	8
13.1	Keimbahnmutationsrate	9
13.2	Somatische Mutationslast und Krebsrisiko	9
13.3	Metabolischer Skalierungsexponent	9
13.4	Mitochondrialer Protonenfluss	9
13.5	Neuronales Training und K_{eff} -Zunahme	9
13.6	Epigenetische Uhrenrate und Kalorienrestriktion	9
13.7	Quorum-Sensing-Schwelle	10
13.8	Synthetische Zellviabilität und Massenquantisierung	10
13.9	Proteinfaltungskinetik	10
13.10	Heuristische Supergeneralisierung (YUCT-HG)	10
14	Fazit	10

1 Einleitung

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) postuliert, dass alle stabilen Strukturen in der Natur – von Quarks bis zu Galaxien – durch ein universelles Koordinationsprinzip organisiert sind. In ihrem Kern liegt die algebraische Schleife $S_{\text{odd}} = 6/5$, $S_{\text{even}} = 4/5$, die das fundamentale Verhältnis $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ und den Fehlerexponenten $\beta = 2/3$ liefert. Das universelle Fehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\kappa_c = 1/3$ wurde über mehr als 50 Größenordnungen in Energie und Länge verifiziert (Anhang L).

Eine Schlüsselvorhersage ist, dass alle Massen in halbzahligen Schritten des Skalierungsquants $q = (3/2)^{1/3}$ quantisiert sind. Dasselbe Quant, das die Massen aller geladenen Leptonen und Quarks mit einer Genauigkeit von unter einem Prozent reproduziert (Anhang Y), bestimmt auch die Massen von Proteinkomplexen, Ribosomen und ganzen Zellen. In dieser vollständig wiederhergestellten Ausgabe verbinden wir explizit die biologische Skalierung mit den physikalischen Grundlagen der YUCT und verweisen auf die Kernmassensystematik (Anhang Y), die kosmologischen Implikationen (Anhang Ω) sowie den neu eingeführten Biological Coordination Lagrangian (BCLM, Anhang BCLM) zusammen mit der BCLM Epigenetic Clock (BCLM-EC, Anhang BCLM-EC). Wir präsentieren auch eine einheitliche Visualisierung – die Große Vereinheitlichte Koordinationsleiter –, die alle bekannten stabilen Objekte vom Elektron bis zum ausgewachsenen Baum auf einer einzigen starren Linie mit der Steigung $\ln q$ zeigt.

Darüber hinaus enthält das Dokument nun umfangreiche Datentabellen, die in früheren Versionen vorhanden waren, aber im vorherigen Entwurf versehentlich weggelassen wurden. Diese Tabellen zeigen die ursprünglichen empirischen Daten (Mutationsraten, metabolische Skalierung, neuronale Synchronisation usw.) zusammen mit ihren aus der YUCT abgeleiteten Größen. Die Übereinstimmung zwischen diesen Daten und der Theorie ist ausgezeichnet und wird statistisch quantifiziert.

1.1 Grundprinzipien

1. **Wörterbuchbasierte Koordination:** Biologische Moleküle erben vorcodierte Koordinationsprotokolle (Wörterbücher), die durch Evolution etabliert wurden.
2. **Resonanzverstärkung:** Molekulare Systeme zeigen resonante Verstärkung ($R > 1$), wenn ihre Massenverhältnisse sich Potenzen von $3/2$ nähern.
3. **Skalierbare Effizienz:** Die Koordinationseffizienz K_{eff} bestimmt Fehlerraten, Stoffwechselintensität und Lebensdauer.
4. **Universelle Massenleiter:** Die Masse jeder stabilen koordinierten Entität ist auf diskrete Sprossen der Leiter $m = m_e q^{N_f}$ beschränkt, wobei N_f ganz- oder halbzahlig ist.

1.2 Retrospektiver Validierungsansatz

Wir validieren Vorhersagen anhand öffentlich zugänglicher Daten:

- **Mutationsraten:** Keimbahnmutationen über 68 Wirbeltierarten (Bergeron et al. 2023) [1].
- **Metabolische Skalierung:** Globale Pflanzenwurzelndatenbank (1016 Beobachtungen) [2].
- **Neuronale Synchronisation:** Trainingsdaten kultivierter neuronaler Netze [5].
- **Proteinfaltung:** K-Pro-Datenbank (1529 Datensätze) [3].
- **Somatische Mutationen:** PCAWG-Konsortium [18].
- **Epigenetische Uhren:** Horvath (2013) & Lu et al. (2023) [20, 21].
- **Kalorienrestriktion:** CALERIE-Studie [16, 17].
- **Synthetische Zellen:** JCVI-syn3.0 [29, 30].
- **Quorum Sensing:** Miller & Bassler (2001) [26], Papenfort & Bassler (2016) [27].

2 Die universelle Massenleiter und ihre physikalische Basis

2.1 Herleitung des Skalierungsquants

Das universelle Fehlergesetz folgt aus der fraktalen Dimension der Koordinationstrajektorien (Anhang Y). Die Summation geometrischer Reihen über ungerade und gerade Koordinationsschichten ergibt

$$S_{\text{odd}} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{6}{5}, \quad S_{\text{even}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4}{5},$$

mit $\beta = 2/3$. Das Verhältnis $3/2 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ ist der fundamentale Massenschritt zwischen aufeinanderfolgenden Koordinationsschichten. Da die drei räumlichen Dimensionen Fehler multiplikativ kombinieren, ist der elementare Schritt auf der logarithmischen Massenskala die Kubikwurzel: $q = (3/2)^{1/3}$. Folglich ist die Masse jedes stabilen Objekts auf die diskrete Menge

$$m = m_e \cdot q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (1)$$

beschränkt, wobei m_e die Elektronmasse ist. Diese Vorhersage ist parameterfrei; die einzigen Eingaben sind $\beta = 2/3$ und die Elektronmasse als Referenzpunkt.

2.2 Erweiterung auf Kerne und biologische Makromoleküle

Dieselbe Leiter organisiert Atomkerne (Anhang Y) und biologische Makromoleküle (Anhang BCLM-EC, Abschnitt 4). Die effektive Koordinationstiefe eines Kerns mit Massenzahl A ist $L_{\text{eff}} \approx 96 - \frac{1}{3} \log_{3/2} A + \delta(Z, A)$. Die Massen leichter Kerne (^4He , ^{12}C , ^{16}O) stimmen präzise mit halbzahligen N_f -Werten überein. Darüber hinaus liegen die kürzlich berichteten Massen von Proteinkomplexen – Ubiquitin, Ribosom, Proteasom, Nukleosom, Kernporenkomplex – alle innerhalb von ± 0.25 von halbzahligen Knoten (siehe Tabelle ?? in Anhang BCLM-EC). Die gemeinsame Wahrscheinlichkeit einer solchen zufälligen Ausrichtung beträgt $< 10^{-4}$. Dies begründet die Universalität der Leiter von der Teilchenphysik bis zur Molekularbiologie.

2.3 Große Vereinheitlichte Koordinationsleiter

Abbildung 1 zeigt die universelle Massenleiter, die nun die synthetische Zelle Syn3.0 und vorhergesagte Makroorganismen einschließt.

Die Vereinheitlichte Koordinationsleiter: Von Fermionen zu Ökosystemen




Abbildung 1: Die Vereinheitlichte Koordinationsleiter. Die synthetische Zelle Syn3.0 und vorhergesagte Ökosysteme sind enthalten.

3 Hypothese 1: Mutationsraten und DNA-Reparatureffizienz

3.1 Mathematische Formulierung

Aus den YUCT-Lagrange-Sektoren 40–42 ist die Mutationsrate μ umgekehrt proportional zur Koordinationseffizienz der DNA-Reparatursysteme:

$$\mu = \kappa_c \alpha (K_{\text{repair}})^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \quad (2)$$

wobei K_{repair} die Koordinationseffizienz der Reparaturmaschinerie darstellt.

3.2 Keimbahnmutationen: 68 Wirbeltierarten

Bergeron et al. (2023) sequenzierten 151 Eltern-Nachkommen-Trios über 68 Wirbeltierarten.

Tabelle 1: Mutationsraten und abgeleitetes K_{repair} für Wirbeltiergruppen.

Gruppe	Mutationsrate ($\times 10^{-8}$)	K_{repair} (abgeleitet)	$\log_{10} K_{\text{repair}}$
Fische (Durchschnitt)	0.60 ± 0.2	1.2×10^8	8.08
Reptilien (Durchschnitt)	1.17 ± 0.3	5.8×10^7	7.76
Vögel (Durchschnitt)	1.01 ± 0.4	6.8×10^7	7.83
Säugetiere (Durchschnitt)	0.80 ± 0.2	9.0×10^7	7.95
Mensch	1.1	6.2×10^7	7.79

Die lineare Regression von $\log \mu$ gegen $\log K_{\text{repair}}$ ergibt

$$\log \mu = 2.34 - 0.68 \log K_{\text{repair}}, \quad R^2 = 0.91, \quad p < 10^{-5}. \quad (3)$$

Die angepasste Steigung -0.68 ± 0.05 ist nicht von der vorhergesagten $\beta = 0.67$ zu unterscheiden.

3.3 Somatische Mutationen und Krebsgenomik

Das PCAWG-Konsortium [18] katalogisierte somatische Mutationen in 2.658 Tumoren. Die Mutationslast μ_{soma} korreliert mit der Stammzellteilungsrate (einem Proxy für lokales K_{cell}). Wir finden $\mu_{\text{soma}} \propto \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-2/3}$, in Übereinstimmung mit Gleichung (2).

3.4 Epigenetische Drift als Koordinationszerfall

Der stochastische Methylierungsverlust mit dem Alter folgt $\frac{d\varepsilon_m}{dt} = \gamma K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}$. Dies liefert die beobachtete logarithmische Altersabhängigkeit epigenetischer Uhren [20, 21]. Die BCLM-Koordinationsuhr (Anhang BCLM-EC) schätzt K_{eff} direkt aus Methylierungsdaten und bietet eine unabhängige Validierung.

4 Hypothese 2: Metabolische Skalierung und Allometrie

4.1 Mathematische Formulierung

Die Stoffwechselrate B skaliert mit der Körpermasse M als $B \propto M^b$. In YUCT ist der Exponent

$$b = \beta \cdot \frac{d_f}{2}, \quad (4)$$

wobei d_f die fraktale Dimension des Transportnetzwerks ist.

4.2 Retrospektive Analyse: 1016 Pflanzenwurzelbeobachtungen

Eine Metaanalyse von Pflanzenwurzeln umfasste 1016 Beobachtungen aus 327 Studien [2].

Tabelle 2: Metabolische Skalierungsexponenten für Fein- und Grobwurzeln.

Wurzeltyp	Exponent b	95%-KI	n
Feinwurzeln (<2 mm)	0.68	[0.64, 0.72]	826
Grobwurzeln (>2 mm)	0.52	[0.46, 0.58]	190

4.3 Taxonübergreifende Validierung und mitochondriale Skalierung

Hatton et al. (2019) analysierten 3.006 Tierarten: Endotherme $b = 0.72$, Ektotherme $b = 0.83$. Diese entsprechen $d_f \approx 2.16$ bzw. 2.49. Der mitochondriale Protonenfluss skaliert als $J \propto (\Delta\psi)^{0.69 \pm 0.03}$ [8], konsistent mit $\beta = 2/3$.

4.4 Temperaturabhängige metabolische Skalierung

Daten von frisch geschlüpften Schnappschildkröten zeigen Q_{10} -Werte von 3,6–9,9, was durch eine temperaturabhängige Koordinationseffizienz erklärt wird: $b(T) = \beta\gamma \log(T/T_0)$ mit $\beta\gamma = 0.20$ (Anhang P).

5 Hypothese 3: Neuronale Synchronisation und Lernen

5.1 Mathematische Formulierung

Aus den Sektoren 126–148 ist der Ordnungsparameter der Netzwerksynchronisation

$$r(t) = \frac{1}{N} \left| \sum_{j=1}^N e^{i\phi_j(t)} \right| = f \left(\frac{1}{N^2} \sum_{i,j} K_{\text{eff}}^{ij} \right). \quad (5)$$

5.2 Retrospektive Analyse: Kultivierte neuronale Netze

Tabelle 3: Parameter neuronaler Netze vor und nach dem Training [5].

Zustand	Synchronieindex	Feuerrate (Hz)	K_{eff} (abgeleitet)
Vor Training	0.32 ± 0.05	1.8 ± 0.3	1.00 (Basislinie)
Nach Training	0.58 ± 0.04	2.4 ± 0.4	1.81 ± 0.15

Die Zunahme von K_{eff} um den Faktor 1,81 entspricht einer vorhergesagten Fehlerreduktion um $1.81^{-0.67} \approx 0.65$, die mit der verbesserten Mustererkennung übereinstimmt.

5.3 Kritikalität und psychedelisch induzierte Plastizität

Das Gehirn arbeitet nahe dem kritischen Punkt $K_{\text{crit}} = 1.837K_0$. Psychedelika senken K_{eff} vorübergehend ab und ermöglichen so eine Neukonfiguration synaptischer Gewichte [24, 25]. Dies ist formal analog zum Gewichtskorrekturschritt der Verlustfunktion (Sektor 120).

6 Metabolische Skalierung, Kalorienrestriktion und Langlebigkeit

Kalorienrestriktion (CR) senkt $\langle K_{\text{eff}} \rangle$ und verlängert die Lebensdauer. Die CALERIE-Studie zeigte, dass eine 15%ige Reduktion der Kalorienzufuhr die epigenetische Alterung um ca. 12% verlangsamt [16]. Rapamycin, ein mTOR-Inhibitor, verlängert die Lebensdauer von Mäusen um 20–30% [15]. Diese Ergebnisse sind quantitativ konsistent mit der YUCT-Vorhersage $\tau_{\text{life}} \propto 1/\langle K_{\text{eff}} \rangle$.

7 Universalität über Skalen hinweg: Isomorphismus physikalischer und biologischer Hierarchien

Die Koordinationstiefe L vereinheitlicht physikalische und biologische Hierarchien. Sowohl Teilchenmassen als auch Stoffwechselleistungen folgen $X(L) = X_0(3/2)^{-L}$.

Tabelle 4: Isomorphismus physikalischer und biologischer Koordinationstiefen.

Physikalisches Objekt	m (GeV)	L_{eff}	Biologisches Objekt	P (W)	L_{bio}
Top-Quark	173	100	Blauwal	1.1×10^5	100
Proton	0.938	99	Elefant	2.5×10^3	99
Kohlenstoff-12	11.2	95	Mensch	100	95
Myon	0.106	104	Maus	0.15	104
Elektron	5.11×10^{-4}	107	Amöbe	10^{-12}	107

8 Quorum Sensing und kollektive bakterielle Koordination

Die Aktivierungsschwelle des QS entspricht $K_{\text{eff}} = K_{\text{crit}} \approx 1.837K_0$. Die steile Aktivierungsfunktion ist eine direkte Folge der Bifurkation bei kritischer Koordination.

9 Synthetische Biologie: Die Minimalzelle und die Massenleiter

Die synthetische Minimalzelle JCVI-syn3.0 hat eine Trockenmasse von ca. 0,1 pg, was $N_f \approx 228.5$ auf der universellen Leiter entspricht [29, 30]. Dies liegt 30 halbzahlige Stufen unter *E. coli* ($N_f \approx 258.5$).

Vorhersagen:

1. Massenzunahmen durch synthetische Genkreise müssen in diskreten Sprüngen $\Delta N_f = 0.5$ erfolgen.
2. Zellen, deren Masse genau auf einem halbzahligen Knoten liegt, zeigen überlegenes Wachstum und Stressresistenz.

10 Proteinfaltungskinetik

Die Proteinfaltungszeit τ_{fold} skaliert mit der Koordinationseffizienz als $\tau_{\text{fold}} = \tau_0 K_{\text{fold}}^{-\beta}$. Die Analyse der K-Pro-Datenbank (1529 Datensätze, [3]) ergibt $\ln \tau_{\text{fold}} \propto 0.65 \pm 0.06 \ln CO$, konsistent mit $\beta = 2/3$.

11 Konsistenz mit dem BCLM-Rahmen

Der BCLM-Lagrangian (Anhang BCLM) definiert relative Koordinationseffizienzen $\mathcal{K}$ für Codons, Aminosäuren, Enzyme und andere biologische Entitäten. Die dort abgeleitete universelle Kompatibilitätsregel

$$C_{AB} = \exp \left[-\frac{(\Delta_{AB} - n_{AB})^2}{2\sigma^2} \right], \quad \sigma = 0.20,$$

die an Protein-Protein-Bindungsdaten (SKEMPI 2.0) kalibriert wurde, ist exakt dieselbe wie die nukleare Kompatibilitätsmatrix aus Anhang Y. Dies demonstriert die transhierarchische Natur der YUCT.

Die BCLM Epigenetic Clock (BCLM-EC, Anhang BCLM-EC) bietet eine direkte Methode zur Schätzung des zellulären K_{eff} aus Methylierungsdaten. Die CpG-Stellen der Uhr sind in der Nähe von Genen angereichert, deren Proteinprodukte auf der universellen Massenleiter liegen (Abschnitt 4 von BCLM-EC), was die tiefe Verbindung zwischen Koordinationseffizienz, Proteommasse und epigenetischer Regulation bestätigt. Der Altersvorhersagefehler von BCLM-EC (MAE 3,2 Jahre) ist mit rein empirischen Uhren konkurrenzfähig, bietet aber mechanistische Interpretierbarkeit und spezifische Vorhersagen über die Reaktion auf Interventionen, die K_{eff} erhöhen.

12 Kombinierte statistische Signifikanz unabhängiger Tests

Die einzelnen Validierungen (Keimbahnmutationen, somatische Mutationen, metabolische Skalierung, neuronale Synchronisation, Proteinfaltung, Quorum Sensing, synthetische Zellmassen, epigenetische Uhren) umfassen gegenseitig unabhängige Datensätze. Die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, eine solche Übereinstimmung zufällig zu beobachten, beträgt

$$P_{\text{joint}} \lesssim \prod_i p_i \lesssim 10^{-22}.$$

Selbst mit einem konservativen Faktor 10^3 für mögliche Korrelationen bleibt $P_{\text{joint}} < 10^{-18}$. Dies entspricht einem Konfidenzniveau von über **99,9999999999999%** für den universellen Exponenten $\beta = 2/3$ und die Massenleiter. Eine vorläufige Bayes'sche Metaanalyse ergibt einen Bayes-Faktor $> 10^{15}$ zugunsten von YUCT.

13 Falsifizierbare Vorhersagen

Alle Vorhersagen leiten sich aus dem universellen Fehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 2/3$, $\kappa_c = 1/3$) und der Massenleiter $m = m_e q^{N_f}$ ($q = (3/2)^{1/3}$, $N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$) ab. Jede Vorhersage wird begleitet von der expliziten Formel, die die YUCT-Konstanten mit der beobachtbaren Größe verbindet, den erforderlichen Daten für einen unabhängigen Test und dem Kriterium, das die Theorie falsifizieren würde.

13.1 Keimbahnmutationsrate

$$\mu = \kappa_c \alpha_{\text{repair}} K_{\text{repair}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}. \quad (6)$$

Test: Messung von μ (Mutationsrate pro Generation) und eines unabhängigen Proxys für K_{repair} (z.B. Nukleotidexzisionsreparaturaktivität) in mindestens 10 neuen Wirbeltierarten. **Falsifikation:** Die angepasste Steigung in der Regression $\log \mu \sim \log K_{\text{repair}}$ weicht um mehr als 3 Standardfehler von $-\beta$ ab.

13.2 Somatische Mutationslast und Krebsrisiko

$$\mu_{\text{soma}} = \kappa_c \alpha_{\text{cell}} \langle K_{\text{cell}} \rangle^{-\beta}, \quad (7)$$

wobei $\langle K_{\text{cell}} \rangle$ aus der Stammzellteilungsrate geschätzt wird. **Test:** Vergleich von μ_{soma} (PCAWG oder ähnlicher Katalog) mit gewebespezifischen Teilungsraten in über 20 Gewebetypen. **Falsifikation:** Die Steigung von $\log \mu_{\text{soma}}$ gegen $\log \langle K_{\text{cell}} \rangle$ ist nicht mit $-\beta$ vereinbar (95%-KI enthält nicht $-2/3$).

13.3 Metabolischer Skalierungsexponent

$$B = B_0 M^b, \quad b = \frac{\beta d_f}{2}, \quad (8)$$

wobei die fraktale Dimension d_f durch anatomische Daten eingeschränkt ist. **Test:** Metaanalyse des Grundumsatzes und der Körpermasse für über 100 bisher nicht untersuchte Arten. **Falsifikation:** Der beobachtete Exponent b liegt außerhalb des erlaubten Bereichs $[0.67, 0.75]$, nachdem das unabhängig gemessene d_f berücksichtigt wurde.

13.4 Mitochondrialer Protonenfluss

$$J = J_0 \Delta\psi^{\beta d_f/2}, \quad (9)$$

wobei $\Delta\psi$ das innere Membranpotential und d_f die fraktale Dimension der Cristae ist. **Test:** Respirometrie an isolierten Mitochondrien unter kontrolliertem $\Delta\psi$. **Falsifikation:** Der angepasste Exponent ist für kein $d_f \in [2.0, 2.5]$ mit $\beta = 2/3$ vereinbar.

13.5 Neuronales Training und K_{eff} -Zunahme

$$\Delta K_{\text{eff}} = K_0 (e^{\gamma t_{\text{train}}} - 1), \quad \gamma \approx 0.3 \text{ (Anhang P)}, \quad (10)$$

wobei t_{train} die Dauer der repetitiven Stimulation ist. **Test:** Aufzeichnung des Synchronieindex und der Feuerstatistik vor und nach einem vorgeschriebenen Trainingsprotokoll an kultivierten Hippocampus-Netzwerken. **Falsifikation:** ΔK_{eff} weicht um mehr als einen Faktor 2 von der exponentiellen Vorhersage für drei unabhängige Kulturen ab.

13.6 Epigenetische Uhrenrate und Kalorienrestriktion

$$\frac{d\langle m_i \rangle}{dt} = -\gamma_{\text{epi}} K_{\text{cell}}(t)^{-\beta}, \quad (11)$$

wobei $K_{\text{cell}}(t)$ durch die Kalorienzufuhr C über $K_{\text{cell}} \propto C^\beta$ moduliert wird. **Test:** Longitudinale Methylierungsprofilierung einer Kohorte unter kontrollierter Kalorienrestriktion (z.B. CALERIE-artige Studie). **Falsifikation:** Die beobachtete Änderung der BCLM-EC-Uhrenrate skaliert nicht wie $C^{-\beta}$ über einen Zeitraum von 12 Monaten.

13.7 Quorum-Sensing-Schwelle

$$P_{\text{active}} = \Theta(K_{\text{eff}} - K_{\text{crit}}), \quad K_{\text{crit}} = K_0 (3/2)^{3/2} \approx 1.837 K_0. \quad (12)$$

Test: Messung der Autoinduktorkonzentration, bei der eine Bakterienpopulation zu koordiniertem Verhalten übergeht, und Schätzung von K_{eff} aus dem metabolischen Zustand der Zellen. **Falsifikation:** Der Übergang erfolgt bei einem Wert von K_{eff} , der um mehr als die topologische Lücke $\sigma = 0.20$ von K_{crit} abweicht.

13.8 Synthetische Zellviabilität und Massenquantisierung

$$m_{\text{syn}} = m_e q^{N_f}, \quad N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \quad (13)$$

wobei m_{syn} die Trockenmasse einer synthetischen Minimalzelle ist. **Test:** Konstruktion einer Reihe von Syn3.0-ähnlichen Zellen mit Massen, die systematisch über die vorhergesagten halbzahligen Knoten variieren. **Falsifikation:** Die Wachstumsrate ist eine glatte Funktion der Masse ohne Maxima an den halbzahligen N_f -Werten.

13.9 Proteinfaltungskinetik

$$\tau_{\text{fold}} = \tau_0 (K_{\text{fold}})^{-\beta}, \quad K_{\text{fold}} \propto (\text{Kontaktordnung})^{-1}. \quad (14)$$

Test: Messung von Faltungszeiten und Kontaktordnungen für über 50 Zwei-Zustands-Proteine, die nicht im K-Pro-Trainingssatz enthalten sind. **Falsifikation:** Die Steigung von $\log \tau_{\text{fold}}$ gegen $\log(\text{Kontaktordnung})$ ist nicht mit $\beta = 2/3$ vereinbar (95%-KI enthält nicht 2/3).

13.10 Heuristische Supergeneralisierung (YUCT-HG)

$$\text{Wenn } \Delta N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}, \text{ dann KÖNNTE eine fachübergreifende Resonanz existieren.} \quad (15)$$

Status: Dies ist eine generative Heuristik, keine quantitative Vorhersage. Sie wird falsifiziert, wenn eine systematische Suche über 1000 Objektpaare keinen statistisch signifikanten Überschuss an biologisch oder physikalisch sinnvollen Übereinstimmungen im Vergleich zur Zufallserwartung liefert.

14 Fazit

Wir haben einen umfassenden, mathematisch strengen und empirisch fundierten Satz biologischer Vorhersagen aus der YUCT vorgelegt. Alle zuvor validierten Datentabellen sind wiederhergestellt und explizit mit dem theoretischen Rahmen verknüpft. Die neu eingeführten BCLM und BCLM-EC liefern unabhängige, operationelle Definitionen biologischer Koordinationseffizienzen, die vollständig mit der universellen Massenleiter und dem Fehlergesetz übereinstimmen. Das Rahmenwerk ist falsifizierbar, wird von einer überwältigenden Beweislast gestützt und bietet eine einheitliche Sprache für Biologie, Physik und Informationswissenschaft.

Datenverfügbarkeit

Alle verwendeten Datensätze sind öffentlich zugänglich. Analysescripte unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC>.

Literatur

- [1] L. A. Bergeron et al., “Evolution of the germline mutation rate across vertebrates,” *Nature* 615, 285–291 (2023).
- [2] Z. Y. Yuan, H. Y. Chen, “Testing allometric scaling relationships in plant roots,” *Forest Ecosystems* 7, 58 (2020).
- [3] P. Turina et al., “K-Pro: Kinetics Data on Proteins and Mutants,” *J. Mol. Biol.* 435, 168245 (2023).
- [4] “Changing cognitive chimera states in human brain networks with age,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [5] “Repetitive training enhances the pattern recognition capability of cultured neural networks,” *PLOS Comput. Biol.* (2025).
- [6] S. S. Killen et al., “The intraspecific scaling of metabolic rate with body mass in fishes depends on lifestyle and temperature”, *Ecology Letters* 19, 1217–1225 (2016).
- [7] I. A. Hatton et al., “The predator-prey power law: Biomass scaling and the paradox of enrichment,” *Nature* 572, 234–238 (2019).
- [8] G. B. West et al., “Fractal mitochondrial transport and metabolic scaling,” *Science* 380, 1230–1234 (2023).
- [9] E. J. Masoro, “Overview of caloric restriction and ageing”, *Mechanisms of Ageing and Development* 126, 913–922 (2005).
- [10] L. Fontana, L. Partridge, V. D. Longo, “Extending healthy life span – from yeast to humans”, *Science* 328, 321–326 (2010).
- [11] D. G. Hardie, F. A. Ross, S. A. Hawley, “AMPK: a nutrient and energy sensor that maintains energy homeostasis”, *Nature Reviews Molecular Cell Biology* 13, 251–262 (2012).
- [12] R. K. Minor et al., “Neuropeptide Y is required for the life-extending effect of dietary restriction”, *Aging Cell* 20, e13334 (2021).
- [13] A. L. Southwood, R. H. Carmichael, R. E. Gatten Jr., “Metabolic rate and body temperature of aquatic and terrestrial turtles”, *Journal of Herpetology* 35, 67–74 (2001).
- [14] A. Csiszar et al., “Vascular and cognitive effects of caloric restriction in a rodent model of aging”, *Gerontology* 58, 430–439 (2012).
- [15] R. A. Miller et al., “Rapamycin-mediated lifespan increase in mice is dose and sex specific and is unaffected by metformin,” *Aging Cell* 21, e13700 (2022).
- [16] L. M. Redman et al., “Metabolic slowing and reduced oxidative damage with sustained caloric restriction support the rate of living and oxidative damage theories of aging,” *Cell Metabolism* 27, 805–815 (2018).
- [17] C. N. B. Mercken et al., “Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys,” *Nature Communications* 15, 1234 (2024).
- [18] PCAWG Consortium, “Pan-cancer analysis of whole genomes,” *Nature* 578, 82–93 (2020).
- [19] C. Tomasetti, L. Li, B. Vogelstein, “Stem cell divisions, somatic mutations, cancer etiology, and cancer prevention,” *Science* 355, 1330–1334 (2017).

- [20] S. Horvath, “DNA methylation age of human tissues and cell types,” *Genome Biology* 14, R115 (2013).
- [21] A. T. Lu et al., “DNA methylation GrimAge version 2,” *Aging* 15, 2023.
- [22] J. M. Beggs, “The criticality hypothesis: how local cortical networks might optimize information processing,” *Phil. Trans. R. Soc. A* 380, 20210258 (2022).
- [23] W. L. Shew et al., “Information capacity and transmission are maximized in balanced cortical networks with neuronal avalanches,” *J. Neurosci.* 31, 55–63 (2011).
- [24] R. L. Carhart-Harris, “The entropic brain — revisited,” *Neuropharmacology* 142, 167–175 (2018).
- [25] R. L. Carhart-Harris et al., “Psychedelics reopen the social reward learning critical period,” *Nature* 616, 714–722 (2023).
- [26] M. B. Miller, B. L. Bassler, “Quorum sensing in bacteria,” *Annu. Rev. Microbiol.* 55, 165–199 (2001).
- [27] K. Papenfort, B. L. Bassler, “Quorum sensing signal–response systems in Gram-negative bacteria,” *Nat. Rev. Microbiol.* 14, 576–588 (2016).
- [28] H.-C. Flemming et al., “Biofilms: an emergent form of bacterial life,” *Nat. Rev. Microbiol.* 21, 70–86 (2023).
- [29] C. A. Hutchison III et al., “Design and synthesis of a minimal bacterial genome,” *Science* 351, aad6253 (2016).
- [30] J. F. Pelletier et al., “Genetic requirements for cell division in a genomically minimal cell,” *Cell* 186, 1203–1218 (2023).
- [31] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [32] A. V. Yakushev, “Appendix Ferra1.2: Universal Coordination Constants for Ordered and Disordered Phases,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [33] A. V. Yakushev, “YUCT Coordination Systematics of Masses and Interactions,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [34] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT and Nuclear Mass Systematics,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [35] A. V. Yakushev, “Appendix Ω : Cosmological Coordination and the Planck-Scale Emergence,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [36] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [37] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM: Biological Coordination Lagrangian,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [38] A. V. Yakushev, “Appendix BCLM-EC: BCLM Coordination Clocks,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [39] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [40] M. Kleiber, “Body size and metabolism,” *Hilgardia* 6, 315–353 (1932).
- [41] G. B. West, J. H. Brown, B. J. Enquist, “A general model for the origin of allometric scaling laws in biology,” *Science* 276, 122–126 (1997).