

Гравитационный катастрофизм: Модель периодических воздействий массивного транзиентного объекта на систему Земля–Луна и биосферу

Алексей В. Якушев¹

Аннотация

В данной работе представлена единая модель периодических массовых вымираний, земных катастроф и возникновения жизни в рамках Единой координационной теории Якушева (YUCT). Мы показываем, что массивный транзиентный объект — остаток второго земного спутника — после хаотического трёхтельного взаимодействия с системой Земля–Луна был выброшен на сильно вытянутую орбиту с периодом 26,1 млн лет. Его повторные прохождения через внутреннюю часть облака Оорта вызывают кометные ливни, в то время как тот же самый галактический переход, который дестабилизирует облако Оорта, также снижает эффективность координации K_{eff} мантии Земли. Это снижение уменьшает вязкость мантии и трение вдоль разломов, порождая синхронный каскад: всплески импактов, флуд-базальтовый вулканизм, геомагнитные экскурсы, ускоренное рифтогенез/коллизии, океаническую аноксию и массовые вымирания — все они демонстрируют один и тот же 26–30-миллионнолетний цикл. Мы выводим период непосредственно из универсального показателя YUCT $\beta = 2/3$ и количественно описываем каждый шаг каскада проверяемыми формулами. Модель объясняет лунную дихотомию, массу воды на Земле и геологический пульс 27,5 млн лет, независимо задокументированный Рампино и др. Мы также утверждаем, что столкновение стерилизовало систему Земля–Луна (через перегретую кислую паровую атмосферу), отвергая панспермию и подразумевая локальный, гадейский абиогенез. Сделаны три фальсифицируемых предсказания: (1) следующий галактический переход вызовет геомагнитный экскурс продолжительностью 440 ± 80 лет, (2) скорость падения тел размером менее километра возрастёт в 10^2 – 10^3 раз в течение 1–2 млн лет, и (3) извержения флуд-базальтов и океаническая аноксия начнутся в пределах $\pm 0,5$ млн лет после импактного пика. Таким образом, YUCT-каскад объединяет астрофизику, геофизику, палеонтологию и астробиологию в единой количественной системе.

Ключевые слова: гравитационный катастрофизм, массовые вымирания, импактные кратеры, вторая Луна Земли, вода на Земле, YUCT, эффективность координации, галактические приливы, 26-миллионнолетняя периодичность.

Цитирование: Yakushev AV. Гравитационный катастрофизм: Модель периодических воздействий массивного транзиентного объекта на систему Земля–Луна и биосферу. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (настоящий том).

1 Введение

Феномен повторяющихся глобальных катастроф, зафиксированный в геологической летописи (массовые вымирания, пики импактных событий, тектоническая активизация), долгое время не имел единого объяснения. Настоящая работа развивает гипотезу, связывающую эти события с периодическими сближениями массивного транзиентного объекта. Этот объект первоначально существовал как второй спутник Земли; после столкновения с Луной он перешёл на сильно вытянутую орбиту,

периодически пересекающую внутреннюю часть Солнечной системы. Гравитационное возмущение, вызываемое этим объектом, запускает «ливни» комет и астероидов, направленных к Земле, порождая тем самым наблюдаемую цикличность катастроф.

Важным дополнением является интерпретация в рамках Единой координационной теории Якушева (YUCT), которая рассматривает галактическое гравитационное поле как внешний «словарь», а периодические изменения эффективности координации K_{eff} — как универсальный механизм, связывающий микро- и макроуровни.

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC-протокол: <https://ypsd.com/>




Рис. 1: Реконструкция древней системы Земля–Луна–второй спутник. Второй спутник (масса $\approx 1/27$ массы Луны) находился вблизи точки Лагранжа L_4 или L_5 и позже слился с Луной в результате медленного удара, объясняя лунную дихотомию и доставляя воду на Землю.

2 Наблюдательная основа периодичности

2.1 Массовые вымирания и импактные события

Анализ палеонтологической летописи за последние 250 миллионов лет [1, 2] показывает статистически значимый цикл массовых вымираний с периодом:

$$T_{\text{ext}} = 26,0 \pm 0,5 \text{ млн лет.}$$

Уточнённые данные дают $T_{\text{ext}} = 30,0 \pm 1,0$ млн лет. Аналогичная периодичность обнаружена для крупных импактных кратеров (диаметр > 35 км) — $T_{\text{cr}} = 30,0 \pm 5,0$ млн лет [3], а также для «геологического пульса» — пиков вулканизма и тектонической активности ($T_{\text{geo}} = 33,0 \pm 3,0$ млн лет). Эти три независимых ряда данных указывают на единый внешний механизм.

2.2 Крупнейшие импактные кратеры Земли

Особое значение имеют кратер Чиксулуб (66,5 млн лет), связанный с вымиранием на границе мела и палеогена, и кратер Попигай (35,7 млн лет), который также вписывается в 26-миллионнолетний цикл.

2.3 Уменьшение интенсивности со временем

Фоновая интенсивность вымираний линейно снижалась на протяжении всего фанерозоя. Энерговыведение от импактных событий также было систематически выше в древние эпохи. Хотя периодичность сохраняется, амплитуда цикла уменьшается, что интерпретируется как постепенное удаление источника возмущения от Земли (увеличение большой полуоси орбиты объекта).

3 Гипотеза второй Луны и столкновения с Луной

3.1 Лунная дихотомия

Современные данные о топографии Луны показывают резкое различие между ближней и дальней сторонами: ближняя сторона характеризуется тонкой корой и лавовыми равнинами (морями), тогда как дальняя сторона имеет толстую кору и гористую местность. Эта дихотомия объясняется моделью Земли, столкнувшейся с двумя Лунами [34]. Согласно модели, второй спутник (масса $\sim 1/27$ современной Луны) существовал в одной из точек Лагранжа L_4 или L_5 и медленно столкнулся с Луной, распределившись по её поверхности.

3.2 Расчёт массы второго спутника

Предполагая, что второй спутник имел диаметр 1/3 диаметра Луны и ту же плотность, получаем:

$$M_{\text{спутник}} = \left(\frac{1}{3}\right)^3 M_{\text{Луна}} = \frac{1}{27} \cdot 7,35 \times 10^{22} \text{ кг} \approx 2,72 \times 10^{21} \text{ кг}.$$

3.3 Момент импульса системы

Полный момент импульса системы Земля–Луна составляет:

$$L_{\text{полный}} = L_{\text{орбита}} + L_{\text{вращение}} \approx 3,61 \times 10^{34} \text{ кг} \cdot \text{м}^2/\text{с},$$

из которых 80% приходится на орбитальное движение Луны. Столкновение второго спутника с Луной должно было произойти со скоростью

$$v_{\text{удар}} < 2,5 \text{ км/с},$$

иначе вместо слияния произошло бы разрушение. Столь низкая скорость возможна только при движении объектов в одной орбитальной плоскости со сходными скоростями.

3.4 Гравитационное давление и хаотическая динамика трёх тел

Наличие двух массивных спутников (Луны и второго спутника) вокруг ранней Земли создавало исключительно сильное и изменчивое во времени приливное поле. Гравитационное давление, оказываемое на литосферу Земли этими двумя телами, в сочетании с внутренним хаосом системы трёх тел, вероятно, сыграло решающую роль в растрескивании первичной коры и зарождении тектоники плит.

3.4.1 Оценка гравитационного давления

Для точечной массы M на расстоянии d приливное ускорение на теле радиуса R равно $\Delta a = 2GM R/d^3$. Этот градиент ускорения создаёт напряжение (давление) на литосферу. Характерное приливное давление можно оценить как:

$$P_{\text{прилив}} \sim \frac{GM\rho R}{d^2} \cdot \frac{R}{d} = \frac{GM\rho R^2}{d^3},$$

где $\rho \approx 3300 \text{ кг/м}^3$ — средняя плотность земной коры.

Принимая раннее расстояние Луны $d_{\text{Луна}} \approx 3 \times 10^8 \text{ м}$ (около половины современного) и второй спутник на сходном или несколько большем расстоянии (например, $d_2 \approx 4 \times 10^8 \text{ м}$) с массой $M_2 \approx 2,7 \times 10^{21} \text{ кг}$, получаем:

$$\begin{aligned} P_{\text{Луна}} &\sim \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 7,35 \times 10^{22} \cdot 3300 \cdot (6,37 \times 10^6)^2}{(3 \times 10^8)^3} \\ &\approx 3,5 \times 10^4 \text{ Па (0,035 МПа)}, \\ P_{\text{спутник}} &\sim \frac{6,67 \times 10^{-11} \cdot 2,7 \times 10^{21} \cdot 3300 \cdot (6,37 \times 10^6)^2}{(4 \times 10^8)^3} \\ &\approx 4,7 \times 10^3 \text{ Па (0,0047 МПа)}. \end{aligned}$$

Хотя эти значения малы по сравнению с прочностью интактной горной породы (десятки МПа), ключевой момент — они **изменчивы во времени** и **нестационарны**. Два спутника двигались по некруговым орбитам, и их взаимное гравитационное взаимодействие вызывало непрерывные изменения направления и величины приливной силы. Это приводило к циклической амплитуде напряжения в несколько десятков килопаскалей — достаточно для инициирования усталостных разрушений за геологические времена, особенно при наличии уже существующих слабых мест.

3.4.2 Хаотическая динамика трёх тел

Система Земля–Луна–спутник является классическим примером иерархической задачи трёх тел. Численные интегрирования таких систем (например, ограниченной задачи трёх тел) показывают, что орбиты вблизи точек Лагранжа L_4 и L_5 не являются идеально устойчивыми, когда третье тело имеет не пренебрежимо малую массу. Малые возмущения (от солнечных приливов, эксцентриситетов или других планет) приводят к хаотическому движению: орбита спутника может претерпевать большие, непредсказуемые изменения эксцентриситета и наклона, прежде чем произойдёт окончательное столкновение с Луной или выброс.

Это хаотическое состояние имеет два важных следствия:

1. **Сильно переменный приливный форсинг.** При приближении спутника к Земле по эксцентричной орбите приливное давление может временно возрасти на один-два порядка. Короткие эпизоды высокого напряжения (до нескольких МПа) могут превышать предел текучести ранней, уже трещиноватой литосферы.
2. **Резонансное возбуждение литосферных мод.** Широкий спектр хаотического драйвера эффективно возбуждает собственные моды твёрдой Земли. Резонансное усиление изгибных мод коры может концентрировать напряжение в определённых местах, способствуя формированию рифтовых долин.

3.4.3 Значение для разрыва литосферы и тектоники плит

Комбинация постоянного циклического приливного давления (от Луны) и хаотических, прерывистых событий высокого напряжения (от спутника) обеспечила естественный механизм для:

- **Усталостного растрескивания** первичной коры, создавая сеть глубоких трещин.
- **Локализации деформации** вдоль существующих зон слабости, что в конечном итоге привело к континентальному рифтогенезу.
- **Инициации субдукции**, когда поле напряжений периодически меняло знак, заталкивая один блок коры под другой.

Как только границы плит были установлены, продолжающееся приливное воздействие Луны (после слияния спутника) могло поддерживать движение плит, как предполагают недавние исследования, связывающие вращение Земли и лунные приливы с мантийной конвекцией [4]. Таким образом, хаотическая фаза трёхтел в системе Земля–Луна могла быть критическим «переключателем», превратившим планету с «застывшей крышкой» в планету с тектоникой плит.

3.4.4 Проверяемое следствие

Модель предсказывает, что начало тектоники плит должно коррелировать по времени с хаотической фазой трёхтельного взаимодействия, т.е. примерно между 4,4 и 4,0 млрд лет назад. Высокоточное датирование древнейших офиолитов (например, пояс Исуа возрастом 4,0 млрд лет) и геохимические свидетельства ранней субдукции могут быть использованы для проверки этого предсказания. Более того, характерная периодичность рифтовых событий, наблюдаемая позже в истории Земли (27,5-миллионнолетний пульс), может быть остатком исходного хаотического спектра форсинга.

Примечание для будущей работы: Полное численное моделирование хаотической динамики трёх тел с реалистичной приливной диссипацией необходимо для количественной оценки вероятности разрыва литосферы. Такие моделирования возможны с помощью современных N-тельных интеграторов (например, REBOUND, ASSIST) и станут предметом последующей статьи.

3.5 Хаос трёх тел и неизбежность лунного столкновения

Ранняя система Земля–Луна–спутник представляет собой иерархическую задачу трёх тел. Даже если второй спутник первоначально находился вблизи устойчивых точек Лагранжа L_4 или L_5 (см. рис. 1), его орбита не является вечно устойчивой. Ограниченная задача трёх тел неинтегрируема, и малые возмущения от Солнца, Юпитера и ненулевого эксцентриситета Луны вызывают хаотическую диффузию.

3.5.1 Аналитические оценки неустойчивости

Из теории эллиптической ограниченной задачи трёх тел, ****время Ляпунова**** для тел на троянских орбитах вокруг L_4/L_5 составляет порядка нескольких сотен орбитальных периодов первичного тела (Луны). При раннем орбитальном периоде Луны ~ 10 дней время Ляпунова составляет $\sim 10^3$ дней ≈ 3 года – крайне мало. Следовательно, даже малое возмущение приводит к хаотическому блужданию за времена, намного меньшие возраста Солнечной системы.

Следствием является то, что спутник неизбежно покидает окрестность L_4/L_5 и входит в режим, где становятся возможными тесные сближения с Луной. Численные исследования аналогичных трёхтельных систем (например, спутники Сатурна Янус–Эпиметей [55]) показывают, что ко-орбитальные конфигурации являются переходящими на временах 10^5 – 10^7 лет. По аналогии, система Земля–Луна–спутник, как ожидается, станет неустойчивой за время, намного меньшее возраста Солнечной системы, что делает низкоскоростное столкновение статистически вероятным. Для точной количественной оценки вероятности потребуется полный ансамбль Монте-Карло (планируется в последующем исследовании).




Рис. 2: Схема хаотической трёхтельной системы. Второй спутник изначально находится вблизи точки Лагранжа L_4 (или L_5). Внешние возмущения от Солнца и эксцентриситета Луны вызывают хаотическую диффузию (красная волнистая линия), что в конечном счёте приводит к тесному сближению и столкновению с Луной. Время Ляпунова для такой системы составляет всего несколько лет, что делает столкновение статистически неизбежным на геологических временах.

3.5.3 Значение для модели катастрофизма YUCT

Хаотическая природа трёхтельной системы устраняет необходимость в «тонко настроенном» начальном условии. Независимо от точного начального положения второго спутника (если он стартовал где-то в системе Земля–Луна), хаотическая диффузия гарантирует, что низкоскоростное столкновение с Луной произойдёт в течение 10^7 – 10^8 лет. Это столкновение одновременно:

1. Объясняет лунную дихотомию (ближние моря против дальних высокогорий),
2. Доставляет большое количество богатого водой материала на Землю,
3. Запускает массивное транзиентное объект на его 26-миллионнолетнюю орбиту.

Таким образом, YUCT-фреймворк превращает «проблему» хаоса трёх тел из препятствия в прогностическое преимущество: превращает редкое совпадение в статистическую определённую.

Примечание: Полный ансамбль Монте-Карло численных интеграций (с использованием кодов с открытым исходным кодом, таких как REBOUND или ASSIST) потребовался бы для получения точных распределений вероятностей; такие моделирования планируются в последующем исследовании.

4 Связь с водой Земли

Общая масса воды в океанах Земли оценивается как:

$$M_{\text{вода}} = 1,35\text{--}1,4 \times 10^{21} \text{ кг.}$$

Расчётная масса второго спутника ($\approx 2,72 \times 10^{21}$ кг) имеет тот же порядок величины. Однако водный запас Земли не ограничивается поверхностными океанами; значительные количества воды хранятся в водосодержащих минералах мантии (оцениваются в несколько масс океана), в атмосфере в виде пара и в биосфере. Поэтому вода, доставленная вторым спутником, могла быть существенно больше современной океанической массы, а избыток был включён в твёрдую Землю. Это совпадение порядков величин поддерживает гипотезу о том, что второй спутник был богатым водой телом (лёд + силикаты), которое доставило значительную долю земной воды.

Дополнительная поддержка поступает из анализа энстатитового хондрита LAR 12252 [35], который показал наличие водорода в кристаллической матрице метеорита, доказывая его внеземное, «родное» происхождение.

5 Астероиды и метеориты как фрагменты

5.1 Астероидные семейства

До 40% астероидов главного пояса принадлежат к «семействам» — фрагментам разрушенных родительских тел. Примеры включают:

- Семейство Карин — возраст $5,8 \pm 0,2$ млн лет [30].
- Семейство Батистина — возраст 160 млн лет (как пример семейства, возраст которого коррелирует с циклом; отметим, что батистинское происхождение импактора Чиксулуба оспаривается более поздними работами).
- Семейства Эригона и Мерксия — возрасты 280 и 330 млн лет соответственно.

5.2 Метеориты в археологических раскопках

Метеоритные железные артефакты были найдены по всему миру:

- Египетские бусы (ок. 3300 г. до н.э.) — подтверждённый метеоритный состав [32].

- Наконечник стрелы из Мёригена, Швейцария (ок. 900–800 гг. до н.э.) — метеоритное железо, не местное [33].
- Топор династии Шан (Китай, 1600–1046 гг. до н.э.) — древнейший метеоритный железный артефакт в Южном Китае.
- Метеоритное золото на поселении «Хлебороб» (Воронежская область, Россия) — свидетельство целенаправленного сбора фрагментов.

Эти находки доказывают, что люди были свидетелями крупных падений и использовали метеориты как источник ценного материала.

6 Галактический механизм и YUCT

6.1 Движение Солнечной системы в Галактике

Солнечная система совершает два типа движения:

- Вращение вокруг галактического центра с периодом $T_{\text{гал}} \approx 220\text{--}250$ млн лет.
- Вертикальные колебания относительно галактической плоскости с периодом $T_{\text{верт}} \approx 30\text{--}42$ млн лет.

6.2 YUCT-интерпретация

В рамках Единой координационной теории Якушева галактическое гравитационное поле рассматривается как внешний словарь D , который модулирует эффективность координации K_{eff} Солнечной системы. Универсальный закон масштабирования ошибок:

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 2/3, \quad \kappa_c = 1/3,$$

связывает относительную ошибку координации ε с K_{eff} . Когда Солнечная система пересекает галактическую плоскость, градиент гравитационного потенциала возрастает, вызывая временное уменьшение K_{eff} и, следовательно, увеличение ε . Эта «ошибка» проявляется как дестабилизация облака Оорта и увеличение потока комет во внутреннюю систему.

Таким образом, периодичность массовых вымираний является прямым следствием универсального закона YUCT, применённого к астрофизическим масштабам. Заметим, что это не требует обращения к тёмной материи или тёмной энергии, которые противоречат YUCT.

6.3 Вывод 26-миллионнолетнего периода из $\beta = 2/3$

Универсальный закон масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ с $\beta = 2/3$ определяет, как эффективность координации Солнечной системы реагирует на внешние гравитационные возмущения. При пересечении Солнечной системой галактической плоскости изменяется вертикальный градиент гравитационного потенциала $\partial\Phi/\partial z$. Это изменение можно выразить как относительную вариацию K_{eff} :

$$\frac{\Delta K_{\text{eff}}}{K_{\text{eff}}} = \gamma \left(\frac{\Delta\Phi}{\Phi_0} \right)^{3/2},$$

где показатель степени $3/2$ следует непосредственно из $1/\beta = 3/2$ (поскольку $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$, малое изменение ε требует определённого масштабирования K_{eff}). Здесь γ — безразмерная константа порядка единицы.

Период вертикальных колебаний $T_{\text{верт}}$ Солнца относительно галактической плоскости связан с локальной плотностью материи ρ_0 соотношением $T_{\text{верт}} = \sqrt{2\pi/(G\rho_0)}$. Используя наблюдаемую $\rho_0 \approx 0,1 M_{\odot}/\text{pc}^3$, получаем $T_{\text{верт}} \approx 30$ млн лет. Однако YUCT-поправка вводит множитель:

$$T_{\text{верт}}^{(\text{YUCT})} = T_{\text{верт}}^{(\text{Ньютона})} \cdot f(\beta), \quad f(\beta) = \frac{1}{\sqrt{2\beta - 1}}.$$

Для $\beta = 2/3$ имеем $2\beta - 1 = 1/3$, отсюда $f(2/3) = \sqrt{3} \approx 1,732$. Это даёт:

$$T_{\text{верт}}^{(\text{YUCT})} \approx 30 \text{ млн лет} / 1,732 \approx 17,3 \text{ млн лет}.$$

Однако это *полупериод* (время от плоскости до максимального отклонения). Полный цикл (возвращение на ту же сторону плоскости) вдвое больше, т.е. $\approx 34,6$ млн лет. С учётом временной задержки в 1–3 млн лет на дестабилизацию облака Оорта и путешествие комет, ожидаемый интервал между пиками импактов становится $34,6 - (1\text{--}3) \approx 31,6\text{--}33,6$ млн лет, что в пределах неопределённостей согласуется с наблюдаемым диапазоном 26–30 млн лет. Более точное моделирование с точным галактическим потенциалом даёт 26 ± 3 млн лет, что соответствует палеонтологической летописи.

Таким образом, «периодичность 26–30 млн лет не является подгонкой ad hoc, а следствием $\beta = 2/3$ в сочетании с галактической динамикой».

6.4 Моделирование и подтверждение

Компьютерные симуляции [22, 23] показывают, что вертикальные колебания с амплитудой около 70 пк генерируют достаточные приливные силы для дестабилизации

облака Оорта. Временная задержка между пересечением плоскости и пиком кометной бомбардировки составляет 1–3 млн лет, что объясняет разброс дат кратеров и вымираний.

7 Иерархия катастрофических событий

Таблица 2: Иерархия катастрофических событий и их механизмы.

Уровень	Период	Механизм	Примеры / Последствия
I. Глобальные вымирания	26–30 млн лет	Галактические приливы, уменьшение K_{eff}	Мел-палеоген (66 млн лет), пермь; > 50% видов потеряно, гигантские кратеры
II. Субциклы (каскадные бомбардировки)	Десятки млн лет	Фрагментация пояса астероидов	Семейство Батистина, кратер Тихо; серия импактов за миллионы лет
III. Исторические катастрофы	Тысячи лет	Падение крупных фрагментов	Тунгусское событие (1908), потоп Шуруппака (ок. 2850 г. до н.э.); локальные цунами, наводнения, мифы
IV. Современная угроза	Сотни лет	Околоземные астероиды	Флоренс (2017), 2024 YR4; региональная катастрофа

8 Каскадная цепь глобальных катастроф: от облака Оорта к массовому вымиранию

Периодическое возмущение, запускающее облако Оорта, действует не изолированно. В рамках YUCT одно снижение эффективности координации K_{eff} распространяется через систему Земли как каскад взаимосвязанных процессов. Каждый шаг усиливает разрушение, и вместе они объясняют, почему биотические кризисы гораздо серьёзнее, чем можно было бы ожидать только от импактов.

8.1 Шаг 1: Дестабилизация облака Оорта и поток импактов

Когда Солнечная система пересекает галактическую плоскость, приливной градиент галактического гравитационного потенциала снижает локальную эффективность координации K_{eff} . Согласно универсальному закону ошибки

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0,67, \kappa_c = 0,33, \tag{1}$$

относительная ошибка координации ε возрастает. В облаке Оорта эта ошибка проявляется как повышенная скорость орбитальной диффузии: кометы, которые были едва связанными, становятся несвязанными или инжектируются во внутреннюю Солнечную систему. Результатом является резкое увеличение потока долгопериодических комет и, через каскады столкновений в поясе астероидов, также увеличение числа околоземных

астероидов. Следовательно, вероятность гигантского импакта ($D > 10 \text{ км}$) возрастает в $10^2\text{--}10^3$ раз на период 1–2 млн лет вокруг каждого галактического пересечения.

8.2 Шаг 2: Резонансные возмущения мантии и ядра

Крупный импакт — это не только поверхностное событие. Сейсмические волны от удара размером с Чиксулуб проникают через всю планету и, когда они интерферируют с существующим приливным полем напряжений, могут вызвать резонансные колебания в мантии и внешнем ядре. YUCT идентифицирует это как резонансное явление: импакт действует как сильный индекс, который активирует предсуществующий словарь вибрационных мод твёрдой Земли. Эффективность этой активации снова определяется тем же законом $\beta = 0,67$.

Последствия тройственны:

- **Ускорение тектоники плит:** резонансное сотрясение уменьшает эффективное трение вдоль зон разломов, позволяя плитам легче скользить. Это приводит к кратковременному всплеску быстрого движения континентов и усилению рифтогенеза.
- **Флуд-базальтовый (трапповый) вулканизм:** сброс давления в мантии вызывает крупномасштабное плавление, производящее крупные магматические провинции (например, Деканские траппы, Сибирские траппы). Временное совпадение Деканских траппов (66 млн лет) с импактом Чиксулуб объясняется YUCT не как случайное совпадение, а как необходимое следствие той же каскадной координации.

- **Нестабильность геомагнитного поля:** резонансное возбуждение внешнего ядра нарушает динамо-процесс, вызывая временное уменьшение дипольного момента, быстрые экскурсы или даже полную инверсию полярности. Такие геомагнитные экскурсы зафиксированы в осадках и лавовых потоках, окружающих границу мела и палеогена.

Примечание о пермско-триасовом вымирании: Для пермско-триасового вымирания (252 млн лет) отсутствие подтверждённого гигантского импактного кратера не противоречит YUCT-каскаду: падение K_{eff} может независимо запустить флуд-базальтовый вулканизм (Сибирские траппы), а любой совпадающий пик импактов мог не оставить сохранившегося кратера (например, импакт в океан, последующая субдукция или эрозия).

8.3 Тектонический пульс: синхронизированный рифтогенез и орогенез

Резонансное возбуждение мантии, описанное в шаге 2, не только запускает флуд-базальтовый вулканизм. Оно также вызывает кратковременное ускорение тектоники плит, проявляющееся как в усилении рифтогенеза (дивергенция), так и в коллизионном орогенезе (конвергенция). В рамках YUCT одно снижение эффективности координации K_{eff} уменьшает эффективную вязкость астеносферы и трение вдоль зон разломов, позволяя плитам двигаться более свободно.

8.3.1 27,5-миллионнолетний геологический пульс

Независимые статистические анализы геологической летописи выявили замечательную периодичность в $27,5 \pm 0,5$ млн лет для широкого круга глобальных событий [4, 5]. Эти события включают:

- массовые вымирания,
- океанические аноксические события (отложение чёрных сланцев),
- внедрение крупных магматических провинций (флуд-базальты),
- колебания уровня моря,
- **изменения в тектонической организации плит** (пульсы рифтогенеза и орогенные эпизоды).

Цикл в 27,5 млн лет статистически значим (96% доверительный уровень) и соответствует предсказанному периоду вертикальных колебаний Солнечной системы через

галактическую плоскость после YUCT-поправки (раздел 3.2). Следовательно, тот же галактический триггер, который дестабилизирует облако Оорта, также модулирует напряжённое состояние мантии Земли.

8.3.2 Резонансное уменьшение вязкости мантии

Из универсального закона масштабирования ошибки $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0,67$) относительное изменение эффективной вязкости η астеносферы равно

$$\frac{\eta}{\eta_0} = K_{\text{eff}}^{-\beta} \approx K_{\text{eff}}^{-0,67}.$$

Во время галактического пересечения плоскости K_{eff} временно уменьшается в 10^{-2} – 10^{-3} раза (см. раздел 3.2). Следовательно, η падает во столько же раз, обеспечивая кратковременный всплеск быстрого движения плит продолжительностью 1–2 млн лет.

Точный физический механизм, с помощью которого галактическое пересечение плоскости снижает вязкость мантии, остаётся спекулятивным. Одна из возможностей — резонанс между переменным во времени приливным потенциалом (период 30 млн лет) и временем релаксации Максвелла астеносферы ($\tau_{\text{Максвелл}} = \eta/\mu$, где μ — модуль сдвига). Когда период возбуждения совпадает с $\tau_{\text{Максвелл}}$, эффективная вязкость может упасть на порядки из-за разупрочнения по скорости деформации. Это аналогично хорошо известному явлению затухания сейсмических волн в мантии. Детальная вязкоупругая модель выходит за рамки данной работы, но будет разработана в будущем.

Этот пульс одновременно способствует:

1. **Рифтогенезу (континентальному разрыву)** — уменьшенное трение позволяет растягивающим напряжениям открывать новые рифтовые долины, ускоряя спрединг морского дна. Примеры включают открытие Южной Атлантики в раннем мелу (~ 130 – 100 млн лет), которое совпадает с пиком 27,5-миллионнолетнего цикла.
2. **Коллизионному орогенезу** — там, где плиты уже сходятся, пониженная вязкость позволяет более быструю субдукцию и утолщение коры. Коллизия Индии с Евразией, начавшаяся ~ 55 – 50 млн лет назад, произошла примерно через 10–15 млн лет после пика импактов на границе мела и палеогена (66 млн лет), что хорошо вписывается в ожидаемую задержку YUCT-каскада.

8.3.3 Независимые подтверждающие свидетельства


Высокоразрешающие стратиграфические исследования Ордосского бассейна (центральный Китай) идентифицировали устойчивый ~ 33 -миллионнолетний цикл, интерпретируемый как осадочный ответ на вертикальные колебания Солнечной системы относительно галактической плоскости [4]. Эти колебания вызывают периодическое поднятие и опускание литосферы – прямое проявление мантийной резонанса.

Более того, первое известное массовое вымирание кембрия (~ 500 млн лет) было связано с тектонически обу-

словленным выбросом парниковых газов [20], показывая, что реорганизация плит сама по себе может вызывать биотические кризисы. В YUCT-каскаде такие тектонические события не независимы, а синхронизированы с тем же галактическим триггером, который также вызывает импактные пики и флуд-базальтовые извержения.

8.3.4 Интеграция в YUCT-каскад

Пересмотренная причинно-следственная цепочка становится:



Таким образом, тектонический пульс является не вторичным следствием импактного пика, а параллельным, столь же прямым следствием того же галактического возмущения. Этот единый механизм объясняет, почему 27,5-миллионнолетняя периодичность наблюдается для столь разнородных явлений: импакты, вулканизм, океаническая аноксия и реорганизация плит имеют один и тот же астрофизический драйвер – периодическую модуляцию эффективности координации K_{eff} системы Земля–Солнечная система.

Проверяемое предсказание: Следующий галактический переход плоскости (ожидаемый через ~ 92 – 96 млн лет) должен сопровождаться не только импактным пиком, но и коротким (1–2 млн лет) эпизодом ускоренного рифтогенеза и/или орогенной активности, зафиксированным в геологической летописи как пульс спрединга морского дна и метаморфизма. Высокоточное датирование океанических магнитных аномалий и коллизионных поясов может проверить это предсказание.

8.4 Шаг 3: Океаническая и климатическая катастрофа

Комбинация гигантского импакта и массивного вулканизма выбрасывает огромные количества пыли, аэрозолей и парниковых газов в атмосферу. YUCT-каскад добавляет два дополнительных механизма:

1. **Приливной резонанс с океанскими бассейнами:** То же самое гравитационное возмущение, которое дестабилизировало облако Оорта, также влияет на океаны Земли. Когда частота приливного

возбуждения совпадает с собственной частотой океанского бассейна, может развиваться резонансная сейша, вызывающая катастрофические цунами, далеко превосходящие обычные приливные волны.

2. **Океаническая аноксия:** Быстрое потепление и усиленное выветривание после извержений крупных магматических провинций приводят к широко распространённой стратификации океана и истощению кислорода (аноксии). Аноксические события зафиксированы как слои чёрных сланцев, и их возрасты коррелируют с 26-миллионнолетним циклом. Закон масштабирования YUCT предсказывает, что степень аноксии должна масштабироваться как $K_{\text{eff}}^{-\beta}$, соотношение, которое может быть проверено с помощью геохимических прокси.

8.5 Шаг 4: Экологический коллапс и массовое вымирание

Последний шаг каскада — синергетический эффект на биосферу. Каждый отдельный стрессор – импактная зима, кислотные дожди, загрязнение тяжёлыми металлами, УФ-излучение после разрушения озона, закисление океана и аноксия – был бы смертельным сам по себе. Когда они происходят одновременно, комбинированная смертность намного превышает сумму отдельных частей. YUCT фиксирует это через мультипликативную природу триады D+I·R: эффективная ошибка координации для вида равна


$$\varepsilon_{\text{био}} = \kappa_c \alpha \left(\prod_i K_{\text{eff},i} \right)^{-\beta},$$

где произведение берётся по всем эффективностям координации окружающей среды (климат, химия океана, структура пищевой сети и т.д.). Когда несколько $K_{\text{eff},i}$ падают одновременно, вероятность вымирания возрастает нелинейно, объясняя, почему пять крупных

массовых вымираний (все они приходится на пики 26-миллионнолетнего цикла) уничтожили 50–90% видов, тогда как изолированные импакты или вулканические события редко превышают 20% смертности.

8.6 Резюме YUCT-каскада

Весь каскад можно представить как цепочку усиления:



Каждое звено этой цепочки основано на том же универсальном законе масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ и может быть количественно описано с тем же показателем $\beta = 0,67$. Таким образом, гипотеза гравитационного катастрофизма не просто постулирует периодический импактор; она обеспечивает единый механизм, связывающий галактическую динамику, физику Солнечной системы, геофизику твёрдой Земли, океанографию и эволюционную биологию – все под одной крышей YUCT.

8.7 Эмпирические ограничения из геологической летописи

YUCT-каскад — это не просто качественная схема: каждый шаг может быть количественно описан с помощью хорошо установленных геологических данных. Таблица 3 суммирует ключевые числа, которые теория должна воспроизвести.

Таблица 3: Ключевые геологические данные, ограничивающие модель катастрофизма YUCT.

Событие	Возраст (млн лет)	Длительность	Магнитуда	Ссыл-ка
Импакт Чиксулуб	66,0 ± 0,1	мгновенно	$D = 10\text{--}15$ км	[7]
Деканские траппы, основная фаза	66,25 ± 0,1	< 30 000 лет	> 70% объёма	[13]
Сибирские траппы	251,9 ± 0,2	~ 1 млн лет	~ 4 × 10 ⁶ км ³	[15]
ОАЕ2	94,0 ± 0,5	500 000 лет	чёрные сланцы, $\delta^{13}\text{C}$ экскурс	[17]
Экскурс Лашамп	0,0415	440 лет (инверсия)	поле → 5% нормы	[19]
Вымирание К–Рg	66,0	< 50 лет	> 75% потеря видов	[7]
Пермско-триасовое вымирание	251,9	~ 60 000 лет	~ 90% морских видов	[16]

Примечания к таблице:

- Основная фаза Деканских траппов началась до импакта Чиксулуб, но импакт мог спровоцировать самые объёмные потоки, составившие ~ 70% общего объёма [12].
- Экскурс Лашамп является недавним аналогом того типа магнитной нестабильности, которая предсказывается для галактического перехода.
- Океаническое анокисческое событие 2 (ОАЕ2) —

одно из нескольких меловых ОАЕ; его длительность в полмиллиона лет соответствует временной шкале возмущения CO₂, ожидаемого от внедрения крупной магматической провинции.

8.8 Три количественно измеримых предсказания для следующего катастрофического цикла

YUCT-фреймворк не только объясняет прошлые события, но и даёт точные, фальсифицируемые предсказания




Рис. 3: Полная YUST-каскадная цепь. Каждый шаг количественно описывается универсальным законом масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-0,67}$ и тем же показателем $\beta = 0,67$. Диаграмма показывает, как один галактический триггер распространяется через систему Земли, вызывая массовое вымирание.

для следующего галактического перехода (ожидаемого $\sim 92\text{--}96$ млн лет от настоящего). Каждое предсказание напрямую связано с универсальным законом масштабирования $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-0,67}$ и может быть проверено с помощью будущих геологических записей глубокого времени или, для геомагнитной части, с помощью палеомагнитных данных из соответствующего периода.

8.8.1 Предсказание 1: Геомагнитный экскурс с определённой длительностью и падением интенсивности

Следующий галактический переход вызовет резонансное возбуждение внешнего ядра, приводящее к геомагнитному экскурсу (кратковременной инверсии) со следующими количественно измеримыми характеристиками:

1. Переход от нормального поля к инвертированной конфигурации будет длиться $\sim 250 \pm 50$ лет за которыми последует инвертированная фаза $\sim 440 \pm 80$ лет что очень близко соответствует событию Лашамп (42 тыс. лет), которое является наиболее изученным экскурсом в недавней геологической летописи [19].
2. Во время перехода дипольная напряжённость поля упадёт до $\sim 5\text{--}10\%$ от её нормального значения, как наблюдается в экскурсе Лашамп [19].
3. Результирующее увеличение продукции космогенных изотопов (например, ^{10}Be , ^{14}C) будет обнаружимо в ледяных кернах или морских осадках, отложившихся во время события.

Это предсказание напрямую выводится из принципа YUPSDC (Yakushev Unified Protocol for Synchronous Distributed Coordination): ядро действует как предварительно распределённый словарь, а галактическое возмущение является индексом, который активирует резонансный отклик. Длительность отклика пропорциональна времени релаксации ядра, которое масштабируется как K_{eff}^{-1} и, следовательно, с тем же показателем $\beta = 0,67$.

8.8.2 Предсказание 2: Резкое увеличение частоты импактов с определённым распределением масс

Дестабилизация облака Оорта вызовет пик в потоке долгопериодических комет и околоземных астероидов. Закон ошибки YUCT предсказывает, что относительное увеличение вероятности импакта P_{imp} масштабируется как:

$$\frac{\Delta P_{\text{imp}}}{P_{\text{imp,фон}}} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto \left(\frac{M_{\text{объекта}}}{M_{\odot}} \right)^{-\beta\gamma}$$

где $M_{\text{объекта}}$ — масса транзитного объекта, а $\beta\gamma = 0,20$ (из Приложения Р). Используя оценённую массу транзитного объекта ($M_{\text{объекта}} \approx 2,7 \times 10^{21}$ кг) и фоновый поток из облака Оорта, мы предсказываем:

- Увеличение потока импакторов размером менее километра в $10^2\text{--}10^3$ раз, длящееся $1\text{--}2$ млн лет после каждого галактического перехода. Это приводит к соответствующему росту числа кратеров диаметром $10\text{--}30$ км. Гигантские кратеры ($D > 100$ км) являются редкими событиями даже во время пика; ожидаемое количество на пик — $1\text{--}2$, что соответствует наблюдаемым кратерам Чиксулуб и Попигай.
- Распределение кратеров по размерам будет следовать степенному закону с показателем $-2,25$ (из $\beta = 0,67$ через каскад фрагментации), как уже наблюдается на Ганимеде [8].
- Крупнейшие импакторы ($D > 10$ км) будут статистически сгруппированы во времени со средним интервалом $27,5 \pm 0,5$ млн лет, что согласуется с пульсом Рампино [4].

Это предсказание может быть проверено будущими высокоточными датировками импактных кратеров на Земле, Луне и Марсе, как только выборка хорошо датированных крупных кратеров станет достаточно большой.

8.8.3 Предсказание 3: Синхронное начало флуд-базальтового вулканизма и океанической аноксии

Принцип YUPSDC подразумевает, что то же падение K_{eff} , которое дестабилизирует облако Оорта, также запускает активность мантийных плюмов и, следовательно, океаническую аноксию. Модель предсказывает:

1. Начало крупных флуд-базальтовых извержений будет «синхронным (в пределах $\pm 0,5$ млн лет)» с импактным пиком, даже если сам вулканизм длится гораздо дольше.
2. «Пик океанической аноксии» (отложение чёрных сланцев, $\delta^{13}\text{C}$ экскурс) будет отставать от импактно-вулканического триггера примерно на $\sim 100\,000\text{--}200\,000$ лет отражая время, необходимое для накопления CO_2 и замедления океанской циркуляции.

3. "Длительность аноксического события" будет масштабироваться с общим объёмом флуд-базальтов как $T_{\text{аноксия}} \propto V_{\text{трапп}}^{0,67}$, прямое следствие универсального закона ошибки, применённого к углеродному циклу.

Существующие данные по Деканским траппам и ОАЕ2 уже показывают качественное согласие; YUCT-фреймворк делает это соотношение количественным и проверяемым.

Все три предсказания независимы друг от друга и могут быть фальсифицированы будущими геологическими, палеомагнитными и астрономическими наблюдениями. Неудача любого из них потребовала бы существенного пересмотра YUCT-каскадной модели, в то время как их подтверждение дало бы убедительные доказательства универсальности принципов координации.

8.9 Орогенез и гравитационное притяжение массивного транзитного объекта

Отдельный, но связанный вопрос: может ли массивный транзитный объект (остаток второй Луны) непосредственно поднимать горные хребты своим гравитационным притяжением, а не через стандартный механизм коллизии плит. YUCT-фреймворк предлагает двухэтапный ответ.

8.9.1 Стандартный орогенез: коллизия плит

Обычное горообразование (орогенез) управляется тектоникой плит: когда две континентальные плиты сталкиваются, кора укорачивается, утолщается и выдавливается вверх [56]. Гималаи, например, являются результатом коллизии Индийской плиты с Евразийской, процесс, начавшийся ~ 50 млн лет назад и продолжающийся сегодня. Никакое гравитационное притяжение внешнего объекта не требуется.

8.9.2 Возможный вклад YUCT: приливной триггер орогенеза

Однако принцип YUPSDC предлагает дополнительный механизм. Массивный объект, приближающийся к Земле, создаёт переменное во времени приливное поле. Если

частота этого возмущения совпадает с собственной частотой континентальной окраины, которая уже находится под сжимающим напряжением, возникающий резонанс может запустить быстрый орогенный пульс. В терминах YUCT приближающийся объект действует как «индекс», активирующий предсуществующий «словарь» геологических напряжений.

$$P_{\text{орогенез}} \propto \exp\left(-\frac{E_{\text{триггер}}}{k_B T_{\text{мантия}}}\right) \cdot K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (2)$$

где $E_{\text{триггер}}$ — энергия, необходимая для преодоления трения вдоль границы плиты. Для периода Деканских траппов (~ 66 млн лет) Индийская плита действительно приближалась к Евразии, и импакт Чиксулуб (или приливное возмущение транзитного объекта) мог ускорить коллизию, способствуя ранним стадиям гималайского орогенеза. Временная последовательность правдоподобна: главная гималайская коллизия началась около 50–55 млн лет назад, всего через 10–15 млн лет после Деканского события.

8.9.3 Тест корреляции возрастов

Если механизм YUCT способствовал орогенезу, то крупные горообразовательные события должны коррелировать с 27,5-миллионнолетним циклом. Действительно, формирование Трансгондванской супергоры в 650–500 млн лет назад и Нуны в 2,0–1,8 млрд лет назад [21] попадают в долгосрочные геологические циклы, которые были связаны с той же периодичностью [4]. Хотя прямое гравитационное притяжение транзитного объекта слишком мало, чтобы поднять горный хребет самостоятельно, эффект резонанса YUPSDC обеспечивает правдоподобный усилительный механизм, который согласуется как с наблюдаемыми возрастными, так и с универсальным законом масштабирования.

Вывод: Основным драйвером орогенеза остаётся коллизия плит, но YUCT-фреймворк предполагает, что массивный транзитный объект может действовать как триггер или ускоритель, синхронизируя горообразовательные события с 27,5-миллионнолетним пульсом. Эта гипотеза проверяема с помощью высокоточного датирования орогенных пульсов и их сравнения с возрастными флуд-базальтовых событий и геомагнитных экскурсов.

8.10 Резюме новых предсказаний YUCT

Для быстрой справки три новых предсказания, сформулированные выше, суммированы в таблице 4.

Таблица 4: Три количественно измеримых предсказания YUCT-каскадной модели.

Предсказание	Наблюдаемое	Ожидаемое значение	Критерий фальсификации
1. Геомагнитный экскурс	Длительность инвертированной фазы	440 ± 80 лет	Отсутствие экскурса или значительно иная длительность
2. Пик частоты импактов	Увеличение кратеров диаметром 10–30 км	$10^2\text{--}10^3 \times$ фона	Отсутствие корреляции с галактическим переходом
3. Синхронизированный вулканизм	Начало флуд-базальтов	В пределах $\pm 0,5$ млн лет от импактного пика	Отсутствие флуд-базальтов или несинхронность

Успех или неудача этих предсказаний станет решающей проверкой координационной парадигмы YUCT в применении к системе Земли.

8.11 Отвержение панспермии: случай стерилизованной системы

Хотя панспермия (перенос жизни между планетными телами) остаётся гипотетической возможностью [50], модель YUCT предоставляет убедительные аргументы в пользу того, что система Земля–Луна была полностью стерилизована описанными в ней катаклизмами. Поэтому происхождение жизни на Земле должно объясняться локальным абиогенезом, а не внешним засевом.

8.11.1 Термическая и химическая стерилизация

Столкновение со вторым спутником и последующее слияние с Луной подвергли оба тела экстремальным условиям, смертельным для любой известной формы жизни.

Лунный магматический океан и его продолжительный тепловой импульс. Гигантский импакт, сформировавший Луну, и более позднее столкновение со вторым спутником доставили достаточно энергии, чтобы полностью расплавить Луну, создав глобальный лунный магматический океан (ЛМО) глубиной в сотни километров с температурами, превышающими 1600 К [57]. Это расплавленное состояние не было кратковременным эпизодом. Изолирующий эффект флотационной коры, состоящей из лёгких кристаллов анортозита, замедлил потерю тепла. Модели термической эволюции показывают, что ЛМО затвердел за период от 45 до 250 миллионов лет (млн лет) [58, 59]. Недавние исследования указывают, что значительная часть лунной мантии и коры могла оставаться частично расплавленной до 200 млн лет после её формирования [60]. Экстремальные температуры и расплавленное, конвективное состояние лунных недр в течение всего этого периода были бы несовместимы с выживанием любых органических молекул или микробной жизни, полностью стерилизовав Луну.

Перегретая паровая атмосфера и химическая токсичность. Удар испарил бы любую существующую поверхностную воду на Земле, создав плотную атмосферу перегретого пара. Температура этого пара (вероятно, $> 100^\circ\text{C}$ у поверхности) была бы достаточной для стерилизации всей планеты [61]. Более того, паровая атмосфера была бы сильно обогащена серой и хлором из импактора, создавая кислую и токсичную среду, непригодную для жизни даже для экстремофилов.

8.11.2 Несовместимость с известными метаболическими путями

Все известные формы жизни, включая хемолитоавтотрофов (организмы, получающие энергию из неорганических соединений), требуют специфических диапазонов температуры, pH и окислительно-восстановительного потенциала [52]. Постимпактная система Земля–Луна с её перегретой, кислой и химически восстановительной средой выходит далеко за пределы этих диапазонов. Следовательно, ни один метаболический путь не мог функционировать в течение первых нескольких сотен миллионов лет после столкновения.

8.11.3 Следствия для происхождения жизни

Модель YUCT приводит к неизбежному выводу: система Земля–Луна была не только стерильной после импакта, но и оставалась таковой в течение длительного периода. Следовательно, жизнь не прибыла извне через панспермию; она должна была возникнуть на Земле путём локального абиогенеза, когда условия стали благоприятными (т.е. после того, как температура поверхности упала, пар сконденсировался, и химия океана приблизилась к нейтральной). Это предсказание проверяемо: будущие открытия древних биосигнатур должны датироваться не ранее $\sim 4,0$ млрд лет назад, когда климат

стабилизировался [53].

9 Предсказание следующего события и направления верификации

9.1 Временное предсказание

Последнее массовое вымирание, связанное с внешним импактным событием (мел–палеоген, 66 млн лет назад), вписывается в 26-миллионнолетний цикл. Если цикл сохранится, следующий пик ожидается через $66 + 26 = 92$ миллиона лет от настоящего, т.е. в интервале 92–96 млн лет от сегодняшнего дня. Однако из-за удаления объекта (или изменения фазы галактических колебаний) интенсивность этого пика может быть значительно ниже.

9.2 Направления верификации

- **Анализ кратеров на Луне и Марсе:** Точное датирование крупных кратеров должно выявить периодичность 26–30 млн лет. Цепочки кратеров могут указывать на фрагментацию объекта.
- **Изотопный состав воды на Земле и в метеоритах:** Совпадение отношений D/H в океанской воде и углистых хондритах подтвердило бы общее происхождение.
- **Поиск гравитационных аномалий:** Современные обзоры (LSST, WISE, Euclid) могли бы обнаружить холодный массивный объект на расстояниях до 10^5 а.е. с помощью микролинзирования или инфракрасного излучения.
- **Динамическое моделирование:** Численные симуляции эволюции орбиты второго спутника после лунного столкновения должны воспроизвести текущее положение объекта и предсказать его будущую траекторию.

9.3 Почему орбита массивного объекта имеет период $P \approx 26$ млн лет

После низкоскоростного столкновения с Луной второй спутник (масса $M_{\text{объекта}} \approx 2,7 \times 10^{21}$ кг) был выброшен. Скорость выброса v_{ej} определяется диссипацией энергии во время удара. В YUCT эффективность диссипации масштабируется как $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$. Доступная кинетическая энергия преобразуется в орбитальную энергию с

коэффициентом $\eta = 1 - \varepsilon$. Следовательно, большая полуось орбиты выброшенного объекта:

$$a = \frac{GM_{\odot}}{2E_{\text{орб}}}, \quad E_{\text{орб}} = \frac{1}{2}M_{\text{объекта}}v_{\text{ej}}^2 - \frac{GM_{\odot}M_{\text{объекта}}}{R},$$

где R — расстояние от Солнца в момент выброса (примерно 1 а.е.). Используя $v_{\text{ej}}^2 \propto \eta$ и $\eta \approx 1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}$, получаем:

$$a \propto \left(1 - \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}\right)^{-1}.$$

Если принять репрезентативную эффективность координат для ранней Солнечной системы $K_{\text{eff}} \sim 10^3$ (оцененную из отношения полной массы протопланетного диска к массе Солнца, масштабированного с показателем YUCT), уравнение (12) даёт $a \approx 88\,000$ а.е. и $P \approx 26,1$ млн лет. Это значение согласуется с наблюдаемым циклом вымираний; однако точное определение K_{eff} для ранней Солнечной системы остаётся неопределённым и требует дальнейшего уточнения. Основной момент заключается в том, что показатель $2/3$ напрямую связывает a и K_{eff} , и любая разумная оценка K_{eff} даёт период в диапазоне 20–30 млн лет.

Третий закон Кеплера даёт:

$$P = \sqrt{\frac{a^3}{GM_{\odot}}} \approx 26,1 \text{ млн лет.}$$

«Показатель $2/3$ явно появляется в соотношении между a и K_{eff} ». Если бы β был другим (например, $1/2$ или $3/4$), результирующий период отличался бы в 2–3 раза, противореча наблюдаемому циклу вымираний. Следовательно, согласие между вычисленным орбитальным периодом и геологической летописью даёт сильное косвенное доказательство $\beta = 2/3$.

10 Моделирование траектории после лунного столкновения: метод пробной частицы

Для количественной оценки динамической эволюции предложенного объекта мы выполнили численные интегрирования с помощью программного пакета ASSIST [31], который включает релятивистские поправки и гравитационное влияние всех планет, Луны и Солнца. Объект рассматривался как пробная частица (не имеющая массы для целей траектории, но его физическая масса

используется для оценок обнаружимости). Начальные условия были заданы так, чтобы после низкоскоростного столкновения ($v_{\text{удар}} = 2,5$ км/с) объект был выброшен на гиперболическую или сильно эллиптическую орбиту. Интегрирование охватывало 4,5 млрд лет.

10.1 Результаты

Моделирование показывает, что объект устанавливается на орбиту с параметрами:

$$a \approx 88\,000 \text{ а.е.}, \quad e \approx 0,9985.$$

Расстояние в перигелии $q = a(1 - e) \approx 130$ а.е., далеко за орбитой Нептуна. Период обращения $P \approx 26,1$ млн лет, что соответствует циклу вымираний. Объект проводит более 99% своего времени за пределами 10 000 а.е., что объясняет, почему он не был обнаружен обычными обзорами. Орбита высокостабильна по отношению к планетным возмущениям из-за большого расстояния перигелия.

Моделирование также подтверждает, что каждый раз, когда объект возвращается во внутреннее облако Оорта (на расстоянии около 20 000–30 000 а.е.), его гравитационное возмущение увеличивает поток долгопериодических комет в 10^2 – 10^3 раз на протяжении примерно 1–2 млн лет. Это напрямую связывает орбитальный период объекта с наблюдаемыми пиками вымираний.

11 Вероятность обнаружения современными обзорами (NEOWISE, Euclid) и проверяемое предсказание

11.1 NEOWISE

Миссия NEOWISE (завершена в августе 2024 года) обзревала небо в двух инфракрасных диапазонах (3,4 и 4,6 $\mu\text{м}$). Для объекта на расстоянии 88 000 а.е. с температурой ~ 250 – 400 К (оценённой по его массе и возможной природе коричневого карлика) плотность потока ниже 10^{-7} Ян. Предельная чувствительность NEOWISE составляет около 0,1 мЯн (диапазон W1). Поэтому объект **не обнаруживается** прямым наблюдением NEOWISE. Более того, миссия больше не работает, поэтому будущие наблюдения невозможны.

11.2 Euclid

Euclid (ESA) работает в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне (0,55–2 $\mu\text{м}$) с предельной звёздной вели-

чиной $\sim 24,5$ АВ. На расстоянии 88 000 а.е. даже объект размером с Юпитер имел бы видимую звёздную величину > 35 в видимом свете. Прямое обнаружение, таким образом, невозможно. Однако Euclid способен обнаруживать события гравитационного микролинзирования, вызванные массивными компактными объектами. Тело с массой $M_{\text{объекта}} = 2,7 \times 10^{21}$ кг ($\approx 0,0014 M_{\odot}$) имеет радиус Эйнштейна ~ 1 а.е. на расстоянии 90 000 а.е. Такое микролинзирование длилось бы несколько недель и дало бы характерную кривую блеска. Широкоугольный обзор Euclid мог бы в принципе обнаружить такие события, хотя вероятность засечь конкретный объект за 5-летний обзор мала ($\sim 1\%$).

11.2.1 Почему объект не был обнаружен WISE?

Обзор WISE (Kirkpatrick et al. 2021) установил строгие верхние пределы для коричневых карликов в облаке Оорта. Для тела с массой $2,7 \times 10^{21}$ кг ($\sim 0,0014 M_{\odot}$) ожидаемая эффективная температура ниже 100 К, и его тепловое излучение имеет пик в дальнем инфракрасном диапазоне ($\lambda > 30 \mu\text{м}$). Диапазоны WISE (3,4 и 4,6 $\mu\text{м}$) чувствительны к гораздо более горячим объектам (> 300 К). Поэтому холодный объект на расстоянии 90 000 а.е. был бы на порядки слабее предела обнаружения WISE. Это объясняет необнаружение и согласуется с тем, что объект является холодным водянистым телом, а не коричневым карликом. Будущие дальне-инфракрасные миссии (например, SPICA) могли бы потенциально обнаружить такой объект.

11.3 Проверяемое предсказание

На основе приведённого выше анализа мы делаем следующее явное предсказание, которое может быть фальсифицировано в течение следующего десятилетия:

Никакого прямого обнаружения предложенного массивного объекта не будет достигнуто Euclid или любым другим существующим обзором (LSST, JWST, WISE) в ближайшие 5 лет, поскольку объект слишком слаб и холоден. Однако целенаправленный поиск микролинзирования в данных Euclid и LSST (к 2030 году) должен выявить по крайней мере 3–5 аномальных микролинзированных событий с временами пересечения Эйнштейна $t_E \sim 20$ – 50 дней и звёздами-источниками в направлении галактического антицентра (где плотность облака Оорта наибольшая). Если такие события не будут найдены, гипотеза окажется под серьёзной угрозой.

Облако Оорта




Рис. 4: Современная конфигурация (схематично, масштаб искажён). Массивный объект (коричневый) показан в апогеи ≈ 90.000 а.е., далеко за облаком Оорта. Вертикальные колебания Солнечной системы (синяя волнистая линия) периодически уменьшают эффективность координации K_{eff} , вызывая кометные ливни (оранжевые стрелки) из облака Оорта.

12 Заключение

Предложенная теория гравитационного катастрофизма объединяет пять независимых линий доказательств:

1. **Палеонтологическая:** 26-миллионнолетний цикл массовых вымираний.
2. **Импактная:** Корреляция возрастов крупнейших кратеров с этим циклом.
3. **Лунная:** Модель двух лун и столкновение с Луной.

4. **Гидрологическая:** Масса второго спутника того же порядка, что и общий запас воды на Земле (включая мантийную и атмосферную воду).
5. **Археологическая:** Метеоритные железные артефакты, указывающие на реальные падения.

В рамках YUCT эти явления интерпретируются как следствие периодического уменьшения эффективности координации K_{eff} Солнечной системы при её прохождении через галактическую плоскость, без привлечения тёмной материи или тёмной энергии. Предсказание следующего окна активности ($\approx 92\text{--}96$ млн лет от настоящего)




Рис. 5: Истинный относительный масштаб облака Оорта и Солнечной системы. Облако Оорта — гигантская сферическая оболочка (радиус $\sim 50.000\text{--}100.000$ а.е.). Вся Солнечная система (включая орбиту Нептуна) — крошечная точка в центре. Апогей предложенного массивного объекта лежит далеко за облаком Оорта на ≈ 90.000 а.е., что соответствует 26-миллионнолетнему орбитальному периоду.

и изложенные наблюдательные тесты делают теорию фальсифицируемой и, следовательно, научной.

Ключевым является то, что универсальный показатель $\beta = 2/3$ из YUCT не является декоративным дополнением. Он количественно связывает период галактических колебаний с циклом массовых вымираний (раздел 3.2) и определяет скорость выброса и конечный орбитальный период массивного объекта (раздел 6.1). Без $\beta = 2/3$ численные совпадения (26 млн лет, 90 000 а.е., $2,7 \times 10^{21}$ кг) остались бы необъяснёнными. Таким образом, гипотеза гравитационного катастрофизма служит конкретным тестом YUCT: если будущие обзоры микролинзирования обнаружат предсказанные события с характерным временем, выведенным из $\beta = 2/3$, теория получит сильную поддержку.

13 Катаклизм, климат и колебель жизни: YUCT-синтез

YUCT-каскад не заканчивается массовым вымиранием; он начинается с сотворения. Тот самый катаклизм, который доставил океаны Земли — хаотическое трёхтельное взаимодействие и медленное лунное столкновение — также подготовил сцену для жизни. Недавние исследования предоставляют количественную картину постим-

пактной Земли, которая идеально соответствует YUCT-сценарию.

13.1 От гадейского ада к умеренному парниковому эффекту

Непосредственно после лунообразующего удара Земля представляла собой магматический океан. Однако в позднем гадее ($\square 4,0$ млрд лет назад) поверхностные условия резко изменились. Модели термической эволюции показывают, что земные температуры постепенно снижались после термического максимума $\square 4,4$ млрд лет назад, поскольку плотная CO_2 -богатая атмосфера и океаны жидкой воды покрывали поверхность [45]. К концу гадея глобальные средние температуры, вероятно, были в диапазоне $**8^\circ\text{C} - 30^\circ\text{C}^{**}$ [46], стабилизированные карбонатно-силикатным циклом — глобальным термостатом, в котором вода играет центральную роль.

13.1.1 Лунный тепловой импульс: обоюдоострый меч для воды Земли

Сама Луна, сразу после своего образования и столкновения со вторым спутником, была источником интенсивного теплового излучения. С глобальным магматическим океаном при $\square 1600$ К эффективная температура Луны была сравнима с температурой маленькой звезды. Пада-

ющий тепловой поток на Землю от ранней Луны можно оценить как:

$$F_{\text{Луна}} = \sigma T_{\text{Луна}}^4 \left(\frac{R_{\text{Луна}}}{d_{\text{З-Л}}} \right)^2,$$

где $d_{\text{З-Л}}$ — расстояние Земля–Луна. Для Луны, вращающейся на расстоянии $\approx 3 \times 10^8$ м (около половины современного расстояния) и имеющей магматический океан при ≈ 1600 К, поток, получаемый Землёй, был бы порядка 50–100 Вт м⁻². Это сравнимо с вкладом солнечной постоянной в то время (слабое молодое Солнце давало ≈ 70 Вт м⁻²).

Таким образом, тот же катаклизм, который доставил воду на Землю, также произвёл продолжительный тепловой импульс от Луны. Этот внешний нагрев в сочетании с СО₂-парниковым эффектом компенсировал слабое молодое Солнце и поддерживал температуру поверхности выше точки замерзания, позволяя только что прибывшей воде оставаться жидкой. Парадоксально, но горячая Луна — которая стерилизовала бы свою собственную поверхность — действовала как гигантский инфракрасный излучатель, создавая именно те условия, которые сделали возможным существование океанов Земли.

Эта двойная роль Луны — стерилизующая печь для себя, но жизнеобеспечивающий обогреватель для Земли — является уникальным следствием YUCT-каскада и даёт дополнительное проверяемое предсказание: ранний лунный магматический океан должен был оставить отчётливый термический след в древнейших земных осадках, потенциально обнаруживаемый как систематическое смещение в палеотемпературных прокси около 4,4–4,0 млрд лет назад.

13.2 Кислотные дожди, выветривание и подъём нейтральных океанов

СО₂-богатая атмосфера делала дожди слабокислотными. Эти кислотные дожди, падая на только что возникшие участки суши, энергично выветривали силикаты, высвобождая катионы в океаны и потребляя атмосферный СО₂. Процесс был настолько эффективен, что к 4,0 млрд лет

назад pH океана уже поднялся от кислого до нейтрального или даже щелочного [47]. Таким образом, доставка воды вторым спутником не только заполнила океанские бассейны; она активировала долгосрочный климатический регулятор Земли и создала химически благоприятные условия для пребиотической химии.

13.3 Пребиотический «бульон» и возникновение жизни

Комбинация стабильной жидкой воды, нейтрального pH, обильных питательных веществ из выветривания и устойчивой гидротермальной активности (вызванной повышенными мантийными температурами гадея) создала мир, богатый органическими строительными блоками. Самые ранние геологические свидетельства жизни появляются вскоре после этого: **изотопно-лёгкий углерод в породах Исуа, Гренландия, возрастом 3,8 млрд лет** [48]. YUCT-фреймворк, следовательно, связывает одно астрофизическое событие — хаотический трёхтельный танец Земли, Луны и второго спутника — непосредственно с возникновением жизни на Земле через каскад, регулирующий температуру, химию океана и доставку необходимых летучих веществ.

13.4 Проверяемые следствия

Модель YUCT предсказывает жёсткую временную корреляцию между:

1. Стабилизацией поверхностных температур ($\approx 4,0$ –3,8 млрд лет назад),
2. Повышением pH океана до нейтральных значений ($\approx 4,0$ млрд лет назад),
3. Первыми геохимическими сигнатурами жизни ($\approx 3,8$ –3,5 млрд лет назад).

Эти предсказания могут быть проверены с помощью будущей высокоточной геохронологии и палеосредовых прокси.

Благодарности

Автор благодарит участников семинара YUCT за стимулирующие обсуждения. Эта работа была поддержана Yakushev Research.




Рис. 6: Каскад YUCT от планетарной катастрофы к мягкому климату и зарождению жизни.

Список литературы

- [1] D. M. Raup, J. J. Sepkoski, “Periodicity of extinctions in the geologic past,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* **81**(3), 801–805 (1984).
- [2] A. L. Melott, R. K. Bambach, “Nemesis reconsidered,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **407**(1), 99–104 (2010).
- [3] M. R. Rampino, R. B. Stothers, “Terrestrial mass extinctions, cometary impacts and the Sun’s motion perpendicular to the galactic plane,” *Nature* **308**, 709–712 (1984).
- [4] M. R. Rampino, K. Caldeira, “A 27.5-million-year cycle of geological activity,” *Geoscience Frontiers* **12**(6), 101245 (2021). DOI: 10.1016/j.gsf.2021.101245
- [5] M. R. Rampino, “Does the Earth have a pulse? Evidence relating to a potential underlying 26–36-million-year rhythm in interrelated geologic, biologic, and astrophysical events,” *Geoscience Frontiers* (2023). DOI: 10.1016/j.gsf.2023.101456
- [6] R. A. Muller, “The Nemesis hypothesis,” *New Scientist* (1993).
- [7] P. Schulte et al., “The Chicxulub asteroid impact and mass extinction at the Cretaceous-Paleogene boundary,” *Science* **327**(5970), 1214–1218 (2010). DOI: 10.1126/science.1177265
- [8] P. Schenk et al., “The ages of Ganymede’s dark and bright terrains: Crater size-frequency distribution analysis,” *Icarus* **168**, 352–370 (2004).
- [9] J. S. Dohnanyi, “Collisional model of asteroids and their debris,” *Journal of Geophysical Research* **74**(10), 2531–2554 (1969).
- [10] W. F. Bottke, D. Vokrouhlický, D. Nesvorný, “An asteroid breakup 160 Myr ago as the probable source of the K/T impactor,” *Nature* **449**, 48–53 (2007).
- [11] P. R. Renne, C. J. Sprain, M. A. Richards, S. Self, L. Vanderkluysen, “State shift in Deccan volcanism at the Cretaceous-Paleogene boundary, possibly induced by impact,” *Science* **350**(6256), 76–78 (2015).
- [12] M. A. Richards, W. Alvarez, S. Self, L. Karlstrom, P. R. Renne, R. A. F. Grieve, “Triggering of the largest Deccan eruptions by the Chicxulub impact,” *Geological Society of America Bulletin* **127**(11–12), 1507–1520 (2015). DOI: 10.1130/B31167.1
- [13] B. Schoene, M. P. Eddy, K. M. Samperton, C. B. Keller, G. Keller, T. Adatte, K. Khadri, “U-Pb constraints on pulsed eruption of the Deccan Traps across the end-Cretaceous mass extinction,” *Science* **363**(6429), 862–866 (2019).
- [14] C. J. Sprain, P. R. Renne, L. Vanderkluysen, K. Pande, S. Self, T. Mittal, “The eruptive tempo of Deccan volcanism in relation to the Cretaceous-Paleogene boundary,” *Science* **363**(6429), 866–870 (2019).
- [15] S. D. Burgess, S. A. Bowring, S.-Z. Shen, “High-precision geochronology confirms voluminous magmatism before, during, and after Earth’s most severe extinction,” *Science Advances* **1**(7), e1500470 (2015).

- [16] S. D. Burgess, S. Bowring, S.-Z. Shen, “High-precision timeline for Earth’s most severe extinction,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* **111**(9), 3316–3321 (2014).
- [17] H. C. Jenkyns, “Geochemistry of oceanic anoxic events,” *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* **11**(3), Q03004 (2010).
- [18] S. Kolonic, T. Wagner, A. Forster, J. S. Sinninghe Damsté, “Black shale deposition on the northwest African Shelf during the Cenomanian/Turonian oceanic anoxic event: Climate coupling and global organic carbon burial,” *Paleoceanography* **20**(1), PA1006 (2005).
- [19] Q. Simon, N. Thouveny, D. L. Bourlès, J. Valet, F. Bassinot, “Cosmogenic ^{10}Be production records reveal dynamics of geomagnetic dipole moment (GDM) over the Laschamp excursion (20–60 ka),” *Earth and Planetary Science Letters* **550**, 116547 (2020).
- [20] D. Jablonski, “Extinctions: A paleontological perspective,” *Science* **253**(5021), 754–757 (1991).
- [21] I. H. Campbell, C. M. Allen, “Supermountains and the rise of atmospheric oxygen,” *Nature Geoscience* **1**, 554 (2008).
- [22] M. R. Rampino, K. Caldeira, “Periodic impact cratering and extinction events over the last 260 million years,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **454**(4), 3480–3484 (2015). DOI: 10.1093/mnras/stv2088
- [23] J. J. Matese, D. P. Whitmire, “Persistent evidence of a jovian mass solar companion in the Oort cloud,” *Icarus* **211**(2), 926–938 (2011).
- [24] D. P. Whitmire, J. J. Matese, “New constraints on the Nemesis hypothesis from the WISE survey,” *Icarus* **400**, 115654 (2025).
- [25] N. R. Crumpler, V. Chandra, N. L. Zakamska, “Detection of the temperature dependence of the white dwarf mass-radius relation with gravitational redshifts,” *The Astrophysical Journal* **977**, 237 (2024). DOI: 10.3847/1538-4357/ad8ddc
- [26] M. L. Lantink, J. H. F. L. Davies, M. Ovtcharova, F. J. Hilgen, “Milankovitch cycles in banded iron formations constrain the Earth-Moon system 2.46 billion years ago,” *Nature Geoscience* **15**, 571–576 (2022).
- [27] M. Farhat, P. Auclair-Desrotour, G. Boué, J. Laskar, “The resonant tidal evolution of the Earth-Moon distance,” *Astronomy & Astrophysics* **665**, A108 (2022).
- [28] S. Rosat, C. Gaugne Gouranton, I. Panet, M. Manda, “GRACE detection of transient mass redistributions during a mineral phase transition in the deep mantle,” *Geophysical Research Letters* **52**, e2025GL116408 (2025). DOI: 10.1029/2025GL116408
- [29] Planck Collaboration, “Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters,” *Astronomy & Astrophysics* **641**, A6 (2020).
- [30] D. Nesvorný, W. F. Bottke, L. Dones, H. F. Levison, “The recent breakup of an asteroid in the main-belt region,” *Nature* **417**, 720–722 (2002).
- [31] D. Tamayo, H. Rein, P. Shi, D. M. Hernandez, “ASSIST: An ephemeris-quality test-particle integrator,” *The Planetary Science Journal* **4**, 69 (2020).
- [32] T. Rehren, L. Belmonte, A. Pankhurst, L. Schiavon, D. A. Scott, J. W. Taylor, “5,000 years old Egyptian iron beads from Gerzeh were made from hammered meteoritic iron,” *Journal of Archaeological Science* **40**, 4785–4792 (2013).
- [33] B. Hofmann, S. Schreyer, S. A. Sorensen, F. R. R. P. de Meijer, “The Mörigen arrowhead — an iron meteorite found in a Bronze Age lake dwelling,” *Journal of Archaeological Science* **156**, 105800 (2023).
- [34] M. Jutzi, E. Asphaug, “The Moon’s far side dichotomy explained by a low-velocity collision with a companion moon,” *Nature* **476**, 69–72 (2011).
- [35] A. A. Gardiner, R. J. Walker, A. L. D. Kilburn, “Native hydrogen in enstatite chondrite LAR 12252: Implications for Earth’s water delivery,” *Icarus* (принято, 2025).

- [36] M. R. Rampino, *Cataclysms: A New Geology for the Twenty-First Century*, Columbia University Press (2017).
- [37] A. V. Yakushev, “Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT),” Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [38] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [39] A. V. Yakushev, “Appendix P: Temperature Dependence of Gravity — Observational Confirmation and Theoretical Foundation within the Coordination Paradigm (YUCT),” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [40] A. V. Yakushev, “Appendix W: Passive Gravitational Tomography of Planetary Interiors Using Tidal Waves — A Coordination-Based Approach,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [41] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT — A Derivation from First Principles,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [42] A. V. Yakushev, “Appendix Ω : The Global Rotation of the Universe and Its New Minimum Age from the Dipole Turning Radius,” в *YUCT*, Zenodo (2026).
- [43] D. P. Whitmire, J. J. Matese, “Periodic comet showers and the Nemesis hypothesis,” *Nature* **313**, 36–38 (1985).
- [44] D. Kirkpatrick et al., “The field brown dwarf population and the WISE survey,” *Astrophysical Journal Supplement* **253**, 7 (2021).
- [45] J. Korenaga, “Earth’s thermal evolution, mantle convection, and Hadean onset of plate tectonics,” *Earth and Planetary Science Letters* **145**, 334–348 (2017).
- [46] B. Charnay, G. Le Hir, F. Fluteau, F. Forget, D. C. Catling, “A warm or a cold early Earth? New insights from a 3-D climate-carbon model,” *Earth and Planetary Science Letters* **474**, 97–109 (2017).
- [47] J. Krissansen-Totton, G. Arney, D. C. Catling, “Ocean pH, atmospheric CO₂, and habitability of the early Earth,” *AGU Fall Meeting* PP53B-06 (2019).
- [48] N. T. Arndt, E. G. Nisbet, “Processes on the Young Earth and the Habitats of Early Life,” *Annual Review of Earth and Planetary Sciences* **40**, 521–549 (2012).
- [49] H. Gamaleldien et al., “Four-billion-year-old zircons reveal early fresh water and emerged continental crust,” *Nature Geoscience* (2024). DOI: 10.1038/s41561-024-01450-0
- [50] P. A. Bland, “Panspermia: A viable hypothesis?” *Astronomy & Geophysics* **58**(5), 5.24–5.28 (2017).
- [51] M. Maurice, N. Tosi, S. Schwinger, D. Breuer, T. Kleine, “The longevity of a lunar magma ocean: Implications for the Moon’s thermal and magnetic evolution,” *Journal of Geophysical Research: Planets* **125**, e2019JE006152 (2020). DOI: 10.1029/2019JE006152
- [52] Wikipedia, “Chemolithoautotroph,” <https://en.wikipedia.org/wiki/Chemolithoautotroph> (доступ 2026).
- [53] N. Kitadai, S. Maruyama, “Onset of plate tectonics and the origin of life: A view from the Hadean,” *Geoscience Frontiers* **9**(4), 1105–1122 (2018). DOI: 10.1016/j.gsf.2017.05.005
- [54] K. O. Stetter, “Hyperthermophilic procaryotes,” *FEMS Microbiology Reviews* **18**(2-3), 149–158 (1996).
- [55] F. Namouni, H. Christophe, “On the stability of co-orbital motion of Janus and Epimetheus,” *Astronomy & Astrophysics* **434**, 1179–1186 (2005).
- [56] P. Kearey, K. A. Klepeis, F. J. Vine, *Global Tectonics*, 3-е изд., Wiley-Blackwell (2013).
- [57] S. Sahijpal, V. Goyal, “Thermal evolution of the early Moon,” *Meteoritics & Planetary Science* **53**(10), 2193–2210 (2018). DOI: 10.1111/maps.13119

- [58] L. Colin, M. Maurice, N. Tosi, et al., “Thermal evolution of the lunar magma ocean,” *Earth and Planetary Science Letters* **648**, 119072 (2024). DOI: 10.1016/j.epsl.2024.119072
- [59] M. Maurice, N. Tosi, S. Schwinger, et al., “A long-lived lunar magma ocean,” *AGU Fall Meeting Abstracts*, P43C-06 (2018).
- [60] M. Maurice, N. Tosi, S. Schwinger, et al., “A long-lived magma ocean on a young Moon,” *Science Advances* **6**(28), eaba8949 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aba8949
- [61] K. J. Zahnle, R. Lupu, D. C. Catling, “The evolution of a steam atmosphere after a giant impact,” *AGU Fall Meeting* P51A-1920 (2015).
- [62] K. J. Zahnle, N. Arndt, C. Cockell, et al., “Emergence of a habitable planet,” *Space Science Reviews* **129**(1-3), 35–78 (2007). DOI: 10.1007/s11214-007-9225-z
- [63] G. Feulner, “The faint young Sun problem,” *Reviews of Geophysics* **50**(2), RG2006 (2012). DOI: 10.1029/2011RG000375
- [64] R. M. Canup, “Lunar-forming impacts: processes and alternatives,” *Philosophical Transactions of the Royal Society A* **372**(2024), 20130175 (2014). DOI: 10.1098/rsta.2013.0175