

CURS 5

FORMĂ NORMALĂ CONJUNCTIVĂ / DISJUNCTIVĂ

- Literal = variabila (literal pozitiv) sau negația unei variabile (literal negativ)
- FND = formă normală disjunctivă e o formulă φ care e o disjuncție de conjuncții literale
- $\varphi = \bigvee_{i=1}^m \left(\bigwedge_{j=1}^{k_i} L_{ij} \right)$, unde L_{ij} = literal (FND)
- FNC = formă normală conjunctivă e o formulă φ care e o conjuncție de disjuncții de literali
- $\varphi = \bigwedge_{i=1}^m \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{ij} \right)$, unde L_{ij} = literal (FNC)
- $F_{\varphi} : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}$
 $F_{\varphi}(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) = \varepsilon_{\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m}(\varphi)$ pt orice $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_m) \in \{0, 1\}^m$
- φ formulă $\Rightarrow \models \varphi \Leftrightarrow F_{\varphi}$ e funcția constantă 1
 $\Rightarrow \varphi$ satisfiabilă $\Leftrightarrow F_{\varphi}$ e funcția constantă 0
- φ, ψ formule a.î. $\text{Var}(\varphi) = \text{Var}(\psi) \Rightarrow \varphi \models \psi \Leftrightarrow F_{\varphi} \leq F_{\psi}$
 $\Rightarrow \varphi \sim \psi \Leftrightarrow F_{\varphi} = F_{\psi}$
- $\exists \varphi, \psi$ formule diferite \Rightarrow a.î. $F_{\varphi} = F_{\psi}$
- Funcția booleană : $f : \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}$, $m \geq 1$ = nr. var. lui f
- φ formulă, F_{φ} funcție booleană cu m var $\Rightarrow m = |\text{Var}(\varphi)|$

⊢ $H: \{0,1\}^m \rightarrow \{0,1\}$ funcție booleană

∃ φ formulă în FND a.1. $H = \bar{F}\varphi$ (sau FNC analog)

∀ φ formulă e echiv. cu φ^{FND} în FND și cu φ^{FNC} în FNC

CLAUZE ȘI REZOLUTIE

• Clauză = mulțime finită de literali

$$C = \{L_1, L_2, \dots, L_m\} \rightarrow L = \text{literali}$$

• dacă $m=0 \Rightarrow C := \emptyset$ clauză vidă

• C clauză și $e: V \rightarrow \{0,1\} \Rightarrow e \models C$ dacă $\exists L \in C$ a.1. $e \models L$

• C clauză \Rightarrow satisfiabilă dacă are un model

\Rightarrow validă dacă $\forall \text{val. } e: V \rightarrow \{0,1\}$ e model al lui C

• $\text{Var}(C) := \{x \in V \mid x \in C \text{ sau } \neg x \in C\}; x \in C \Leftrightarrow x \text{ apare în } C$

• $S = \{C_1, C_2, \dots, C_m\}$ mulțime finită de clauze, FNC

$$m=0 \Rightarrow S = \emptyset$$

• $e: V \rightarrow \{0,1\}$, $e \models S$ dacă $e \models C_i \forall i \in \{1, 2, \dots, m\}$

• S satisfiabilă dacă are un model

→ validă dacă orice $e: V \rightarrow \{0,1\}$ e model al lui S ($\neq \emptyset$)

→ mesatisfiabilă dacă conține clauză vidă \square

$$\text{Var}(S) = \bigcup_{C \in S} \text{Var}(C)$$

$$\text{Var}(S) = \emptyset \Leftrightarrow S = \emptyset \text{ sau } S = \{\square\}$$

$$e: V \rightarrow \{0,1\}; e \models \varphi \Leftrightarrow e \models S_\varphi$$

- $\varphi = \bigwedge_{i=1}^m \left(\bigvee_{j=1}^{k_i} L_{ij} \right)$: L_{ij} literal

Ci clauza obținută considerând toate $L_{ij} \in \{1, \dots, k_i\}$ \Rightarrow

S_φ = mulțimea tuturor clauzelor C_i distincte

$\Rightarrow S_\varphi$ = forma clauzală a lui φ

- $C = \{L_1, L_2, \dots, L_m\}$, $m \geq 1 \mapsto \varphi_C = L_1 \vee L_2 \vee \dots \vee L_m$

$\square \mapsto \varphi_\square = V_0 \wedge \neg V_0$

- $S = \{C_1, C_2, \dots, C_m\} \neq \emptyset \Rightarrow \varphi_S = \bigwedge_{i=1}^m \varphi_{C_i}$

- $e: V \rightarrow \{0, 1\}$, $e \models S \Leftrightarrow e \models \varphi_S$

- R = rezolvent : C_1, C_2 = clauze dacă $\exists L$ a.î. $L \in C_1, L^c \in C_2$

$\text{și } R = (C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L^c\})$

- Regula rezoluției : $\text{Rez} = \frac{C_1, C_2}{(C_1 \setminus \{L\}) \cup (C_2 \setminus \{L^c\})}$

- $\text{Res}(C_1, C_2)$ = mulțimea rezolvenților clauzelor C_1 și C_2

- \emptyset S-derivare prin rezoluție = secvență de clauze C_1, C_2, \dots, C_m

a.î. pt fiecare $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ una din cele 2 condiții e satisf.

- C_i din S

- $\exists j, k < i$ a.î. C_i rezolvent al C_j și C_k

- $\text{Res}(S) = \bigcup_{C_1, C_2 \in S} \text{Res}(C_1, C_2)$

- $e: V \rightarrow \{0, 1\}$, $e \models S \Rightarrow e \models \text{Res}(S)$

T Teorema de corectitudine a rezoluției

Dacă \square se derivează prin rezoluție din S \Rightarrow S inconsistent.

ALGORITHM DAVIS - PUTNAM

- Initialize: $i := 1$, $S_i := S$, $S = \text{mult. limită nevidă}$
- Pi.1: $x_i \in S_i$
 $T_i^1 := \{C \in S_i \mid x_i \in C\}$, $T_i^0 := \{C \in S_i \mid \neg x_i \in C\}$
- Pi.2: if $(T_i^1 \neq \emptyset \text{ și } T_i^0 \neq \emptyset)$ then
 $U_i := \{(C_1 \setminus \{x_i\}) \cup (C_0 \setminus \{\neg x_i\}) \mid C_1 \in T_i^1, C_0 \in T_i^0\}$
else $U_i = \emptyset$
- Pi.3: $S_{i+1} := (S_i \setminus (T_i^0 \cup T_i^1)) \cup U_i$
 $S_{i+1} := S_{i+1} \setminus \{C \in S_{i+1} \mid C \text{ trivială}\}$
- Pi.4: if $S_{i+1} = \emptyset$ then
 S satisfiabilă
else if $\Box \in S_{i+1}$ then
 S nesatisfiabilă
else
 $\{i := i+1; \text{ go to Pi.1}\}$