produced in the form of the state of the sta Espectros de emisionis Don parlos qui se obtienen al discomponer las rodio vones, enchosos por un cuerpo pariamente excitado es, Los espectros de enision continuo se obtiene al pasar las relaciones de radiaciones por un cualquier solido incandicientes por un prisma La lez blanca produce al disconponerla lo que llangues un espectro continue que contiene el conjunto de colons que corresponde a la gana de longitudes de onda que la integran I ran a mand of anisocities pa or make Espectro continuo Cuerpo reigni Espectro de emisión Espectro de absorción Gas frie. Los espectios de emisión discontinvos se obtienen al pasar la luz de vapor o gas excitado, las radiaciones imitidas son carachenshies de los atomos excitados

10/sections Alexas Israel Miranda Reyus Dura espectuales. Las diferentes lineas que apareceron en el espectio del hidragino se podrian ogrupas en diterentes, senes cuya longitud de ondas es mas paricila: ROJO VERDE AZUL ESPECTRO VISIBLE 6.七七七七七年后在在在在在在西西西西南南南南南南北南南南 ESPECTRO DEL HIDRÓGENO ESPECTRO DEL MERCURIO ESPECTRO DEL SODIO Sine Lyman: Long ultravioleta del espectio Serie Balmer. Zona visible del espectro Serie Pagchen: Zona intrarroja del especto Since Brookli Zona intravoja del espectio Since Pland: Zona intrarroja del espectio Siru Pfund: Zona infravous del espectro

Alexis Israel Miranda Regis 18 /sip/2024 Etecto de obsercion: PSI como invitos importantes describamientos científicos les observaciones de Fraunhofer sobre les lines espectuales del 501 for completenente accidental, el no estaba nada de est fipo; simplimente estaba probando prismas que el habia hecho Conside la restriction atraviera un gas, nete absente una parte del megestro. El resultado es su especteu caracterínstico de absorción, donde fattan las berefes absorbides, appreciateds an extinger fraces negras.