

Introducción a la psicofarmacología

Dr. Andréé Salvatierra



Propósito

Comprender los elementos centrales
de la psicofarmacología asociados a
síndromes clínicos




Psicofarmacología

Rama de la farmacología que estudia cómo los fármacos actúan sobre el sistema nervioso, basada en el estudio de la neurotransmisión química




Biomolécula que permite la transmisión de información desde una neurona a otra, produciendo un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica

Neurotransmisores



Los **neurotransmisores (llaves)** son vertidos en la sinapsis y encajan con los **receptores** de la neurona (**cerraduras**) con la que tengan afinidad




Al arribar el neurotransmisor específico, abre el receptor y **provoca una acción inhibitoria/excitatoria**(disparo a la siguiente neurona)

BALANCE

=

HOMEOSTASIS





TRASTORNO


Psicofármaco

Sustancia/elemento que actúa como un duplicado de llaves, capaz de interactuar sobre receptores y desencadenar un efecto

- ❑ Todos los fármacos actúan a nivel de neurotransmisión.
- ❑ El neurotransmisor se asemeja a una llave endógena.
- ❑ Fármaco como un duplicado de la llave sintética



Disminuyen el tono
psíquico



Estimulan el
tono psíquico

Caso

Benjamín , 47 años

Consumo diario de alcohol desde hace 5 años (actualmente 5 cervezas/día). Ha intentado dejar el alcohol en varias ocasiones sin éxito. Al pasar un día sin beber presenta temblor, sudoración, ansiedad e irritabilidad (síndrome de abstinencia). Ha tenido repercusión familiar y laboral.

Trastorno por consumo de alcohol (6C40.2)

Abstinencia aguda

Hiperactividad del SNS

El alcohol suprime el SNC. Al suspenderlo, hay rebote adrenérgico: el SNS se dispara sin freno.

Dependencia

Dopamina

OH activa opioides endógenos (μ) $\rightarrow$ desinhibición de neuronas dopaminérgicas en el VTA $\rightarrow$ $\uparrow$ DA en Nac

Desintoxicación

Diazepam 5–10 mg / 8 h

$\uparrow$ receptor GABA_a $\rightarrow$ potencia la inhibición del SNC $\rightarrow$ suprime el rebote simpático.

Deshabituaación

Naltrexona 50 mg / día

Bloquea R. μ $\rightarrow$ impide la desinhibición de neuronas DA en VTA $\rightarrow$ $\downarrow$ DA en Nac $\rightarrow$ $\downarrow$ craving y refuerzo positivo.



Conclusiones

1. Los psicofármacos son sustancias que actúan a nivel de la neurotransmisión en el SNC.
2. Actúan a nivel de los NT como llaves naturales capaces de abrir receptores y producir respuestas celulares.
3. Los psicofármacos son como “llaves duplicadas”, actúan regulando alteraciones neuroquímicas asociadas a trastornos psiquiátricos.

