

氨基酸评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
赖氨酸	0.253-0.659	0.455	正常(-)
色氨酸	2.374-3.709	5.832	中度异常(++)
苯丙氨酸	0.731-1.307	1.207	正常(-)
蛋氨酸(甲硫氨酸)	0.432-0.826	0.634	正常(-)
苏氨酸	0.422-0.817	0.903	轻度异常(+)
异亮氨酸	1.831-3.248	3.064	正常(-)
亮氨酸	2.073-4.579	5.544	轻度异常(+)
缬氨酸	2.012-4.892	3.364	正常(-)
组氨酸	2.903-4.012	4.355	轻度异常(+)
精氨酸	0.71-1.209	1.056	正常(-)

参考标准:

正常(-) 轻度异常(+)

中度异常(++)

重度异常(+++)

赖氨酸:	0.253-0.659(-)	0.659-0.962(+)
	0.962-1.213(++)	> 1.213(+++)
色氨酸:	2.374-3.709(-)	3.709-4.978(+)
	4.978-6.289(++)	> 6.289(+++)
苯丙氨酸:	0.731-1.307(-)	1.307-1.928(+)
	1.928-2.491(++)	> 2.491(+++)
蛋氨酸(甲硫氨酸):	0.432-0.826(-)	0.826-1.245(+)
	1.245-1.637(++)	> 1.637(+++)
苏氨酸:	0.422-0.817(-)	0.817-1.194(+)
	1.194-1.685(++)	> 1.685(+++)
异亮氨酸:	1.831-3.248(-)	3.248-4.582(+)
	4.582-5.657(++)	> 5.657(+++)
亮氨酸:	2.073-4.579(-)	4.579-6.982(+)
	6.982-9.256(++)	> 9.256(+++)
缬氨酸:	2.012-4.892(-)	4.892-6.982(+)
	6.982-9.677(++)	> 9.677(+++)
组氨酸:	2.903-4.012(-)	4.012-5.113(+)
	5.113-6.258(++)	> 6.258(+++)
精氨酸:	0.71-1.209(-)	1.209-1.812(+)

参数说明
赖氨酸 促进大脑发育，是肝及胆的组成成分，能促进脂肪代谢，调节松果腺、乳腺、黄体及卵巢，防止细胞退化赖氨酸为碱性必需氨基酸。由于谷物食品中的赖氨酸含量甚低，且在加工过程中易被破坏而缺乏，故称为第一限制性氨基酸。缺乏赖氨酸的症状包括疲劳，虚弱，恶心，呕吐，头晕，没有食欲，发育迟缓，贫血等。可以在医疗专业人员建议下采取赖氨酸营养补品。赖氨酸每日的建议摄入量是儿童每磅体重10毫克，成年人每天在3000-9000毫克之间。赖氨酸是帮助其它营养物质被人体充分吸收和利用的关键物质，人体只有补充了足够的赖氨酸才能提高食物蛋白质的吸收和利用，达到均衡营养，促进生长发育。赖氨酸可以调节人体代谢平衡。赖氨酸为合成肉碱提供结构组分，而肉碱会促使细胞中脂肪酸的合成。往食物中添加少量的赖氨酸，可以刺激胃蛋白酶与胃酸的分泌，提高胃液分泌功效，起到增进食欲、促进幼儿生长与发育的作用。赖氨酸还能提高钙的吸收及其在体内的积累，加速骨骼生长。如缺乏赖氨酸，会造成胃液分泌不足而出现厌食、营养性贫血，致使中枢神经受阻、发育不良。
色氨酸 促进胃液及胰液的产生色氨酸可转化生成人体大脑中的一种重要神经传递物质----5-羟色胺，而5-羟色胺有中和肾上腺素与去甲肾上腺素的作用，并可改善睡眠的持续时间。当动物大脑中的5-羟色胺含量降低时，表现出异常的行为，出现神经错乱的幻觉以及失眠等。此外，5-羟色胺有很强的血管收缩作用，可存在于许多组织，包括血小板和肠粘膜细胞中，受伤后的机体会通过释放5-羟色胺来止血。医药上常将色氨酸用作抗闷剂、抗痉挛剂、胃分泌调节剂、胃粘膜保护剂和强抗昏迷剂等。
苯丙氨酸 参与消除肾及膀胱功能的损耗苯丙氨酸是人体必须的氨基酸之一，经食物摄取后，部分用于合成蛋白质，其余部分经肝脏苯丙氨酸羟化酶的作用转变为酪氨酸，进而转化为其他生理活性物质。
蛋氨酸(甲硫氨酸) 参与组成血红蛋白、组织与血清，有促进脾脏、胰脏及淋巴的功能蛋氨酸是含硫必需氨基酸，与生物体内各种含硫化合物的代谢密切相关。当缺乏蛋氨酸时，会引起食欲减退、生长减缓或不增加体重、肾脏肿大和肝脏铁堆积等现象，最后导致肝坏死或纤维化。
苏氨酸 有转变某些氨基酸达到平衡的功能苏氨酸的结构中含有羟基，对人体皮肤具有持水作用，与寡糖链结合，对保护细胞膜起重要作用，在体内能促进磷脂合成和脂肪酸氧化。其制剂具有促进人体发育抗脂肪肝药用效能，是复合氨基酸输液中的一个成分。同时，苏氨酸又是制造一类高效低过敏的抗生素--单酰胺菌素的原料。
异亮氨酸 参与胸腺、脾脏及脑下腺的调节以及代谢缬氨酸、亮氨酸与异亮氨酸均属支链氨基酸，同时都是必需氨基酸。异亮氨酸能治疗神经障碍、食欲减退和贫血，在肌肉蛋白质代谢中也极为重要。
亮氨酸 作用平衡异亮氨酸亮氨酸可用于诊断和治疗小儿的突发性高血糖症，也可用作头晕治疗剂及营养滋补剂。
缬氨酸

作用于黄体、乳腺及卵巢当缬氨酸不足时，大鼠中枢神经系统功能会发生紊乱，供给失调而出现四肢震颤。通过解剖切片脑组织，发现有红核细胞变性现象，晚期肝硬化病人因肝功能损害，易形成高胰岛素血症，致使血中支链氨基酸减少，支链氨基酸和芳香族氨基酸的比值由正常人的3.0~3.5降至1.0~1.5，故常用缬氨酸等支链氨基酸的注射液治疗肝功能衰竭等疾病。此外，它也可作为加快创伤愈合的治疗剂。

组氨酸

作用于代谢的调节组氨酸的咪唑基能与Fe²⁺或其他金属离子形成配位化合物，促进铁的吸收，因而可用于防治贫血。组氨酸能降低胃液酸度，缓和胃肠手术的疼痛，减轻妊娠期呕吐及胃部灼热感，抑制由植物神经紧张而引起的消化道溃烂，对过敏性疾病，如哮喘等也有功效。此外，组氨酸可扩张血管，降低血压，临床上用于心绞痛、心功能不全等疾病的治疗。类风湿性关节炎患者血中组氨酸含量显著减少，使用组氨酸后发现其握力、走路与血沉等指标均有好转。成人可以合成组氨酸，10岁以下儿童不能合成，所以十岁以下儿童对组氨酸的需求应由食物供给。

精氨酸

促进伤口愈合，精子蛋白成分精氨酸是鸟氨酸循环中的一个组成成分，具有极其重要的生理功能。多吃精氨酸，可以增加肝脏中精氨酸酶的活性，有助于将血液中的氨转变为尿素而排泄出去。所以，精氨酸对高氨血症、肝脏机能障碍等疾病颇有效果。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。