

内分泌系统评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
甲状腺分泌指数	2.954-5.543	2.53	轻度异常(+)
甲状旁腺分泌指数	2.845-4.017	3.268	正常(-)
肾上腺分泌指数	2.412-2.974	2.454	正常(-)
垂体分泌指数	2.163-7.34	4.53	正常(-)
松果体分泌指数	3.21-6.854	5.428	正常(-)
胸腺分泌指数	2.967-3.528	2.799	轻度异常(+)
性腺分泌指数	2.204-2.819	2.633	正常(-)

参考标准: 正常(-) 轻度异常(+)
中度异常(++) 重度异常(+++)

甲状腺分泌指数:	5.543-2.954(-)	2.954-1.864(+)
	1.864-0.514(++)	<0.514(+++)
甲状旁腺分泌指数:	4.017-2.845(-)	2.845-1.932(+)
	1.932-1.134(++)	<1.134(+++)
肾上腺分泌指数:	2.974-2.412(-)	2.412-1.976(+)
	1.976-1.433(++)	<1.433(+++)
垂体分泌指数:	7.34-2.163(-)	2.163-1.309(+)
	1.309-0.641(++)	<0.641(+++)
松果体分泌指数:	6.854-3.21(-)	3.21-2.187(+)
	2.187-0.966(++)	<0.966(+++)
胸腺分泌指数:	3.528-2.967(-)	2.967-2.318(+)
	2.318-1.647(++)	<1.647(+++)
性腺分泌指数:	2.819-2.204(-)	2.204-1.717(+)
	1.717-1.028(++)	<1.028(+++)

参数说明

甲状腺分泌指数

甲状腺是内分泌系统的一个重要器官，它和人体其它系统(如呼吸系统等)有着明显的区别，但和神经系统紧密联系，相互作用，相互配合，被称为两大生物信息系统，没有它们的密切配合，机体的内环境就不能维持相对稳定。内分泌系统包括许多内分泌腺，这些内分泌腺受到适宜的神经刺激，可以使这些内分泌腺的某些细胞释放出高效的化学物质，这种化学物质经血液循环被送到远距离的相应器官，发挥其调节作用，这种高效的化学物质就是我们平常所说的激素。甲状腺是人体内分泌系统中最大的内分泌腺，它受到神经刺激后分泌甲状腺激素，作用于人体相应器官而发挥生理效应。
甲状旁腺分泌指数 甲状旁腺素主要功能是影响体内质钙与磷的代谢，使血液中钙离子浓度增高，同时还作用于肠及肾小管，使钙的吸收增加，从而维持血钙的稳定。若甲状旁腺分泌功能低下，血钙浓度降低，出现手足抽搐症；如果功能亢进，则引起骨质过度吸收，容易发生骨折。甲状旁腺功能失调会引起血中钙与磷的比例失常。
肾上腺分泌指数 肾上腺内部是髓质部分，分泌肾上腺素和去甲肾上腺素。这些激素在应激状态释放增多，能够帮助升高血压，加快心率，升高血糖，动员全身的储备物质，为机体与外界环境的抗争作好充分准备。因此，肾上腺是人体的一个重要的腺体。它的所有活动，受到垂体和神经中枢的双重精细调节。比如，醛固酮的分泌受到肾脏肾素的调节，皮质醇和雄激素的分泌受到垂体ACTH的调节。肾上腺素和去甲肾上腺素受到交感神经系统的调节。
垂体分泌指数 垂体是人体最重要的内分泌腺，分前叶和后叶两部分。它分泌多种激素，如生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺素、催产素、催乳素、黑色细胞刺激素等，还能够贮藏下丘脑分泌的抗利尿激素。这些激素对代谢、生长、发育和生殖等有重要作用。
松果体分泌指数 松果体细胞接受颈上神经节发出的交感神经节后纤维的支配，刺激交感神经，可促进松果体合成和分泌褪黑激素。松果体的分泌机能与光照有密切的关系，持续光照可导致松果体变小，抑制松果体细胞的分泌，而黑暗对松果体的分泌起促进作用。由于褪黑激素的分泌与合成受光照与黑暗的调节，因此，它的分泌量出现昼夜节律变化。在人的血浆中，当中午十二点钟时，其分泌量最低，而在午夜零点时，分泌量最高。另外，它的周期性分泌与动物和人的性周期及月经周期有明显的关系。松果体可能通过褪黑激素的分泌周期向中枢神经系统发放“时间信号”，从而影响机体时间生物效应，如睡眠与觉醒，特别是丘脑-垂体-性腺轴的周期性活动。
胸腺分泌指数 胸腺是一个淋巴器官兼有内分泌功能。在新生儿和幼儿时期胸腺发达，体积较大，性成熟以后，逐渐萎缩、退化。胸腺分为左、右两叶，不对称，成人胸腺约25~40克，色灰红，质柔软，主要位于上纵隔的前部。胸腺在胚胎期是造血器官，在成年期可造淋巴细胞、浆细胞和髓细胞。胸腺的网状上皮细胞可分泌胸腺素，它可促进具有免疫功能的T细胞的产生和成熟，并能抑制运动神经末梢的乙酰胆碱的合成与释放。因此，当胸腺瘤时，因胸腺素增多，可导致神经肌肉传导障碍而出现重症肌无力。
性腺分泌指数 性腺主要指男性的睾丸、女性的卵巢。睾丸可分泌男性激素睾丸酮(睾酮)，其主要功能是促进性腺及其附属结构的发育以及副性征的出现，还有促进蛋白质合成的作用。卵巢可分泌卵泡素、孕酮、松弛素和女性激素。其功能分别是：(1)刺激子宫内膜增生，促使子宫增厚、乳腺变大和出现女副性征等。(2)促进子宫上皮和子宫腺的增生，保持体内水、钠、钙的含量，并能降血糖，升高体温。(3)促进宫颈和耻骨联合韧带松弛，有利于分娩。(4)促使女性出现男性化的副性征等。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。