

重金属评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
铅	0.052-0.643	0.138	正常(-)
汞	0.013-0.336	0.322	正常(-)
镉	0.527-1.523	1.272	正常(-)
铬	0.176-1.183	0.559	正常(-)
砷	0.153-0.621	0.49	正常(-)
铈	0.162-0.412	0.263	正常(-)
铊	0.182-0.542	0.432	正常(-)

参考标准:

正常(-)

轻度异常(+)

中度异常(++)

重度异常(+++)

铅:	0.052-0.643(-)	0.643-1.005(+)
	1.005-1.582(++)	>1.582(+++)
汞:	0.013-0.336(-)	0.336-0.721(+)
	0.721-1.043(++)	>1.043(+++)
镉:	0.527-1.523(-)	1.523-1.932(+)
	1.932-2.146(++)	>2.146(+++)
铬:	0.176-1.183(-)	1.183-1.843(+)
	1.843-2.663(++)	>2.663(+++)
砷:	0.153-0.621(-)	0.621-1.243(+)
	1.243-1.945(++)	>1.945(+++)
铈:	0.162-0.412(-)	0.412-0.885(+)
	0.885-1.374(++)	>1.374(+++)
铊:	0.182-0.542(-)	0.542-1.133(+)
	1.133-1.721(++)	>1.721(+++)

参数说明

铅

一般认为血铅的相对安全标准不应超过10微克~14微克/升; 长期接触铅化合物或吸入金属铅尘埃, 都会引起不同程度的[铅中毒]病症(血清中铅浓度大于40微克/升); 人体吸入过多会危害人的神经系统、心脏和呼吸系统, 导致不同程度的铅中毒; 人体中, 铅能与多种酶结合从而干扰有机体多方面的生理活动, 导致对全身器官产生危害; 儿童发生铅中毒的机会远远超过成年人。

汞

汞食入后直接沉入肝脏，对大脑、视力神经破坏极大，对人体的危害主要累及中枢神经系统、消化系统及肾脏，此外对呼吸系统、皮肤、血液及眼睛也有一定的影响。
镉 镉会对呼吸道产生刺激，长期暴露会造成嗅觉丧失症、牙龈黄斑或渐成黄圈，镉化合物不易被肠道吸收，但可经呼吸被体内吸收，积存于肝或肾脏造成危害，尤以对肾脏损害最为明显。特别具使骨骼的代谢受阻，造成骨质疏松、萎缩、变形等一系列症状。
铬 自然界铬主要以三价铬和六价铬的形式存在。六价铬对人主要是慢性毒害，它可以通过消化道、呼吸道、皮肤和粘膜侵入人体，在体内主要积聚在肝、肾和内分泌腺中。通过呼吸道进入的则易积存在肺部。六价铬有强氧化作用，所以慢性中毒往往以局部损害开始逐渐发展到不可救药。经呼吸道侵入人体时，开始侵害上呼吸道，引起鼻炎、咽炎和喉炎、支气管炎。
砷 砷侵入人体后，除由尿液、消化道、唾液、乳腺中排泄外，就蓄积于骨质疏松部、肝、肾、脾、肌肉、头发、指甲等部位。砷作用于神经系统、刺激造血器官，长时期的少量侵入人体，对红血球生成有刺激影响，长期接触砷会引发细胞中毒和毛细管中毒，还可能诱发恶性肿瘤。
铊 铊是银白色天然金属，会刺激人的眼、鼻、喉咙及皮肤，持续接触可破坏心脏及肝脏功能，吸入高含量的铊会导致铊中毒，症状包括呕吐、头痛、呼吸困难，严重者可能死亡。
铊 为强烈的神经毒物，对肝、肾有损害作用。吸入、口服可引起急性中毒；可经皮肤吸收。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。