

眼部评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
眼袋	0.51-3.109	1.57	正常(-)
眼皱胶原	2.031-3.107	0.861	中度异常(++)
黑眼圈	0.831-3.188	4.171	轻度异常(+)
淋巴阻塞	1.116-4.101	2.766	正常(-)
松弛下垂	0.233-0.559	0.881	轻度异常(+)
浮肿	0.332-0.726	0.621	正常(-)
眼周细胞活性	0.118-0.892	1.123	轻度异常(+)
视力疲劳	2.017-5.157	7.995	轻度异常(+)

参考标准:



正常(-)



轻度异常(+)



中度异常(++)



重度异常(+++)

眼袋: 0.51-3.109(-) 3.109-7.285(+)
7.285-9.729(++) >9.729(+++)

眼皱胶原: 3.107-2.031(-) 2.031-1.107(+)
1.107-0.486(++) <0.486(+++)

黑眼圈: 0.831-3.188(-) 3.188-5.615(+)
5.615-8.036(++) >8.036(+++)

淋巴阻塞: 1.116-4.101(-) 4.101-7.348(+)
7.348-9.907(++) >9.907(+++)

松弛下垂: 0.233-0.559(-) 0.559-1.066(+)
1.066-1.549(++) >1.549(+++)

浮肿: 0.332-0.726(-) 0.726-1.226(+)
1.226-1.708(++) >1.708(+++)

眼周细胞活性: 0.118-0.892(-) 0.892-1.37(+)
1.37-1.892(++) >1.892(+++)

视力疲劳: 2.017-5.157(-) 5.157-8.253(+)
8.253-10.184(++) >10.184(+++)

参数说明

眼袋

眼袋是指下睑皮肤, 皮下组织, 肌肉及眶膈松弛, 眶后脂肪肥大, 突出形成袋状突起。

眼皱胶原
胶原纤维主要化学成分是胶原蛋白，是结缔组织纤维的一种。在疏松结缔组织中排列成束，纤维束常有分支。胶原纤维和弹性纤维交织在一起组成了既有韧性、又有弹性，既能使器官与组织抵抗外来牵引力，又能保持形态和位置相对固定的疏松结缔组织。
黑眼圈
黑眼圈是由于经常熬夜，情绪不稳定，眼部疲劳、衰老，静脉血管血流速度过于缓慢，眼部皮肤红血球细胞供氧不足，静脉血管中二氧化碳及代谢废物积累过多，形成慢性缺氧，血液较暗并形成滞流以及造成眼部色素沉着。
淋巴阻塞
淋巴管阻塞的原因很多,可分为原发性(原因不明)和继发性。继发性包括有炎症、肿瘤、损伤后和放射治疗后等。
松弛下垂
松弛下垂是由于细胞与细胞之间的纤维随着时间而退化，令皮肤失去弹性；皮下脂肪流失，令皮肤失去支持而松垂；支持皮肤的肌肉松弛，令皮肤也随之松弛。
浮肿
浮肿是由于血液循环系统效果变差，来不及将体内多余的废水排出去，水分滞留在微血管内，甚至回渗到皮肤中，便产生了膨胀浮肿现象。
眼周细胞活性
细胞活性是指细胞的生理状态和功能，降低温度会使细胞的新陈代谢减慢，过低温度长时间会使细胞死亡，但低温低到一定的程度，又会使细胞处于暂时停止呼吸作用，但恢复温度会使细胞恢复正常，高温则会导致细胞死亡。
视力疲劳
视力疲劳是指从事近距离工作或学习，由于过度使用视力而产生的眼睛疲劳。此症好发于从事近距离精密工作、电脑工作或者照明不足以及患有近视、远视、老光等屈光不正及身体衰弱的人。患者一般的症状是:视物稍久则模糊，有的甚至无法写作或阅读，眼睛干涩、头昏痛，严重时可出现恶心、呕吐等。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。