

胶原蛋白评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
牙齿	7.245-8.562	8.317	正常(-)
毛发与皮肤	4.533-6.179	3.129	轻度异常(+)
内分泌系统	6.178-8.651	6.669	正常(-)
心脑血管	3.586-4.337	3.761	正常(-)
胃部和肠道	3.492-4.723	2.96	轻度异常(+)
免疫系统	3.376-4.582	3.12	轻度异常(+)
肌肉组织	6.552-8.268	7.044	正常(-)
排毒和代谢	6.187-8.466	8.008	正常(-)
神经系统	3.357-4.239	4.075	正常(-)
骨骼	6.256-8.682	7.469	正常(-)
眼睛	6.352-8.325	4.035	中度异常(++)
基膜胶原指数	0.76-1.824	1.136	正常(-)
间隙胶原指数	0.459-2.545	2.15	正常(-)
软骨胶原指数	3.344-4.739	3.789	正常(-)

参考标准:

	正常(-)	轻度异常(+)
	中度异常(++)	重度异常(+++)
牙齿:	8.562-7.245(-) 5.981-4.694(++)	7.245-5.981(+) <4.694(+++)
毛发与皮肤:	6.179-4.533(-) 2.914-1.526(++)	4.533-2.914(+) <1.526(+++)
内分泌系统:	8.651-6.178(-) 3.826-1.532(++)	6.178-3.826(+) <1.532(+++)
心脑血管:	4.337-3.586(-) 2.791-1.964(++)	3.586-2.791(+) <1.964(+++)
胃部和肠道:	4.723-3.492(-) 2.116-0.987(++)	3.492-2.116(+) <0.987(+++)
免疫系统:	4.582-3.376(-) 2.127-1.101(++)	3.376-2.127(+) <1.101(+++)
肌肉组织:	8.268-6.552(-) 4.832-3.117(++)	6.552-4.832(+) <3.117(+++)
排毒和代谢:	8.466-6.187(-)	6.187-3.904(+)

	3.904-1.783(++)	<1.783(+++)
神经系统:	4.239-3.357(-)	3.357-2.415(+)
	2.415-1.526(++)	<1.526(+++)
骨骼:	8.682-6.256(-)	6.256-3.827(+)
	3.827-1.517(++)	<1.517(+++)
眼睛:	8.325-6.352(-)	6.352-4.213(+)
	4.213-2.382(++)	<2.382(+++)
基膜胶原指数:	0.76-1.824(-)	1.824-2.526(+)
	2.526-3.252(++)	>3.252(+++)
间隙胶原指数:	0.459-2.545(-)	2.545-4.63(+)
	4.63-6.718(++)	>6.718(+++)
软骨胶原指数:	4.739-3.344(-)	3.344-2.019(+)
	2.019-0.841(++)	<0.841(+++)

参数说明
牙齿 牙齿中含钙质成分，胶原蛋白能使钙质与骨细胞结合，不致流失。如牙齿缺乏胶原蛋白，则牙齿钙质流失，易患蛀牙、牙周病；牙齿容易松动、脱落、疼痛、易敏及咬力不强等。
毛发与皮肤 头发中心是发髓，最外层是毛鳞片，中间是胶原蛋白:即胶原蛋白控制着头发的粗细，弹性和莹润度。毛发如缺乏胶原蛋白，则发质容易干枯，断裂，脱发，秃顶，分叉，白发，头皮屑增多等。皮肤真皮层中75%是胶原蛋白，胶原蛋白流失会导致皮肤松弛，脸颊、下颌、眼角下垂；胶原纤维断裂，皱纹增加；下颌耳后轮廓不清晰，形成双下巴和耳下堆积赘肉；皮肤干燥，易敏感，弹性下降，角质粗糙，毛孔粗大，出油明显。色斑严重。
内分泌系统 胶原蛋白承担着供给刺激能产生激素的腺体分泌的作用，如果胶原蛋白不足和流失，女性则会体能特征变得不明显，闭经，月经量少，月经紊乱，提前进入更年期，发育不良，乳房松弛下垂，乳腺增生，易引起乳腺癌，易引起男性化；男性则会阳痿，早泄，男性特征不明显。
心脑血管 血管的主要成分是胶原蛋白，如缺乏胶原蛋白则血管壁弹性变差，影响血压的稳定性，血液粘稠，容易引起脂肪肝、高血脂，血液循环缓慢，心绞痛，人体吸收代谢不畅，易患心脑血管疾病；记忆力衰退，头晕，健忘，失眠多梦。
胃部和肠道 胶原蛋白在胃里可以抑制蛋白质因胃酸作用引起的凝聚，如果胶原蛋白流失，胃部出现胃酸，胃胀，打嗝。胃痉挛，阵痛，胃痛，胀气便秘，消化吸收能力差，宿便存留，胃肠炎，额头长小豆，体重变轻，有虚胖现象，小肠的纹状腺上皮存在着胶原蛋白的转运系统，如果胶原蛋白流失，小肠上皮细胞吸收能力下降，而且运转能力降低。
免疫系统 淋巴系统中的淋巴管道由胶原蛋白组成，承担运输淋巴液的作用，如果胶原蛋白流失，淋巴循环缓慢而导致免疫下降，易感染流行疾病，肌肉酸疼，减体乏力等症，而食用胶原蛋白后，免疫机能整体提升，人体免疫系统可增加至少一百倍以上。

肌肉组织

肌肉细胞与细胞间是利用胶原蛋白黏合的，如果胶原蛋白流失肌肉量减少，脂肪量增加，颈椎肌肉硬枯，颈椎病，脑供血不足，腰酸背痛，肩部酸麻，结缔块，乳酸堆积后，压迫神经系统，阻碍神经反射区，肌肉收缩差，失去活力，肌肉无提拉力，肌肉张力下降，呈八字下垂趋势。

排毒和代谢

身体重要的排毒管道淋巴结中的被膜由较致密的结缔组织构成，而结缔组织中存在大量的胶原蛋白，如果胶原蛋白流失出现毒素堆积，身体变黄，皮肤粗糙，便秘，净体质过胖，体质偏酸，各种内脏衰退，肾脏与脾脏代谢障碍，肾炎，较重者导致肾衰竭，成片起皮，红肿，皮肤瘙痒，皮肤疼痛，长痘，脂肪粒，身体出现大量痤疮，腐烂，各种皮肤病，内脏功能损伤，智力衰退，皮肤癌。

神经系统

胶原蛋白中含有大量氨基酸，不但参与合成新的胶原，而且还是大脑细胞中一种中枢神经抑制性机制，如果胶原蛋白流失会导致记忆力减退，注意力不集中，失眠多梦，焦虑，抑郁，烦躁不安，更年期综合症，反应能力差，神经疼等。

骨骼

骨骼内有机物中80%是胶原蛋白，如果胶原蛋白流失，会导致骨密度降低，形成空洞，钙也会大量流失。造成骨关节疼痛，骨刺，肌肉萎缩，骨骼变粗，易引发骨癌，双腿麻痹，腿脚不灵活，不能弯腰提重，骨质疏松，骨力不支，易骨折，骨骼愈合慢，骨韧度下降，骨头变脆等。

眼睛

眼角膜的主要成分是胶原蛋白，如果眼睛缺乏胶原蛋白，则容易造成眼睛干涩，疲劳。眼角膜透明度不佳，弹性纤维变硬，晶状体浑浊，引发白内障等眼疾。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。