

大肠评估评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
大肠蠕动功能系数	4.572-6.483	2.279	中度异常(++)
结肠吸收功能系数	2.946-3.815	2.682	轻度异常(+)
肠道有益菌系数	1.734-2.621	0.897	中度异常(++)
肠腔内压力系数	1.173-2.297	5.222	重度异常(+++)

参考标准:

正常(-) 轻度异常(+)
中度异常(++) 重度异常(+++)

大肠蠕动功能系数:	6.483-4.572(-) 3.249-2.031(++)	4.572-3.249(+) <2.031(+++)
结肠吸收功能系数:	3.815-2.946(-) 1.775-0.803(++)	2.946-1.775(+) <0.803(+++)
肠道有益菌系数:	2.621-1.734(-) 1.046-0.237(++)	1.734-1.046(+) <0.237(+++)
肠腔内压力系数:	1.173-2.297(-) 3.341-4.519(++)	2.297-3.341(+) >4.519(+++)

参数说明

大肠蠕动功能系数

大肠有类似的节段性运动和小肠的蠕动，但其频率较慢，适应大肠主要功能是吸收水和临时存储的粪便。如果肠道蠕动速度过慢，粪便水分吸收过多，会引起便秘，其主要表现为:大便次数减少，大便量减少，大便干结，排使用力。

结肠吸收功能系数

结肠的吸收功能是吸收水分和电解质，并且可以调节电解质浓度。脂肪的部分水解产物也可以是结肠癌，特别是吸收单元的升结肠，在细胞中形成乳糜微粒中，释放到粘膜固有层。的每个部分结肠吸收能力是不同的尺寸，右(L)的最大吸收能力，结肠，横结肠，降结肠。如结肠炎的病理因素，会减少结肠癌的水和钠离子的吸收。

肠道有益菌系数

肠道细菌会导致肠道酸性环境，有利于自己的增长，同时控制有害细菌的生长，保持有利于肠道健康。在正常人体有益和有害细菌的平衡，一旦失去平衡，将本病在伺机而动。在感冒，腹泻，便秘，消化性溃疡，肝硬化患者，肠道有益菌减少，有害细菌也相对提高的现象可以发现。

肠腔内压力系数

如下:1)食品发酵，在正常情况下可引起肠胀气，如果有大量的细菌存在在较低的回肠和结肠的食糜在肠道内，由于某种原因，长的停留时间，根据细菌的作用，可以引起食糜发酵，产生大量的气体，引起腹胀。2)吸入空气3)肠道气体吸收障碍，一般情况下，大部分气体在腹腔内，肠血管吸收，在体外肺。有些疾病，肠道血液循环障碍，影响肠腔内气体吸收，引起腹胀。4)肠道气体排出障碍，出于某种原因，肠道蠕动减弱或消失，所以不是在体外从肠腔行的气体，从而导致腹胀。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。