

甲状腺评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
游离甲状腺素(FT4)	0.1-0.31	0.469	轻度异常(+)
甲状腺球蛋白	0.114-0.202	0.508	中度异常(++)
抗甲状腺球蛋白抗体	0.421-0.734	0.253	中度异常(++)
三碘甲状腺原氨酸(T3)	0.16-0.3	0.554	中度异常(++)

参考标准:

正常(-) 轻度异常(+)
中度异常(++) 重度异常(+++)

游离甲状腺素(FT4):	0.1-0.31(-) 0.645-0.873(++)	0.31-0.645(+) >0.873(+++)
甲状腺球蛋白:	0.114-0.202(-) 0.447-0.627(++)	0.202-0.447(+) >0.627(+++)
抗甲状腺球蛋白抗体:	0.734-0.421(-) 0.323-0.21(++)	0.421-0.323(+) <0.21(+++)
三碘甲状腺原氨酸(T3):	0.16-0.3(-) 0.543-0.757(++)	0.3-0.543(+) >0.757(+++)

参数说明

游离甲状腺素(FT4)

血清游离甲状腺素是甲状腺功能体外试验的灵敏指标，即使在生理及病理情况下引起血浆甲状腺结合蛋白结合力和浓度改变时，也能较准备反映甲状腺的功能。

甲状腺球蛋白

甲状腺球蛋白是由甲状腺滤泡上皮细胞合成的一种大分子糖蛋白，是甲状腺滤泡内胶质的主要成分，合成的甲状腺激素以球蛋白形式储存在滤泡腔中。在正常情况下，只有极微量的TG进入血液循环。

抗甲状腺球蛋白抗体

抗甲状腺球蛋白抗体(ATG)是Roitt等1958年在对自身免疫性甲状腺炎(桥本甲状腺炎等)进行血清学研究时发现的。ATG的靶抗原甲状腺球蛋白(TG)是一种由甲状腺上皮细胞合成和分泌的可溶性的碘化糖蛋白，分子量660kD，由2748个氨基酸组成。它是T3(triiodothyronine，三碘甲腺原氨酸)、T4(tet-raiodothyronine，四碘甲腺原氨酸，即thyroxine，甲状腺素)的生物合成前体，主要是以胶体形式贮存于甲状腺滤泡腔中，正常人血清中含量极微(10~40ng/ml)。Witebsky等用同种甲状腺组织免疫家兔，诱导产生了ATG和类似人桥本甲状腺炎相似的家兔甲状。

三碘甲状腺原氨酸(T3)

T3是由甲状腺滤泡细胞合成及分泌的激素。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。