

精子和精液评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
精液量	1.502-6.028	1.915	正常(-)
液化时间	10.283-30.282	10.838	正常(-)
精子数目	2.483-3.932	2.23	轻度异常(+)
精子活率	0.637-0.877	0.415	中度异常(++)

参考标准:

正常(-)

轻度异常(+)

中度异常(++)

重度异常(+++)

精液量:	6.028-1.502(-)	1.502-1.074(+)
	1.074-0.326(++)	<0.326(+++)
液化时间:	30.282-10.283(-)	10.283-8.091(+)
	8.091-5.809(++)	<5.809(+++)
精子数目:	3.932-2.483(-)	2.483-2.009(+)
	2.009-1.025(++)	<1.025(+++)
精子活率:	0.877-0.637(-)	0.637-0.431(+)
	0.431-0.218(++)	<0.218(+++)

参数说明

精液量

精液量是指男性一次射精的多少, 正常人一次排精量可因节欲时间而异, 一般为2~6ml, 少于1.5ml或大于8ml视为异常。

液化时间

精液液化时间是指精液从排出体外后开始液化, 直到完全变成水样液体所需的时间。正常情况下, 精液在射出体外后10-30分钟内会开始液化, 20-40分钟内可以完全液化。如果超过60分钟仍未完全液化, 则称为精液不液化或精液液化时间延长。

精子数目

精子计数是在显微镜下计算一次排出的精液中精子的数量。将精子计数值乘以精液量, 就可得出一次射精的量。

精子活率

精子存活率指存活精子在所检测精子总数中的百分比。当活动精子百分数低于40%时, 应检测精子存活率。不动的精子并不都是死亡精子, 如果存活但不动的精子占很大比例, 则提示精子鞭毛可能存在结构缺陷。

本检测结果仅供参考, 不作为诊断结论。