

# 人体综合免疫力评估报告

姓名：o

性别：男

年龄：40

身高：188CM

体重：115KG

检测时间：2026/8/25 12:18:20

## 实际检测结果

| 检测项目     | 正常范围        | 实际测量值 | 检测结果    |
|----------|-------------|-------|---------|
| 固有免疫分子指数 | 2.595-5.722 | 2.247 | 轻度异常(+) |
| 固有免疫细胞指数 | 2.899-4.78  | 3.148 | 正常(-)   |
| 体液免疫指数   | 2.737-4.178 | 3.733 | 正常(-)   |
| 细胞免疫指数   | 2.593-4.968 | 4.019 | 正常(-)   |
| 组织屏障免疫指数 | 1.124-3.613 | 2.132 | 正常(-)   |

### 参考标准：



正常(-)



轻度异常(+)



中度异常(++)



重度异常(+++)

|           |                 |                |
|-----------|-----------------|----------------|
| 固有免疫分子指数： | 5.722-2.595(-)  | 2.595-1.824(+) |
|           | 1.824-1.013(++) | <1.013(+++)    |
| 固有免疫细胞指数： | 4.78-2.899(-)   | 2.899-1.898(+) |
|           | 1.898-0.824(++) | <0.824(+++)    |
| 体液免疫指数：   | 4.178-2.737(-)  | 2.737-1.924(+) |
|           | 1.924-1.027(++) | <1.027(+++)    |
| 细胞免疫指数：   | 4.968-2.593(-)  | 2.593-1.77(+)  |
|           | 1.77-0.93(++)   | <0.93(+++)     |
| 组织屏障免疫指数： | 1.124-3.613(-)  | 3.613-6.114(+) |
|           | 6.114-8.589(++) | >8.589(+++)    |

### 参数说明

#### 固有免疫细胞指数

固有免疫细胞是机体固有免疫（非特异性免疫）的一个重要组成部分，是生物体在长期种系进化过程中形成的一系列免疫效应细胞。其在个体出生时就已具备，可对侵入的病原体迅速应答，产生非特异抗感染免疫作用；亦可参与对体内损伤、衰老或畸变细胞的清除，并参与适应性免疫应答。

#### 体液免疫指数

体液免疫，即以浆细胞产生抗体来达到保护目的的免疫机制。负责体液免疫的细胞是B细胞。体液免疫的抗原多为相对分子质量在10,000以上的蛋白质和多糖大分子，病毒颗粒和细菌表面都带有不同的抗原，所以都能引起体液免疫。

#### 细胞免疫指数

细胞免疫又称细胞介导免疫。狭义的细胞免疫仅指T细胞介导的免疫应答，即T细胞受到抗原刺激后，分化、增殖、转化为致敏T细胞，对抗原的直接杀伤作用及致敏T细胞所释放的细胞因子的协同杀伤作用。T细胞介导的免疫应答的特征是出现以单核细胞浸润为主的炎症反应和/或特异性的细胞毒性。广义的细胞免疫还应该包括原始的吞噬作用以及NK细胞介导的细胞毒作用。细胞免疫是清除细胞内寄生微生物的最为有效的防御反应，也是排斥同种移植物或肿瘤抗原的有效手段。

**组织屏障免疫指数**

免疫屏障是防御异物进入机体或机体某一部位的生理解剖学结构，是发挥非特异性免疫功能的重要方面，被称为机体的“第一道防线”。其中包括外屏障：皮肤、呼吸道黏膜、消化道黏膜和泌尿生殖道黏膜、胎盘屏障。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。