

脂肪酸评估报告

姓名：o

性别：男

年龄：40

身高：188CM

体重：115KG

检测时间：2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
饱和脂肪酸指数	18-27	25.993	正常(-)
必需脂肪酸指数	2.125-3.218	3.348	轻度异常(+)
不饱和脂肪酸指数	2.66-4.232	5.216	轻度异常(+)
磷脂指数	0.88-1.653	1.675	轻度异常(+)
卵磷脂指数	1.828-2.793	2.816	轻度异常(+)
脑磷脂指数	0.372-1.031	1.177	轻度异常(+)
鞘磷脂指数	1.318-2.415	2.165	正常(-)
鞘脂指数	3.694-9.742	5.92	正常(-)
三脂酰甘油指数	1.116-2.101	3.489	中度异常(++)
脂质体指数	0.87-1.704	1.696	正常(-)

参考标准：

正常(-)

轻度异常(+)

中度异常(++)

重度异常(+++)

饱和脂肪酸指数：	18-27(-)	27-32.5(+)
	32.5-37.5(++)	>37.5(+++)
必需脂肪酸指数：	2.125-3.218(-)	3.218-4.083(+)
	4.083-5.666(++)	>5.666(+++)
不饱和脂肪酸指数：	2.66-4.232(-)	4.232-5.556(+)
	5.556-7.209(++)	>7.209(+++)
磷脂指数：	0.88-1.653(-)	1.653-2.195(+)
	2.195-2.615(++)	>2.615(+++)
卵磷脂指数：	1.828-2.793(-)	2.793-3.658(+)
	3.658-5.065(++)	>5.065(+++)
脑磷脂指数：	0.372-1.031(-)	1.031-1.552(+)
	1.552-2.349(++)	>2.349(+++)
鞘磷脂指数：	1.318-2.415(-)	2.415-3.626(+)
	3.626-5.723(++)	>5.723(+++)
鞘脂指数：	3.694-9.742(-)	9.742-15.286(+)
	15.286-17.769(++)	>17.769(+++)
三脂酰甘油指数：	1.116-2.101(-)	2.101-3.146(+)
	3.146-5.409(++)	>5.409(+++)
脂质体指数：	0.87-1.704(-)	1.704-2.279(+)

参数说明
饱和脂肪酸指数 饱和脂肪酸，指不含不饱和双键的脂肪酸，是导致慢性病死亡率高的主要原因。是构成脂质的基本成分之一。一般较多见的有辛酸、癸酸、月桂酸、豆蔻酸、软脂酸、硬脂酸、花生酸等。有少数植物如椰子油、可可油、棕榈油等中也多含此类脂肪酸。
必需脂肪酸指数 必需脂肪酸是指对维持机体功能不可缺少、但机体不能合成、必须由食物提供的脂肪酸，包括亚油酸、α-亚麻酸，均为多不饱和脂肪酸。
不饱和脂肪酸指数 不饱和脂肪酸是构成体内脂肪的一种脂肪酸，人体不可缺少的脂肪酸。不饱和脂肪酸根据双键个数的不同，分为单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸二种。食物脂肪中，单不饱和脂肪酸有油酸等，多不饱和脂肪酸有亚油酸、亚麻酸、花生四烯酸等。人体不能合成亚油酸和亚麻酸，必须从膳食中补充。
磷脂指数 磷脂，也称磷脂类、磷脂质，是指含有磷酸的脂类，属于复合脂。磷脂是组成生物膜的主要成分，分为甘油磷脂与鞘磷脂两大类，分别由甘油和鞘氨醇构成。磷脂为两性分子，一端为亲水的含氮或磷的头，另一端为疏水（亲油）的长烃基链。由于此原因，磷脂分子亲水端相互靠近，疏水端相互靠近，常与蛋白质、糖脂、胆固醇等其它分子共同构成磷脂双分子层，即细胞膜的结构。
鞘脂指数 鞘脂一类含有鞘氨醇骨架的两性脂，鞘脂包括鞘磷脂、神经节苷脂等，一般存在于植物和动物膜内，尤其是在中枢神经系统的组织内含量丰富。又称鞘磷脂、鞘氨醇磷脂或神经磷脂·由鞘氨醇、脂肪酸与磷酸胆碱组成的分子，它是鞘磷脂类的典型代表，在高等动物的组织中含量为丰富·细胞内鞘磷脂的水解，是经过溶酶体中神经磷脂酶催化的·水解产物为神经酰胺和磷酸胆碱，可继续代谢·磷脂酶的先天性缺损便导致鞘磷脂在组织内堆积；可造成肝、脾肿大，严重者影响中枢神经系统，甚至危及生命。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。