

呼吸功能评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
潮气量	0.59-0.76	0.664	正常(-)
呼吸速度	18.5-23.4	26.915	中度异常(++)
通气量	11.5-13.8	13.673	正常(-)
补呼气量	1-2.05	1.817	正常(-)
深吸气量	1.4-2.76	3.003	轻度异常(+)

参考标准: 正常(-) 轻度异常(+)
中度异常(++) 重度异常(+++)

潮气量:	0.59-0.76(-) 0.83-0.966(++)	0.76-0.83(+) >0.966(+++)
呼吸速度:	18.5-23.4(-) 25.7-27.2(++)	23.4-25.7(+) >27.2(+++)
通气量:	11.5-13.8(-) 14.6-15.9(++)	13.8-14.6(+) >15.9(+++)
补呼气量:	1-2.05(-) 2.55-3.26(++)	2.05-2.55(+) >3.26(+++)
深吸气量:	1.4-2.76(-) 3.35-4.03(++)	2.76-3.35(+) >4.03(+++)

参数说明

潮气量

潮气量是指平静呼吸时每次吸入或呼出的气体容积，是显示肺容积的指标，主要用于肺功能检查中的通气功能检查。潮气量是评估肺部功能和通气效率的基础，也是显示肺容积的一个重要指标，可帮助排查是否患有间质性肺炎、慢性阻塞性肺疾病等呼吸系统疾病。当成年人潮气量>600ml、小儿潮气量>10ml/kg时，属于潮气量偏高，一般与运动、妊娠、上呼吸道感染、哮喘等有关，通常会有呼吸加快、胸闷、呼吸加快、胸闷等症状，可能会导致呼吸肌疲劳、酸碱平衡紊乱、肺泡过度扩张等后果。潮气量偏高可能引起的生理表现有呼吸加快、胸闷等，可能引起的病理表现有咳嗽、呼吸困难等。当成年人潮气量<400ml、小儿潮气量<6ml/kg时，属于潮气量偏低，一般与年龄增长、情绪紧张、间质性肺疾病、慢性阻塞性肺疾病等有关，通常会有呼吸功能下降、易疲劳、呼吸困难等症状，可能会导致二氧化碳潴留、低氧血症等后果。潮气量偏低可能引起的生理表现有呼吸功能下降、易疲劳等，可能引起的病理表现有呼吸困难、呼吸频率增加、肺水肿等。

呼吸速度

呼吸快和呼吸慢都不好，正常呼吸应该是平稳有规律的。呼吸频率是指每分钟的呼吸次数，正常成人平静时呼吸频率约为16-18次/分钟。呼吸频率快可能是由缺氧、剧烈运动、甲状腺功能亢进等原因导致；呼吸频率慢可能是由外伤、电解质紊乱、脑血管疾病等导致。因此，无论是呼吸频率快还是慢，都可能是身体出现了某种问题。保持正常呼吸频率，有助于维持身体的正常生理功能。

补呼气量

补呼气量是指在平静呼气末再尽力呼出的气量，它是肺活量的一个重要组成部分，反映了肺部的气体储备功能。正常成年人的补呼气量约为900-1200毫升，男性通常比女性高。补呼气量的测量通常在肺功能检查中进行，其值降低可能与呼吸肌功能减弱、肺组织弹性下降或呼吸道阻塞等情况有关。补呼气量的大小受到多种因素的影响，包括呼吸肌的力量、肺组织的弹性以及呼吸道的通畅程度。呼吸肌力量强、肺组织弹性好的人，补呼气量相对较大。此外，补呼气量还可能受到肥胖、某些肺部疾病（如肺结核、肺气肿等）的影响。补呼气量的测量在医学上有重要意义。它可以帮助评估呼吸系统的功能状态，特别是对于诊断呼吸系统疾病如慢性支气管炎、哮喘等有参考价值。如果补呼气量降低，患者可能会出现咳嗽、咳痰、胸闷、气短等症状，特别是在进行体力活动或情绪激动时更为明显。

深吸气量

深吸气量为平静呼气末尽力吸气所吸入的气量，即潮气量加补吸气量。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。