

肠道菌群评估报告

姓名: o 性别: 男 年龄: 40
身高: 188CM 体重: 115KG 检测时间: 2026/8/25 12:18:20

实际检测结果

检测项目	正常范围	实际测量值	检测结果
拟杆菌属	1.048-1.875	1.366	正常(-)
粪拟杆菌种	2.561-6.503	6.055	正常(-)
脆弱拟杆菌种	1.327-6.636	4.316	正常(-)
卵形拟杆菌种	2.654-6.768	5.215	正常(-)
单形拟杆菌种	1.294-2.654	2.175	正常(-)
巴恩斯氏菌科	2.29-3.981	2.641	正常(-)
臭气杆菌科	0.9-1.062	0.967	正常(-)
丁酸单胞菌属	2.309-3.981	3.657	正常(-)
臭气杆菌属	2.747-5.309	5.461	轻度异常(+)
Para普雷沃菌属	1.83-2.654	2.159	正常(-)
副拟杆菌属	2.654-6.768	5.592	正常(-)
吉氏副拟杆菌种	1.35-2.92	2.444	正常(-)
普氏菌属	2.66-5.839	4.497	正常(-)
理研菌科	1.981-4.778	3.839	正常(-)
别祥杆菌属	1.31-2.654	2.242	正常(-)
马胃葡萄球菌种	0.898-1.031	0.993	正常(-)

参考标准: 正常(-) 轻度异常(+)
中度异常(++) 重度异常(+++)

拟杆菌属:	1.048-1.875(-)	1.875-1.963(+)
	1.963-2.284(++)	>2.284(+++)
粪拟杆菌种:	2.561-6.503(-)	6.503-8.346(+)
	8.346-9.024(++)	>9.024(+++)
脆弱拟杆菌种:	1.327-6.636(-)	6.636-8.562(+)
	8.562-9.018(++)	>9.018(+++)
卵形拟杆菌种:	2.654-6.768(-)	6.768-7.198(+)
	7.198-8.201(++)	>8.201(+++)
单形拟杆菌种:	2.654-1.294(-)	1.294-0.986(+)
	0.986-0.634(++)	<0.634(+++)
巴恩斯氏菌科:	2.29-3.981(-)	3.981-4.824(+)
	4.824-6.356(++)	>6.356(+++)
臭气杆菌科:	0.9-1.062(-)	1.062-1.413(+)
	1.413-1.628(++)	>1.628(+++)

丁酸单胞菌属:	2.309-3.981(-) 4.328-5.649(++)	3.981-4.328(+) > 5.649(+++)
臭气杆菌属:	2.747-5.309(-) 7.685-9.026(++)	5.309-7.685(+) > 9.026(+++)
Para普雷沃菌属:	1.83-2.654(-) 3.641-4.159(++)	2.654-3.641(+) > 4.159(+++)
副拟杆菌属:	2.654-6.768(-) 7.864-9.203(++)	6.768-7.864(+) > 9.203(+++)
吉氏副拟杆菌种:	1.35-2.92(-) 3.216-4.239(++)	2.92-3.216(+) > 4.239(+++)
普氏菌属:	2.66-5.839(-) 7.324-9.634(++)	5.839-7.324(+) > 9.634(+++)
理研菌科:	1.981-4.778(-) 6.056-7.916(++)	4.778-6.056(+) > 7.916(+++)
别祥杆菌属:	1.31-2.654(-) 3.154-4.274(++)	2.654-3.154(+) > 4.274(+++)
马胃葡萄球菌种:	0.898-1.031(-) 2.274-4.629(++)	1.031-2.274(+) > 4.629(+++)

参数说明
拟杆菌属 拟杆菌是一类革兰氏染色阴性、无芽孢、专性厌氧的小杆菌，通常被称为类杆菌。它们主要寄居在人和动物的肠道、口腔、上呼吸道和生殖道中，是肠道微生物群落的重要组成部分。拟杆菌的分类和特性：拟杆菌属于拟杆菌门，包括多个属，其中最重要的是拟杆菌属。拟杆菌属的细菌通常呈杆状，不能在氧气环境中生长，主要依赖发酵作用分解糖类产生乙酸、琥珀酸等物质。拟杆菌在人体中的作用：拟杆菌在维持肠道健康、促进营养吸收以及调节免疫系统等方面发挥着重要作用。它们帮助分解食物并产生身体所需的营养和能量。此外，拟杆菌还参与葡萄糖和其他碳水化合物的代谢，并产生短链脂肪酸，这些酸有益于肠道健康。拟杆菌与疾病的关系：拟杆菌的异常增多或减少可能与某些疾病的发生发展有关，如炎症性肠病、肥胖和糖尿病等。此外，拟杆菌的异常变化还可能导致消化不良、腹泻、便秘等肠道问题。因此，保持良好的饮食习惯和健康的生活方式对于维持拟杆菌的平衡非常重要。
粪拟杆菌种 粪拟杆菌是一种革兰氏阴性菌，属于厌氧菌，不形成孢子，主要寄居于人和动物的肠道、口腔、上呼吸道和生殖道中。粪拟杆菌在人体结肠中参与许多重要的代谢活动，包括碳水化合物的发酵、含氮物质的利用以及胆汁酸和其他类固醇的生物转化。此外，粪拟杆菌的主要能量来源是多糖，如纤维素、木聚糖等植物纤维，以及直链淀粉和支链淀粉等植物淀粉。粪拟杆菌在科学研究中有重要应用，例如在微生物生态学和肠道微生物群落研究中作为模式菌种。然而，需要注意的是，粪拟杆菌仅用于科学研究或工业应用，不可用于人类或动物的临床诊断或治疗。
脆弱拟杆菌种

脆弱拟杆菌是一种革兰阴性、无芽孢的厌氧菌，属于拟杆菌属。它主要寄生于人体的口腔、肠道以及女性生殖道，是一种条件致病菌，通常在机体免疫力下降或菌群失衡时引起感染。脆弱拟杆菌是临床上最常见的一种厌氧菌。能分解糖，对胆汁耐受。为类杆菌属的代表株。革兰氏阴性杆菌，两端钝圆而浓染，中间有不着色部份。在正常情况下，它能维持消化系统平衡和机体抵抗力，是免疫系统的驱动力，已被应用于健康领域。

卵形拟杆菌种

卵形拟杆菌是厌氧菌。拟杆菌属是指革兰氏染色阴性、无芽孢、专性厌氧的小杆菌。又称类杆菌属。正常寄居于人和动物的肠道、口腔、上呼吸道和生殖道。

本检测结果仅供参考，不作为诊断结论。