

# 胰腺功能评估报告

姓名: o

性别: 男

年龄: 40

身高: 188CM

体重: 115KG

检测时间: 2026/8/25 12:18:20

## 实际检测结果

| 检测项目       | 正常范围        | 实际测量值 | 检测结果  |
|------------|-------------|-------|-------|
| 胰岛素        | 2.845-4.017 | 4.492 | 增高    |
| 胰多肽 (简称PP) | 3.21-6.854  | 2.796 | 减低    |
| 胰高血糖素      | 2.412-2.974 | 2.777 | 正常(-) |

## 检测值说明

一、胰岛素: 健康范围: 2.845~4.017

二、胰多肽 (简称PP): 健康范围: 3.21~6.854

1、>6.854, 增高

(1)糖尿病患者; (2)急性胰腺; (3)有分泌功能的胰腺肿瘤; (4)肝硬化、慢性肾病患者;  
(5)其他: 如胰多肽细胞增生、心肌梗死、严重的心力衰竭、非心源性休克、十二指肠溃疡。

2、<3.21, 减低。

(1)肥胖症; (2)慢性胰腺炎胰多肽多明显低于正常人; (3)可作为迷走神经受损的指标, 此时胰多肽明显减少; (4)当用生长激素治疗时。

三、胰高血糖素: 健康范围: 2.412~2.974

1、>2.974, 增高。

见于对胰岛素不敏感的糖尿病、胰高血糖素瘤。

2、<2.412, 减低。

见于先天性 $\alpha$ 细胞缺乏症。

## 参数说明

### 胰岛素

是一种分子量较小的蛋白质, 在体内的作用非常广泛, 主要是降低血糖, 作用1、对糖代谢促进肝脏、肌肉和脂肪组织摄取和利用葡萄糖, 促进肝糖原和肌糖原合成, 抑制糖异生, 促进葡萄糖转变成脂肪酸, 贮存于脂肪组织2、对脂肪代谢, 抑制脂肪酶的活性, 从而抑制脂肪分解3、对蛋白质代谢, 促进蛋白质合成, 抑制蛋白质分解一旦缺乏或不能正常发挥作用, 就会形成糖尿病

### 胰多肽 (简称PP)

是胰腺岛PP细胞合成和释放的一种具有激素性质的多肽。

### 胰高血糖素

是由胰脏胰岛 $\alpha$ -细胞分泌的激素, 升高血糖浓度, 与胰岛素作用相互拮抗。

本检测结果仅供参考, 不作为诊断结论。