

Apunts d'Àlgebra Multilineal i Geometria

ALEIX TORRES I CAMPS

Índex

1	Àlgebra Multilineal	2
1.1	La forma de Jordan	2
1.1.1	Introducció i repàs	2
1.1.2	El teorema de Jordan	3
1.1.3	Aplicacions de Jordan	5
1.2	Formes quadràtiques	6
1.2.1	Diagonalització de φ i q	9
1.2.2	Classificació de formes quadràtiques en $\mathbf{k} = \mathbb{C}$	9
1.3	Tensors	10

1 Àlgebra Multilineal

1.1 La forma de Jordan

1.1.1 Introducció i repàs

Sigui \mathbf{k} un cos (normalment \mathbb{R} o \mathbb{C}), sigui E un \mathbf{k} -e.v. de dimensió finita ($\dim n$), sigui $f : E \rightarrow E$ un endomorfisme, sigui $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ una base i sigui $M_{\mathcal{B}}(f) = A$ matriu bàsica per \mathcal{B} .

Aleshores, $v \in E$ és vep de vap $\lambda \in \mathbf{k}$ si v compleix que $f(v) = \lambda v$.

Direm que f diagonalitza si \exists base de veps \mathcal{B} : en aquest cas, la matriu $M_{\mathcal{B}}(f)$ és diagonal.

Quan sabem si una matriu o una aplicació diagonalitza? Fem servir el polinomi característic: $P_f(t) = \det(f - tId)$ de grau n . Aleshores, λ és vap $\iff P_f(\lambda) = 0$, per tant, $\{vap\} = \{\text{arrels de } P_f(t)\}$, la qual cosa és una manera de trobar els vaps.

Hipòtesi: Sempre suposarem que el polinomi descomposa en el cos, és a dir, $P_f(t) = (-1)^n(t - \lambda_1)^{n_1} \dots (t - \lambda_r)^{n_r}$, on $n_1 + \dots + n_r = n$. Totes les arrels de $P_f(t)$ són de \mathbf{k} . En particular, pels complexos, això sempre és cert.

Teorema 1. *El primer teorema de descomposició diu que podem separar l'espai vectorial en subespais invariants i sense intersecció entre ells tals que tots ells nuclis de l'aplicació f menys vap vegades la identitat, és a dir: $E = \ker(f - \lambda_1 Id)^{n_1} \oplus \dots \oplus \ker(f - \lambda_r Id)^{n_r}$.*

És a dir, si $\forall v \in E \implies v = v_1 + \dots + v_r$, on $v_i \in \ker(f - \lambda_i Id)^{n_i}$ és a dir, $(f - \lambda_i Id)^{n_i}(v_i) = 0$.

Corol·lari 2. $n_1 = \dots = n_r = 1 \implies f$ diagonalitza.

Teorema 3. *Cayley-Hamilton: $P_f(A) = 0$. Considerem $m_f(t) \in \{Q(t) | Q(A) = 0\}$ que és el polinomi de grau mínim i mònic $\implies m_f(A) = 0$ i $m_f(t) | P_f(t)$ (el polinomi mínim divideix al polinomi característic). A més, $m_f(t) = (t - \lambda_1)^{m_1} \dots (t - \lambda_r)^{m_r}$ té totes les arrels però de grau més petit o igual.*

Proposició 4. f diagonalitza $\iff m_1 = \dots = m_r = 1$.

Recordant el fet que $E = \ker(f - \lambda_1 Id)^{n_1} \oplus \dots \oplus \ker(f - \lambda_r Id)^{n_r}$, a més sabem que: $\dim \ker(f - \lambda Id)^{n_1} = n_1$, $\ker(f - \lambda_i Id)^{n_i}$ son f -invariants, $f(\ker(f - \lambda_i Id)^{n_i}) \subset \ker(f - \lambda_i Id)^{n_i}$.

Aleshores, per la propia descomposició de l'espai en nuclis, sabem que la matriu de l'aplicació com a mínim queda separada pels subespais de cada nucli. Ja que son espais separats i invariants.

Conclusió: la multiplicitat més gran del polinomi mínim és la mida màxima de la caixa que ens pot aparèixer quan intentem fer diagonalització.

Exemple 1. Sigui A la matriu d'una aplicació lineal de k^3 en una certa base:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Aleshores, calculem el polinomi característic $P_A(t)$.

$$P_A(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 0 & 0 \\ 2 & 1-t & 0 \\ 0 & 0 & 1-t \end{vmatrix} = (1-t)^3$$

Per tant, té un únic vap $\lambda = 1$ que apareix 3 vegades. Automàticament, sabem que $\mathbf{k}^3 = \ker(A - 1 Id)^3$. Tot i així, observem que:

$$(A - Id) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (A - Id)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

I que, per tant, veiem que $\mathbf{k}^3 = \ker(A - \text{Id})^2$. Llavors el polinomi mínim no coincideix amb el polinomi característic sinó que $m_A(t) = (1 - t)^2$.

1.1.2 El teorema de Jordan

Sigui $f : E \rightarrow E$, on $E = \ker(f - \lambda \text{Id})^m = \ker f_\lambda^m$ (abreugem la notació amb $f_\lambda := f - \lambda \text{Id}$).

Definició 5. $v \in E$ és un **vep generalitzat d'alçada 1** si $v \notin \ker(f_\lambda^k)$ per $k \leq l - 1$, però sí que $v \in \ker f_\lambda^l$. Que és el mateix que dir que $f_\lambda^k(v) \neq 0$ (per al mateix rang de k), però sí que $f_\lambda^l(v) = 0$.

Exemple 2. Sigui A la matriu d'una aplicació lineal a \mathbf{k}^4 en la base $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$:

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

Ara, observem que $f_\lambda(e_1) = f(e_1) - \lambda e_1 = e_2 \neq 0$, $f_\lambda^2(e_1) = f_\lambda(e_2) = e_3 \neq 0$, $f_\lambda^3(e_1) = f_\lambda^2(e_2) = f_\lambda(e_3) = 0$ i, per últim, $f_\lambda(e_4) = 0$. Per tant, e_1 és un vepg d'alçada 3, e_2 és un vepg d'alçada 2 i tant e_3 com e_4 són vepg d'alçada 1 i, per tant, veps ordinaris.

Proposició 6. Sigui v un vep generalitzat d'alçada l , aleshores $v, f_\lambda(v), f_\lambda^2(v), \dots, f_\lambda^{l-1}(v)$ són linealment independents. Al subespai que generen l'anomenarem un *cicle de Jordan de longitud l* .

Demostració. Suposem que son linealment dependents, aleshores existeix escalars els quals no son tots 0 tals que:

$$\mu_0 v + \mu_1 f_\lambda(v) + \dots + \mu_{l-1} f_\lambda^{l-1}(v) = 0$$

Però ara apliquem f_λ^{l-1} i ens queda:

$$\mu_0 f_\lambda^{l-1}(v) + \mu_1 f_\lambda^l(v) + \dots + \mu_{l-1} f_\lambda^{l-1+l-1}(v) = 0$$

Aleshores, com que v és un vep generalitzat d'alçada l , a partir del segon son tots 0, per tant, no queda cap altra opció que $\mu_0 = 0$. Efectuant ara, per $1 \leq i \leq l - 2$, aquest procés de nou però amb f_λ^{l-i} veurem que $\mu_i = 0$. I, per tant, hem vist que totes les μ són 0, amb la qual cosa, per definició, són linealment independents. \square

Proposició 7. Els cicles de Jordan són f -invariants. (Per simplificar la notació fem servir $u_k = f_\lambda^{k-1}(v)$).

Demostració. Per $k \neq l$, sabem que, $f_\lambda(u_k) = u_{k+1}$, és a dir, $f(u_k) = \lambda u_k + u_{k+1}$. Per tant, per aquesta part, és invariant. Per últim, quan fem $f_\lambda(u_l) = 0$, per ser v un vep generalitzat d'alçada l . \square

Definició 8. Un cicle de Jordan de longitud l dona a lloc un Bloc de Jordan.

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \lambda & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Definició 9. Una base de Jordan de f és una base de E formada per cicles de Jordan.

$$M_{\mathcal{J}} = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & J_{\lambda_r} \end{pmatrix}$$

Teorema 10. Si el polinomi característic $P_f(t)$ descompon completament, aleshores, existeixen bases de Jordan.

Demostració. Anem a veure el cas en dimensió 2. Sigui $f : \mathbf{k}^2 \rightarrow \mathbf{k}^2$ un endomorfisme amb un únic vap λ amb $m_f(t) = (t - \lambda)^2$ i per tant, aquest és l'únic cas que no diagonalitza.

Agafem $u \in \mathbf{k}^2$ tal que $f_\lambda(u) \neq 0$ (per tant, u no és vep). Aleshores, escollim v de la següent manera: $v = f(u) - \lambda(u)$. Llavors la base $\{u, v\}$ és una base de Jordan. Amb matriu:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

Ara, en general, per a cada bloc, busquem un vector generador d'ordre el bloc (l). És a dir, v veg d'alçada l , és a dir, que estigui en el $\ker f_\lambda^l$ però no en el $\ker f_\lambda^{l-1}$. Recordem que $0 \subset \ker f_\lambda \subset \dots \subset \ker f_\lambda^l$.

Suposem f tal que $P_f(t) = (\lambda - t)^n$, aleshores \exists una base de Jordan.

En efecte, sigui $d_i = \dim \ker f_\lambda^i$. Farem un edifici on la planta i té amplada $l_m = d_i - d_{i-1}$. Escollim $u_1^m, \dots, u_{l_m}^m \in \ker f_\lambda^m \setminus \ker f_\lambda^{m-1}$ de manera que sigui l.i. u_i^m són veg d'alçada m , considerem $f_\lambda^k(u_i^m)$.

Lema 11. $f_\lambda^k(u_i^m)$ per $1 \leq i \leq l_m$ i per $0 \leq k \leq m-1$, són l.i.

Demostració. Suposem que tenim unes constants no totes nul·les μ tals que:

$$\sum_{k=0}^{m-1} \sum_{i=1}^{l_m} \mu_{ki} f_\lambda^k(u_i^m) = 0$$

Apliquem f_λ^{m-1} . Només ens queda el pis superior, el $k = 0$ i, per tant, $\sum_{i=1}^{l_m} \mu_{0i} f_\lambda^{m-1}(u_i^m) = 0$, però aquests ja sabem que eren l.i. Aleshores les seves μ_0 són totes 0. Encara ens queden les $k \geq 1$.

Ara apliquem f_λ^{m-2} , només ens queden el segon pis superior, ara fem:

$$\sum_{i=1}^{l_{m-1}} \mu_{1i} f_\lambda^{m-1}(u_i^m) = f_\lambda^{m-1} \left(\sum_{i=1}^{l_{m-1}} \mu_{1i} (u_i^m) \right) = 0$$

Però, com que sabem que els vectors de dins són l.i. totes les μ_1 han de ser 0 altra vegada. Reproduint aquest procés per a cada pis, arribem a que totes les μ són 0. \square

Baixem un pis, estem a $\ker f_\lambda^{m-1} \setminus \ker f_\lambda^{m-2}$ amb amplada l_{m-1} . Veurem que $\ker f_\lambda^{m-1} = \langle f_\lambda(u_1^m), \dots, f_\lambda(u_{l_m}^m) \rangle \oplus \ker f_\lambda^{m-2} \oplus V_{m-1} = (*) = u_{m-1} \oplus \ker f_\lambda^{m-2} \oplus V_{m-1}$. Aleshores, caldria escollir, $u_1^{m-1}, \dots, u_{r_{m-1}}^{m-1} \in V_{m-1} = \ker f_\lambda^{m-1} \setminus u_{m-1} \oplus \ker f_\lambda^{m-2}$ l.i. veg d'alçada $m-1$.

Lema 12 (*). Cal comprovar que $u_{m-1} \cap \ker f_\lambda^{m-2} = 0$. I per tant que la seva suma sigui directa.

Demostració. Sigui $w \in u_{m-1} \cap \ker f_\lambda^{m-2}$ i el descomponem en elements de u_{m-1} , llavors apliquem f_λ^{m-2} i, com que $w \in \ker f_\lambda^{m-2}$ el resultat hauria de ser 0, però ens queda:

$$0 = f_\lambda^{m-2}(w) = f_\lambda^{m-2} \left(\sum \mu_i f_\lambda(u_i^m) \right) = f_\lambda^{m-1} \left(\sum \mu_i u_i^m \right)$$

Ara, com que els elements que hi ha dins del parentesis són l.i. i no pertanyen al $\ker f_\lambda^{m-1}$, no pot haver constants diferents de 0 tals que el resultat sigui. Per tant, hem arribat a contradicció i les constants han de ser 0 i $w = 0$. Aleshores, l'intersecció és buida i hem acabat. \square

Seguint el mateix raonament per a cada pis, obtenim una base de Jordan. \square

Exemple 3. Sigui A la matriu d'una aplicació lineal.

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

En aquest cas, $P_A(t) = (3 - t)^5$, $m_A(t) = (t - 3)^3$ i $d_1 = 2, d_2 = 4$ i $d_3 = 5$.

e_1	
$f_\lambda(e_1)$	v
$f_\lambda^2(e_1)$	$f_\lambda(v)$

$u_1^3 \in \ker(A - 3\text{Id})^3 \setminus \ker(A - 3\text{Id})^2$, com per exemple, $u_1^3 = e_1$, $f_\lambda(u_1^3) = (4, -1, 1, 1, 0)$ i $f_\lambda^2(u_1) = e_3$.

Ara, cal $v \in \ker(A - 3\text{Id})^2 \setminus \ker(A - 3\text{Id}) \oplus \langle f_\lambda(u_1^3) \rangle$. Per exemple, $v = (-1, 0, 0, 0, 1)$ i $f_\lambda(v) = (0, 1, -1, 0, 0)$.

Observació 13. La quantitat de cicles de longitud exactament k és $2 \dim \ker f_\lambda^k - \dim \ker f_\lambda^{k-1} - \dim \ker f_\lambda^{k+1}$. Per tant, la quantitat de caixes de mida k depèn només de f (i de λ).

Observació 14. La reduïda de Jordan és única, llevat de reordenació dels Blocs.

Corol·lari 15. A, B son matrius conjugades ($\exists \in GL_n(\mathbf{k}), B = S^{-1}AS$) $\iff J_A = J_B$.

Exemple 4. Sigui B :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Veiem que $P_B(t) = (t - 1)^3(t - 2)$, que $m_B(t) = (t - 1)^2(t - 2)$ i, pel primer teorema de descomposició $E = \ker(B - \text{Id})^2 \oplus \ker(B - 2\text{Id})$. Per tant, $u_1 \in \ker(B - \text{Id})^2 \setminus \ker(B - \text{Id})$, $u_2 = f_\lambda(u_1)$ i anar fent...

1.1.3 Aplicacions de Jordan

Sigui $A \in \mathcal{M}_n(\mathbf{k})$, $P_A(k)$ descompon completament, \exists base de Jordan, una matriu J i una matriu invertible S tal que $J = S^{-1}AS$, o equivalentment $A = SJS^{-1}$.

1. Potències de A : A^k .

Observació 16. $A^k = (SJS^{-1})^k = (SJS^{-1})(SJS^{-1}) \cdots (SJS^{-1}) = (SJ^kS^{-1})$. Per tant, només cal calcular J^k .

Observació 17. La matriu de Jordan J és una matriu per blocs. Aleshores:

$$J^k = \begin{pmatrix} J_1^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_m^k \end{pmatrix}$$

Podem suposar que $J = J_l(\lambda)$ (que només té un bloc).

Observació 18. Podem escriure $J = D + N$ on D és una matriu diagonal (on tots els valors son el vap λ) i la matriu N és una matriu amb uns a la diagonal inferior. Aquesta matriu N compleix que la matriu N^k té només 1's a la diagonal k inferior. Per tant, en cada potència, la diagonal baixa i es reduïx en 1 el nombre de uns i arriba un potència l tal que $N^l = 0$ que és la matriu 0.

Observació 19. Les matrius N i D commuten ($D^n N^m = N^n D^m$). Ja que $D^n N^m = \lambda^n \text{Id} N^m = \lambda^n N^m = N^m \lambda^n \text{Id} = N^m D^n$. Aleshores, quan fem J^k dona:

$$J^k = (D + N)^k = D^k + kD^{k-1}N + \dots + N^k = \lambda \text{Id} + k\lambda^{k-1}N + \binom{k}{2}\lambda^{k-2}N^2 + \dots + \binom{k}{k-1}\lambda N^{k-1} + N^k$$

Proposició 20. Sigui l el nombre tal que $N^l = 0$ (bàsicament l és la mida de la matriu). Aleshores

$$J^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda^k & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^k & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & J_m^k \end{pmatrix}$$

2. Exponencial d'una matriu.

Sigui A una matriu, aleshores definim l'exponencial d'una matriu com:

$$e^A = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} A^n = \text{Id} + A + \frac{1}{2!} A^2 + \dots + \frac{1}{n!} A^n + \dots$$

(Faltarien fer comprovacions com que convergeix)

Formalment podem fer: $e^A = e^{SJS^{-1}} = Se^J S^{-1}$ i $e^J = e^{D+N} = e^D e^N$. I, a partir d'aquí, queda clar que $e^D = e^\lambda \text{Id}$ i que $e^N = \text{Id} + N + \frac{1}{2!} N^2 + \dots + \frac{1}{(l-1)!} N^{l-1} + 0$. Per tant, podem veure que:

$$e^J = e^\lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \frac{1}{2!} & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{(l-1)!} & \frac{1}{(l-2)!} & \frac{1}{(l-3)!} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

3. Sistemes lineals d'e.d.o. amb coef. constants.

Tenim un sistema de la forma:

$$\begin{aligned} x_1' &= a_{11}x_1(t) + \dots + a_{1n}x_n(t) \\ &\dots \\ x_n' &= a_{n1}x_1(t) + \dots + a_{nn}x_n(t) \end{aligned}$$

És a dir, $x'(t) = Ax(t)$, amb $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t))$ i $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Pel cas $n = 1$, $x'(t) = ax(t)$, fem $\frac{x'(t)}{x(t)} = a$, integrant, $\ln x(t) = at + b$, llavors $x(t) = e^{at}e^b = ce^{at}$. I per deduir la t ens calen unes condicions inicials.

En general, sense comprovació, és $x(t) = e^{At}x_0$, de la mateixa forma, x_0 són per les condicions inicials.

1.2 Formes quadràtiques

Motivació: Estudiar polinomis homogenis (de més d'una variable) de grau 2.

Definició 21. Una forma bilinial φ simètrica sobre E és una aplicació $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbf{k}$ tal que:

1. $\varphi(u_1 + u_2, v) = \varphi(u_1, v) + \varphi(u_2, v)$
2. $\varphi(\lambda u, v) = \lambda \varphi(u, v)$
3. $\varphi(u, v) = \varphi(v, u)$

Exemple 5. Alguns exemples:

1. $k = \mathbb{R}$ un producte escalar (euclidià) és una forma bilineal simètrica a més és def. positiva.
2. $k = \mathbb{R}$, $E = \mathbb{R}^2$ amb $\varphi((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = y_1 x_2 + y_2 x_1$ és bilineal i simètrica, però no definida postiva.

Definició 22. La forma quadràtica q_φ associada a φ és l'aplicació

$$q_\varphi : E \rightarrow \mathbf{k}$$

$$u \rightarrow q_\varphi(u) := \varphi(u, u)$$

Proposició 23. Propietats:

1. $q(\lambda u) = \lambda^2 q(u)$
2. $\varphi(u, v) = \frac{1}{2}[q(u+v) - q(u) - q(v)]$ (amb $\text{char}(k) \neq 2$, p.e. \mathbb{R}, \mathbb{C})
3. Hi ha una bijecció $\{\varphi \text{ formes bilineals simètriques}\} \leftrightarrow \{q \text{ formes quadràtiques}\}$. Si tinc una φ em determina una q_φ i si tinc una q aquesta determina una ψ tal que $q = q_\psi$.

Demostració.

1. $q(\lambda u) = \varphi(\lambda u, \lambda u) = \lambda^2 \varphi(u, u) = \lambda^2 q(u)$
2. $q(u+v) = \varphi(u+v, u+v) = \varphi(u, u) + \varphi(u, v) + \varphi(v, u) + \varphi(v, v)$ I aïllem.
3. Col·lorari de l'apartat anterior.

□

Formes bilineals i quadràtiques en una base \mathcal{B} . $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ base de E . $u = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n$ i $v = y_1 e_1 + \dots + y_n e_n$. I sigui φ una forma bilineal. Llavors

$$\varphi(u, v) = \varphi(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n, y_1 e_1 + \dots + y_n e_n) = \sum x_i y_i \varphi(e_i, e_j)$$

Definició 24. La matriu de φ en la base \mathcal{B} és $A = (a_{ij})$ amb $a_{ij} = \varphi(e_i, e_j)$.

Llavors, $\varphi(u, v) = \sum a_{ij} x_i y_j$ i $q(u) = \varphi(u, u) = \sum a_{ij} x_i x_j$ que és un polinomi homogeni de grau 2 en les coordenades de u en \mathcal{B} .

Observació 25. $\varphi(u, v) = X^t A Y =$

$$= (x_1 \quad \dots \quad x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

Canvi de base: Sigui $\mathcal{B}' = \{u_1, \dots, u_n\}$ un nova base i tenim $u = x'_1 u_1 + \dots + x'_n u_n$ i φ una forma bilineal. Sigui S la matriu de canvi de base de $SX' = X$, llavors

$$X^t A Y = (SX')^t A (SY') = X'^t (S^t A S) Y'$$

Proposició 26. $M_{\mathcal{B}'}(\varphi) = B = S^t A S$

Observació 27. $B = S^t A S$, S invertible.

1. $\text{rang}(A) = \text{rang}(B)$. Llavors podem definir $\text{rang } \varphi = \text{rang } A$.

2. $\det A \neq \det B$ perquè $\det B = \det S^2 \det A$.

Una manera de veure-ho és definint $\hat{\varphi} : E \rightarrow E^*$ que agafa u i l'envia a $\varphi(u, -) : E \rightarrow k$ i envia $v \mapsto \varphi(u, v)$.

Proposició 28. B una base i B^* la base dual, aleshores, $M_{B, B^*}(\hat{\varphi}) = A$.

Demostració. Calculem $\hat{\varphi}(e_i) = b_{1i}e_1^* + \dots + b_{ni}e_n^*$, que cada component és $b_{ji} = \hat{\varphi}(e_i)(e_j) = \varphi(e_i, e_j) = a_{ij} = a_{ji}$. Per tant, les matrius tenen les mateixes components. \square

Definició 29. El radical de φ és:

$$\text{rad}\varphi = \{u \in E \mid \varphi(u, v) = 0, \forall v \in E\} = \ker \hat{\varphi}$$

i escriurem $r_0 = \dim \text{rad}\varphi$. Direm que φ i q és de rang $r = n - r_0 = \text{rang } \hat{\varphi} = \text{rang } A$.

Exemple 6. $\varphi(x, y) = x_1y_2 + x_1y_3 + x_3y_3 + x_2y_1 + x_3y_1$, la matriu de la forma és:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3$$

Definició 30. B és una base q -ortogonal si $\varphi(e_i, e_j) = 0$ per $i \neq j$. I, per tant, la matriu A és diagonal.

Teorema 31. $\forall \varphi, q \exists$ bases q -ortogonals.

Demostració. Per inducció sobre n (la dimensió de E).

Per $n = 1$, la matriu és una sola constant i, per tant, diagonal.

Per $n - 1 \rightarrow n$ prenem $u \in E$ tal que $q(u) = \varphi(u, v) \neq 0$ [$\varphi \neq 0$]. Llavors, separem $E = \langle u \rangle + F$, amb $F = \ker \hat{\varphi}(u)$, però

$$\hat{\varphi}(u) : E \rightarrow k$$

Al ser k una imatge de dimensió, per dimensions $F = \ker \hat{\varphi}(u) = n - 1$. I u no està en el \ker de $\hat{\varphi}(u)$, llavors, es compleix que $E = \langle u \rangle \oplus F$. Per inducció, tenim $\varphi|_F$ admet una base q ortogonal $\{u_2, u_3, \dots, u_n\}$. Per últim, afegint $u_1 = u$ tenim una base de E que és q -ortogonal. \square

Observació 32. $\exists B$ de φ o q tal que

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha_r & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Amb $r = \text{rang } \varphi = \text{rang } A = \#\{\alpha_i \neq 0\}$. Llavors $q(x_1, \dots, x_r) = \alpha x_1^2 + \dots + \alpha x_r^2$.

Observació 33. Els valors de α_i estan determinats llevat de quadrats de k . Perquè al fer un canvi de base $B = S^t A S$, si $v_i = \beta_i u_i$, ens queda que α_i passa a $\beta_i^2 \alpha_i$. I la forma quadràtica: $q(y_1, \dots, y_n) = \alpha_i \beta_i^2 y_1^2 + \dots + \alpha_n \beta_n^2 y_n^2$.

Exemple 7. En el cas dels complexos, $k = \mathbb{C}$ sempre podem fer un canvi de base $y_i = \sqrt{\alpha_i} x_i$ i sempre ens acaba quedant suma de quadrats.

Exemple 8. Pels \mathbb{R} sempre podem aconseguir que la forma quadràtica quedi en sumes i restes de quadrats (perquè no amb quadrats de reals no podem canviar de signe).

1.2.1 Diagonalització de φ i q

Sigui A una matriu simétrica.

1. Congruència-pivot: Consisteix en fer canvis elementals per files i columnes alhora.

(EXEMPLE A LA LLIBRETETA)

Exemple 9. $k = \mathbb{R}$ pel teorema espectral el $P_A(t)$ és de grau 3 amb vaps 4,12..., -0.76..., 0.63...

2. Completació de quadrats. Consisteix en fer canvis algebraics per agrupar quadrats perfectes.

3. Mètode de Sylvester. En aquest mètode, suposem que la matriu és definida positiva. Per tant, tots els menors principals són positius estrictes.

Els menors principals d'una matriu són els determinants de les matrius $i \times i$ d'agafar només les primeres i files i columnes.

$$\delta_i = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Aleshores, $\exists B$ tal que

$$q(x_1, \dots, x_n) = \frac{\delta_1}{1} x_1^2 + \frac{\delta_2}{\delta_1} x_2^2 + \cdots + \frac{\delta_n}{\delta_{n-1} x_n^2}$$

Observació 34. Per l'exemple anterior no s'aplica, perquè $\delta_2 = 0$.

1.2.2 Classificació de formes quadràtiques en $k = \mathbb{C}$

Teorema 35. Dues formes bilineals (o quadràtiques) φ i ψ són equivalents (per canvi de base) si, i només si, $\text{rang}(\varphi) = \text{rang}(\psi)$ i, en aquest cas, són equivalents a:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Si $q(x_1, \dots, x_n)$ amb q sobre \mathbb{C} , llavors podem trobar un canvi de q per $q' = (y_1, \dots, y_n) = y_1^2 + \cdots + y_r^2$ on $r = \text{rang } q$.

Demostració. Hi ha una base B on φ diagonalitza amb 1s i 0s on el nombre de 1s és el rang de φ i, el mateix per ψ . Com tenen el mateix rang, contempen el mateix nombre de 1's. Així que els dos acaben arribant a la mateixa base. \square

Teorema 36. 1. Si φ/q és una forma real en \mathbb{R} , $\exists r_+ \geq 0$ tal que φ/q és equivalent:

$$q(x_1, \dots, x_n) = x_1^2 + \cdots + x_{r_+}^2 - x_{r_++1}^2 - \cdots - x_r^2$$

2. Si (r, r'_+) en les mateixes condicions $\implies r'_+ = r_+$.

3. $q \sim q' \iff r(q) = r(q')$ i $r_+(q) = r_+(q')$.

Demostració. 1. perquè els elements de la diagonal estan definits llevat de quadrats.

2. (r, r_+, r_-, r_0) on $r = \text{rang } q$, $r_- = r - r_+$, $r_0 = \dim \text{rad } \varphi$. Llavors $E = E^+ \oplus E^- \oplus \text{rad } \varphi$, on $\dim E^+ = r_+$. Si trobéssim una altra descomposició $E = F^+ \oplus F^- \oplus \text{rad } \varphi$. Veient que $F^+ \cap E^- = 0$, llavors $\dim F^+ \leq \dim E - \dim E^- - r_0 = \dim E^+$ i $\dim F^- \leq \dim E - \dim E^+ - r - 0 = \dim E^-$. Per tant, sumant a banda i banda: $\dim F^+ + \dim F^- \leq \dim E^+ + \dim E^-$, que com tots dos són iguals a $r - r_0$, arribem a que $\dim F^+ = \dim E^+$. \square

Observació 37. $\mathbf{k} = \mathbb{R}$, φ/q forma bilineal $A/M_B(\varphi)$. Llavors:

φ/q definida positiva $\iff r = r_+ = n \iff \delta_1, \dots, \delta_n > 0$.

φ/q definida negativa $\iff r = r_- = n \iff \delta_1 = a_n < 0, \delta_2 \dots, \delta_n$ alternats de signe.

Observació 38. r_+ es pot calcular per la regla de Descartes. Que diu: agafem $P(t) \in \mathbb{R}[t]$ que descompon completament, aleshores, el nombre d'arrels positives és el nombre de canvis de signe dels coeficients de $P(t)$. (per teorema espectral)

1.3 Tensors