

**PERAMALAN CURAH HUJAN DENGAN  
PEMBOBOTAN DERET WAKTU  
BERBASIS SPATIO TEMPORAL**

***RAINFALL FORECASTING USING TIME  
SERIES WEIGHTING BASED ON  
SPATIAL TEMPORAL***

**Tugas Akhir**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar sarjana dari program studi Sarjana Sains Data  
Direktorat Kampus Surabaya  
Universitas Telkom

Disusun oleh:  
**CALISTA GHEA ARDHANI**  
**NIM 1206220010**



**PROGRAM STUDI SARJANA SAINS DATA  
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA  
UNIVERSITAS TELKOM  
SURABAYA  
2025**

# LEMBAR PENGESAHAN

## TUGAS AKHIR

### PERAMALAN CURAH HUJAN DENGAN PEMBOBOTAN DERET WAKTU BERBASIS SPATIO TEMPORAL

Telah disetujui dan disahkan untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar pada Program Studi Sarjana Sains Data  
Direktorat Kampus Surabaya, Universitas Telkom

**CALISTA GHEA ARDHANI**

**NIM: 1206220010**

Surabaya, 1 Desember 2025

Menyetujui

Regita Putri Permata S.Stat., M.Stat.  
NIP: 22960008

(Pembimbing 1)

Rifdatun Ni'mah S.Si., M.Si.  
NIP: 22900008

(Pembimbing 2)

Dosen Penguji Satu  
NIP: Dosen Penguji Satu

(Penguji 1)

Dosen Penguji Dua  
NIP: Dosen Penguji Dua

(Penguji 2)

Ketua Program Studi Sarjana  
Sains Data

Moh. Hamim Zajuli Al Faroby, S.Si., M.Mat.  
NIP: 23950023

## Lembar Pernyataan Orisinalitas



Nama : CALISTA GHEA ARDHANI  
NIM : 1206220010  
Alamat : Jl. Residen Sudirman No 68K  
No. Telp : 081213770725  
Email : calistaghea@student.telkomuniversity.ac.id

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian karya ini.

Surabaya, 1 Desember 2025

CALISTA GHEA ARDHANI

## ABSTRAK

Curah hujan memiliki peran penting bagi berbagai sektor seperti pertanian, infrastruktur, dan pengelolaan risiko bencana, sehingga prediksi yang akurat menjadi kebutuhan utama terutama di kota besar seperti Surabaya yang rentan terhadap banjir dan genangan. Mengingat curah hujan dipengaruhi oleh variasi ruang dan waktu secara simultan, penelitian ini menerapkan model STARIMA untuk memprediksi curah hujan bulanan dengan mempertimbangkan keterkaitan dinamis antarwilayah. Data yang digunakan berasal dari citra satelit NASA POWER periode 2015 - 2024. Tahapan penelitian meliputi pra-pemrosesan data melalui transformasi Box-Cox dan differencing, analisis pola spasio-temporal, uji stasioneritas, penyusunan Spatial Weight Matrix menggunakan tiga skema bobot (seragam, invers jarak, dan korelasi silang), pembangunan model ARIMA sebagai model pembanding, serta evaluasi performa menggunakan RMSE. Hasil penelitian menunjukkan adanya pola musiman yang konsisten serta korelasi spasial yang kuat antarwilayah Surabaya, mencerminkan bahwa informasi ruang tidak dapat diabaikan dalam peramalan. Model terbaik diperoleh pada STARIMA(1,1,1) dengan lag spasial 1 dan bobot terbaiknya yaitu bobot seragam, yang menghasilkan RMSE rata-rata 1.728 lebih rendah dibandingkan model STARIMA lain maupun ARIMA. Misalnya di wilayah Timur, RMSE turun signifikan dari 4.596 (ARIMA) menjadi 1.407 (STARIMA). Temuan ini menegaskan bahwa integrasi aspek ruang dan waktu melalui STARIMA mampu meningkatkan akurasi prediksi curah hujan dan berpotensi mendukung sistem peringatan dini serta mitigasi bencana hidrometeorologi di Surabaya.

**Kata Kunci:** Prediksi Curah Hujan, Spatial Weight Matrix, STARIMA, Surabaya.

## *Abstract*

Rainfall plays a vital role in sectors such as agriculture, infrastructure, and disaster risk management, making accurate forecasting a critical necessity, particularly in major urban areas like Surabaya that are vulnerable to flooding and surface inundation. Given that rainfall is simultaneously influenced by spatial and temporal variations, this study applies the STARIMA model to forecast monthly rainfall while accounting for the dynamic interconnections among regions. The dataset employed is derived from NASA POWER satellite imagery covering the period 2015 - 2024. The research workflow includes data preprocessing using Box-Cox transformation and differencing, spatio-temporal pattern analysis, stationarity testing, construction of Spatial Weight Matrices with three weighting schemes (uniform, inverse-distance, and cross-correlation), development of ARIMA models as benchmarks, and performance evaluation using RMSE. The findings indicate consistent seasonal patterns and strong spatial correlations across Surabaya's regions, highlighting the essential role of spatial information in rainfall forecasting. The best-performing model is STARIMA(1,1,1) with a spatial lag of 1 and its optimal configuration—uniform weighting—yielding an average RMSE of 1.728, outperforming both other STARIMA variants and ARIMA. In the East region, for example, RMSE decreases significantly from 4.596 (ARIMA) to 1.407 (STARIMA). These results affirm that integrating spatial and temporal dimensions through the STARIMA framework substantially enhances rainfall forecasting accuracy and has the potential to support early warning systems and hydrometeorological disaster mitigation initiatives in Surabaya.

**Keywords:** Rainfall Prediction, Spatial Weight Matrix, STARIMA, Surabaya.

## Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul "Peramalan Curah Hujan dengan Pembobotan Deret Waktu Berbasis Spasio-Temporal" ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sains Data Universitas Telkom Kampus Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi curah hujan secara lebih akurat menggunakan model STARMA berbasis spasio-temporal. Diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi sistem peringatan dini dan kebijakan mitigasi bencana.

Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, seluruh pengajar, keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Surabaya, 1 Desember 2025  
CALISTA GHEA ARDHANI

# Daftar Isi

|                                                                                |          |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Lembar Persetujuan . . . . .                                                   | i        |
| Lembar Pernyataan Orisinalitas . . . . .                                       | ii       |
| Abstrak . . . . .                                                              | iii      |
| <i>Abstract</i> . . . . .                                                      | iv       |
| Kata Pengantar . . . . .                                                       | v        |
| Daftar Isi . . . . .                                                           | vi       |
| Daftar Tabel . . . . .                                                         | viii     |
| Daftar Gambar . . . . .                                                        | ix       |
| <b>I Pendahuluan . . . . .</b>                                                 | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang . . . . .                                                   | 1        |
| 1.2 Perumusan Masalah . . . . .                                                | 4        |
| 1.3 Tujuan Penelitian . . . . .                                                | 5        |
| 1.4 Batasan dan Asumsi Penelitian . . . . .                                    | 5        |
| 1.5 Manfaat Penelitian . . . . .                                               | 5        |
| 1.6 Sistematika Penulisan . . . . .                                            | 6        |
| <b>II Landasan Teori . . . . .</b>                                             | <b>8</b> |
| 2.1 Penelitian Terkait . . . . .                                               | 8        |
| 2.2 Peramalan . . . . .                                                        | 12       |
| 2.3 Menguji Kestasioneran Data . . . . .                                       | 13       |
| 2.4 ARIMA Model . . . . .                                                      | 14       |
| 2.5 Model STARMA ( <i>Space-Time Autoregressive Moving Average</i> ) . . . . . | 16       |
| 2.6 Spatial Weight Matrix (SWM) . . . . .                                      | 20       |
| 2.6.1 Konsep Dasar Spatial Weight Matrix . . . . .                             | 20       |

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6.2      | Bentuk Umum Matriks SWM . . . . .                               | 21        |
| 2.6.3      | Jenis-jenis Pembobotan . . . . .                                | 21        |
| 2.6.4      | Peran SWM dalam Model STARMA . . . . .                          | 23        |
| <b>III</b> | <b>Metodologi Penelitian . . . . .</b>                          | <b>24</b> |
| 3.1        | Metode Penelitian . . . . .                                     | 24        |
| 3.2        | Sumber Data . . . . .                                           | 25        |
| 3.2.1      | Data Sekunder . . . . .                                         | 25        |
| 3.3        | Pra-pemrosesan Data . . . . .                                   | 26        |
| 3.4        | Analisis Eksploratif Pola Spasio-Temporal Curah Hujan . . . . . | 27        |
| 3.5        | Pengecekan Kestasioneran Data . . . . .                         | 27        |
| 3.6        | Pembentukan <i>Spatial Weight Matrix</i> . . . . .              | 27        |
| 3.7        | Pembangunan Model ARIMA . . . . .                               | 27        |
| 3.8        | Pembangunan Model STARMA . . . . .                              | 28        |
| 3.9        | Evaluasi . . . . .                                              | 28        |
| 3.10       | Harapan Hasil Peramalan . . . . .                               | 28        |
| <b>IV</b>  | <b>Hasil dan Pembahasan . . . . .</b>                           | <b>29</b> |
| 4.1        | Eksplorasi Data . . . . .                                       | 29        |
| 4.1.1      | Statistika Deskriptif . . . . .                                 | 29        |
| 4.1.2      | Pola Curah Hujan Kelima Wilayah di Surabaya . . . . .           | 30        |
| 4.1.3      | Karakteristik dengan BoxPlot . . . . .                          | 33        |
| 4.1.4      | Analisis Temporal Curah Hujan . . . . .                         | 34        |
| 4.1.5      | Analisis Korelasi Spatio Temporal . . . . .                     | 35        |
| 4.2        | ARIMA . . . . .                                                 | 35        |
| 4.2.1      | Stasioner Data . . . . .                                        | 35        |
| 4.2.2      | Estimasi Parameter . . . . .                                    | 40        |
| 4.2.3      | Model Fitting . . . . .                                         | 41        |
| 4.2.4      | Hasil Forecasting ARIMA . . . . .                               | 42        |
| 4.3        | STARIMA . . . . .                                               | 45        |
| 4.3.1      | Stasioner Data . . . . .                                        | 45        |
| 4.3.2      | Bobot Seragam . . . . .                                         | 48        |
| 4.3.3      | Bobot Invers Jarak . . . . .                                    | 57        |
| 4.3.4      | Bobot Lokasi Normalisasi Korelasi Silang . . . . .              | 65        |
| 4.4        | Hasil Peramalan . . . . .                                       | 74        |
| <b>V</b>   | <b>Kesimpulan dan Saran . . . . .</b>                           | <b>76</b> |
| 5.1        | Kesimpulan . . . . .                                            | 76        |
| 5.2        | Saran . . . . .                                                 | 76        |
|            | <b>Daftar Pustaka . . . . .</b>                                 | <b>78</b> |
|            | <b>Lampiran . . . . .</b>                                       | <b>81</b> |



# Daftar Tabel

|      |                                                                                |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Data Curah Hujan Bulanan Berdasarkan Wilayah . . . . .                         | 25 |
| 4.1  | Statistika Deskriptif . . . . .                                                | 29 |
| 4.2  | Tabel Korelasi Setiap Wilayah . . . . .                                        | 35 |
| 4.3  | Nilai Lambda Semua Wilayah . . . . .                                           | 36 |
| 4.4  | Hasil Uji ADF . . . . .                                                        | 37 |
| 4.5  | Perbandingan RMSE Tanpa Transformasi dan Dengan Transformasi Box-Cox . . . . . | 39 |
| 4.6  | Estimasi Parameter ARIMA . . . . .                                             | 40 |
| 4.7  | Hasil Model Fitting ARIMA . . . . .                                            | 41 |
| 4.8  | Nilai Lambda Semua Wilayah . . . . .                                           | 46 |
| 4.9  | Hasil Uji ADF . . . . .                                                        | 47 |
| 4.10 | Estimasi Parameter . . . . .                                                   | 51 |
| 4.11 | Hasil Model Fitting STARIMA . . . . .                                          | 52 |
| 4.12 | Estimasi Parameter . . . . .                                                   | 60 |
| 4.13 | Hasil Model Fitting STARIMA . . . . .                                          | 60 |
| 4.14 | Estimasi Parameter . . . . .                                                   | 68 |
| 4.15 | Hasil Model Fitting STARIMA . . . . .                                          | 69 |
| 4.16 | Perbandingan RMSE ARIMA dan STARIMA per Wilayah . . .                          | 75 |

# Daftar Gambar

|      |                                                                |    |
|------|----------------------------------------------------------------|----|
| 3.1  | Diagram Alur Metodologi Penelitian . . . . .                   | 24 |
| 3.2  | Data NASA Wilayah Surabaya . . . . .                           | 25 |
| 4.1  | Pola Curah Hujan Wilayah Barat . . . . .                       | 30 |
| 4.2  | Pola Curah Hujan Wilayah Selatan . . . . .                     | 31 |
| 4.3  | Pola Curah Hujan Wilayah Tengah . . . . .                      | 31 |
| 4.4  | Pola Curah Hujan Wilayah Timur . . . . .                       | 32 |
| 4.5  | Pola Curah Hujan Wilayah Utara . . . . .                       | 32 |
| 4.6  | Boxplot Kelima Wilayah di Surabaya . . . . .                   | 33 |
| 4.7  | Seasonal Decompose Semua Wilayah . . . . .                     | 34 |
| 4.8  | Plot ACF dan PACF Wilayah Barat (Sebelum) . . . . .            | 38 |
| 4.9  | Plot ACF dan PACF Wilayah Barat (Sesudah) . . . . .            | 38 |
| 4.10 | Hasil Forecasting Wilayah Barat . . . . .                      | 42 |
| 4.11 | Hasil Forecasting Wilayah Selatan . . . . .                    | 43 |
| 4.12 | Hasil Forecasting Wilayah Tengah . . . . .                     | 43 |
| 4.13 | Hasil Forecasting Wilayah Timur . . . . .                      | 44 |
| 4.14 | Hasil Forecasting Wilayah Utara . . . . .                      | 45 |
| 4.15 | Hasil Grafik Curah Hujan Setelah Transformasi dan Differencing | 47 |
| 4.16 | STACF dan STPACF SLAG 0 . . . . .                              | 48 |
| 4.17 | STACF dan STPACF SLAG 1 . . . . .                              | 49 |
| 4.18 | Hasil Peramalan Wilayah Barat . . . . .                        | 53 |
| 4.19 | Hasil Peramalan Wilayah Selatan . . . . .                      | 54 |
| 4.20 | Hasil Peramalan Wilayah Tengah . . . . .                       | 55 |
| 4.21 | Hasil Peramalan Wilayah Timur . . . . .                        | 56 |
| 4.22 | Hasil Peramalan Wilayah Utara . . . . .                        | 57 |
| 4.23 | STACF dan STPACF SLAG 0 . . . . .                              | 58 |
| 4.24 | STACF dan STPACF SLAG 1 . . . . .                              | 59 |
| 4.25 | Hasil Peramalan Wilayah Barat . . . . .                        | 61 |
| 4.26 | Hasil Peramalan Wilayah Selatan . . . . .                      | 62 |
| 4.27 | Hasil Peramalan Wilayah Tengah . . . . .                       | 63 |
| 4.28 | Hasil Peramalan Wilayah Timur . . . . .                        | 64 |
| 4.29 | Hasil Peramalan Wilayah Utara . . . . .                        | 65 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 4.30 STACF dan STPACF SLAG 0 . . . . .         | 66 |
| 4.31 STACF dan STPACF SLAG 1 . . . . .         | 67 |
| 4.32 Hasil Peramalan Wilayah Barat . . . . .   | 70 |
| 4.33 Hasil Peramalan Wilayah Selatan . . . . . | 71 |
| 4.34 Hasil Peramalan Wilayah Tengah . . . . .  | 72 |
| 4.35 Hasil Peramalan Wilayah Timur . . . . .   | 73 |
| 4.36 Hasil Peramalan Wilayah Utara . . . . .   | 74 |

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang memiliki kepadatan aktivitas ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tinggi. (Saesarin 2020). Terletak di wilayah timur Pulau Jawa, Surabaya berada pada zona iklim tropis basah yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi iklim ini menjadikan curah hujan sebagai salah satu elemen penting dalam tata kelola perkotaan. Tingginya intensitas curah hujan dalam waktu singkat di Surabaya dapat menyebabkan genangan atau banjir yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan merusak infrastruktur. (Febriana 2019)

Curah hujan sendiri merupakan salah satu parameter meteorologi yang paling krusial dalam berbagai sektor, seperti pertanian, pengelolaan sumber daya air, mitigasi bencana, serta perencanaan pembangunan wilayah. Curah hujan menunjukkan banyaknya air hujan yang turun dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu. Dalam konteks kota seperti Surabaya, pemahaman terhadap curah hujan sangat penting untuk menunjang kebijakan adaptif dan strategi mitigasi terhadap dampak bencana hidrometeorologi. (Azka et al. 2018)

Dalam beberapa tahun terakhir terjadi ketidakpastian musim yang dipengaruhi oleh perubahan iklim global, termasuk pergeseran waktu dan intensitas musim penghujan maupun kemarau. Hal ini menjadikan upaya untuk memahami karakteristik curah hujan sebagai langkah penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim (Sofia et al. 2018). Salah satu karakteristik penting curah hujan adalah variabilitasnya, baik secara temporal (waktu) maupun spasial (lokasi geografis), yang mencerminkan fluktuasi jumlah serta distribusi hujan.

Untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang adaptif, diperlukan model prediksi curah hujan yang akurat. Pemodelan ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis pola hujan yang akan terjadi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan data curah hujan berbasis satelit dari NASA

untuk menganalisis dinamika curah hujan dan meramalkan pola curah hujan di wilayah Surabaya. Diharapkan hasil dari peramalan ini dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan perkotaan yang tanggap terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.

*Forecasting* atau peramalan adalah proses membuat prediksi mengenai kejadian di masa depan dengan menggunakan data historis dan pengetahuan saat ini. Tujuannya adalah memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Peramalan tidak selalu harus menghasilkan satu nilai pasti, dalam praktiknya dapat berupa nilai tunggal *point forecast*, interval prediksi, distribusi probabilitas atau kemungkinan terjadinya sesuatu. Proses peramalan melibatkan pengamatan pola masa lampau seperti tren, musiman, atau siklus, yang kemudian dianalisis menggunakan berbagai metode statistik atau teknik pembelajaran mesin (Petropoulos et al. 2021). Terdapat dua jenis metode peramalan yang terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif mengandalkan pendapat ahli dan bersifat subjektif, biasanya digunakan saat data historis sulit diperoleh. Sebaliknya, metode kuantitatif menggunakan prinsip statistik, lebih objektif, dan mencakup berbagai pendekatan salah satunya yaitu *time series* yang menganalisis pola data berurutan berdasarkan waktu untuk menghasilkan prediksi masa depan (Ruchjana 2019).

Namun, metode peramalan konvensional *time series* murni hanya mempertimbangkan aspek temporal tanpa mengikutsertakan faktor spasial, sehingga kurang optimal dalam menganalisis fenomena seperti curah hujan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah. Itu dibuktikan dalam penelitian yang berjudul "*Enhanced Spatio Temporal Modeling for Rainfall Forecasting: A High Resolution Grid Analysis*" yang menjelaskan bahwa model konvensional seperti ARIMA hanya menangkap aspek temporal dan linier. Tanpa mempertimbangkan korelasi spasial antar lokasi, model model tersebut sering kali gagal memberikan prediksi curah hujan yang akurat terutama ketika diterapkan pada wilayah dengan variasi geografis yang kompleks. Sebaliknya, pendekatan spatio temporal berbasis grid resolusi tinggi merupakan salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks iklim dan meteorologi (Alam et al. 2024).

Model spasio-temporal merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan fenomena alam dengan mempertimbangkan aspek lokasi (spasial) dan waktu (temporal) (Utami 2017). Dalam proses analisisnya, model ini memperhitungkan adanya ketergantungan antar lokasi pengamatan serta hubungan korelatif yang mungkin muncul dari keterlambatan waktu (lag). Data yang diamati berdasarkan waktu biasanya tidak bersifat independen, melainkan saling berkorelasi dan membentuk pola deret waktu. Model spasio-temporal pertama kali dikembangkan oleh Bilonick dan Nicholas pada tahun 1983, melalui penelitian curah hujan menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan pertama berfokus pada aspek temporal dengan mengabaikan pengaruh spasial, yang kedua menekankan pengaruh spasial tanpa mempertimbangkan aspek waktu,

dan yang ketiga menggabungkan keduanya dalam satu analisis (Islami et al. 2021).

Pendekatan spasio-temporal memungkinkan identifikasi kemiripan pola curah hujan antar wilayah dengan memperhatikan hubungan geografis antar lokasi, baik yang berdekatan maupun berjauhan. Salah satu alat penting dalam pendekatan ini adalah *Spatial Weight Matrix*. *Spatial Weight Matrix* merupakan matriks yang merepresentasikan kekuatan hubungan spasial antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya (Mukhaiyar et al. 2024). Nilai dalam matriks ini menunjukkan seberapa besar pengaruh satu lokasi terhadap lokasi lain berdasarkan kedekatan geografis, jarak, atau karakteristik spasial tertentu.

Dalam pengembangannya, *Spatial Weight Matrix* dapat dibentuk dalam dua dimensi (menggunakan koordinat horizontal) maupun tiga dimensi (menggabungkan perbedaan ketinggian). Pendekatan tiga dimensi ini menjadi penting ketika fenomena yang diteliti, seperti curah hujan atau muka air tanah, dipengaruhi oleh topografi atau elevasi wilayah. Matrix ini bisa dibentuk dengan berbagai metode seperti bobot berbasis inverse distance, bobot seragam, hingga yang dimodifikasi untuk memasukkan faktor ketinggian (Mukhaiyar et al. 2024).

Dengan menggunakan *Spatial Weight Matrix* yang tepat, model spatio-temporal seperti STARMA (*Space Time Autoregressive Moving Average*) mampu menangkap keterikatan spasial dan temporal secara simultan (Sharma et al. 2025). Model ini mengakomodasi efek pengaruh wilayah sekitar terhadap suatu lokasi, serta mempertimbangkan dinamika temporal yang mempengaruhi dari waktu ke waktu. STARMA menggunakan bobot dan mengintegrasikannya dengan temporal lag untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat terhadap fenomena spasio-temporal seperti curah hujan.

Penggunaan pendekatan spasio-temporal seperti STARMA menjadi semakin relevan di tengah kondisi perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan menjadi lebih ekstrem, tidak teratur, dan tidak menentu di berbagai wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perancangan model prediksi curah hujan berbasis spasio-temporal tidak hanya memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu, tetapi juga sangat krusial untuk mendukung sistem peringatan dini, kebijakan mitigasi bencana, dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Dalam mendukung kebutuhan tersebut, model spasio-temporal seperti STARMA telah dikembangkan dan digunakan untuk menangani fenomena yang melibatkan keterkaitan ruang dan waktu secara simultan. Konsep dasar dari model ini berakar pada penelitian awal oleh Cliff dan Ord pada tahun 1975 melalui pengembangan model STAR (*Space-Time Autoregressive*) serta model lanjutannya, yaitu STARMA (*Space-Time Autoregressive Moving Average*) (Laily 2020). Model STARMA menggabungkan pengaruh lag waktu sebelumnya baik dalam komponen autoregresif maupun *moving average*, yang berlaku tidak hanya secara temporal tetapi juga secara spasial. Model ini digunakan

untuk memodelkan data yang menunjukkan adanya autokorelasi spasial, yaitu keterkaitan antara nilai-nilai di lokasi yang berbeda dalam suatu sistem spasio-temporal (Rathod et al. 2018).

Berbagai pendekatan telah digunakan dalam peramalan curah hujan, mulai dari model *time series* konvensional seperti ARIMA yang menangani pola linier, hingga metode pembelajaran mesin seperti ANN, SVR, dan LSTM untuk menangani pola non-linier. Model *hybrid machine learning* menjadi alternatif menjanjikan karena mampu meningkatkan akurasi prediksi melalui kombinasi teknik dekomposisi sinyal dan algoritma optimasi, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada arsitektur dan pemrosesan data yang tepat (Latif et al. 2022).

Penelitian di Andhra Pradesh menggabungkan ARIMA, LSTM, XGBoost, dan Prophet dalam model ensemble menggunakan weighted averaging, menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model individu, dengan kontribusi besar dari ARIMA dan LSTM (Kumar et al. 2023). Di Indonesia, penelitian menggunakan algoritma *clustering* berbasis DTW menunjukkan bahwa klasifikasi iklim tidak hanya berdasarkan rata-rata, tetapi juga mempertimbangkan pola spasio-temporal (Suryana et al. 2023). Penelitian lain membandingkan beberapa algoritma *machine learning* dan menemukan bahwa *Random Forest Regressor* paling akurat dalam memprediksi curah hujan berdasarkan atribut suhu, kelembapan, dan tekanan udara (Jagtap & Karande 2019).

Namun, model konvensional dan *machine learning* sering kurang efektif untuk data spasio-temporal karena kompleksitas polanya. Untuk itu, model STARMA dirancang khusus menangani data tersebut dan terbukti efektif dalam berbagai studi klimatologis. Contohnya, model hibrida STARMA-ANN-SVM digunakan untuk memprediksi curah hujan tahunan di Bengal Barat (Saha et al. 2020). Di Indonesia, model GSTAR juga telah diterapkan pada data curah hujan di Jawa Tengah dengan hasil yang menunjukkan pengaruh spasial yang signifikan. Sementara itu, pengembangan model STARMA II yang menggabungkan STARMA dan TDNN berhasil meningkatkan akurasi prediksi hasil panen padi dengan menggunakan matriks spasial berbasis KNN dan korelasi Pearson untuk menggambarkan *Spatio Temporal Similarity* antar wilayah (Badu-Apraku et al. 2021).

Dengan melihat studi-studi terdahulu terbukti bahwa penggunaan model STARMA dan variannya mampu memberikan hasil prediksi yang lebih akurat pada data yang memiliki ketergantungan ruang dan waktu, khususnya dalam dominan meteorologi dan iklim.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pola curah hujan di wilayah Surabaya dalam dimensi spasial temporal?

2. Bagaimana efektifitas pembobotan spatio temporal dalam memprediksi model curah hujan?
3. Bagaimana hasil peramalan berdasarkan pembobotan spasio temporal dalam memprediksi curah hujan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai pada penulisan proposal/TA.

1. Untuk menganalisis pola penyebaran curah hujan di Surabaya dari waktu ke waktu dan antar lokasi dalam wilayah tersebut.
2. Untuk mendapatkan model curah hujan yang efektif dalam menangkap keterkaitan spatial dan temporal dalam data curah hujan Surabaya.
3. Untuk mengidentifikasi hasil peramalan curah hujan dengan pembobotan spasio temporal.

### 1.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

Hipotesis dari tulisan ini adalah

1. Data penelitian ini diambil dari data NASA yang dianggap sudah melalui proses validasi dan tidak mengandung kesalahan pencatatan yang signifikan ada di wilayah Surabaya
2. Data curah hujan yang digunakan adalah data bulanan selama 2015 sampai 2024
3. Model Spasio temporal yang digunakan adalah STARMA yang dianggap mampu merepresentasikan spatial dan temporal dalam curah hujan tanpa penggabungan model hybrid atau *machine learning*
4. Data NASA berupa tangkapan satelit di wilayah Surabaya didasarkan pada koordinat geografis (longitude dan latitude).

### 1.5 Manfaat Penelitian

Kontribusi dari tulisan ini adalah

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu statistik dan klimatologi, khususnya dalam pemodelan *spasio-temporal* data cuaca menggunakan metode STARMA.
2. Menambah referensi penelitian yang mengintegrasikan pendekatan statistik spasial dan deret waktu dalam konteks prediksi cuaca di Surabaya.
3. Menyediakan informasi komparatif mengenai hasil peramalan dari berbagai skema pembobotan, seperti bobot seragam, inverse jarak, korelasi silang untuk meningkatkan akurasi model STARMA.



## 1.6 Sistematika Penulisan

Berikut adalah gambaran singkat mengenai uraian secara singkat lingkup isi dari setiap Bab yang ada di dalam Buku Tugas Akhir ini:

### 1. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang pentingnya peramalan curah hujan di Surabaya sebagai kota metropolitan yang rawan banjir dan dipengaruhi dinamika iklim tropis basah. Bab ini menyoroti kompleksitas curah hujan yang dipengaruhi oleh factor spasial dan temporal, sehingga model time series biasas seperti ARIMA kurang memadai. Dijelaskan juga perkembangan model spasio-temporal seperti STARIMA yang dapat menangkap ketergantungan antar lokasi dan antar waktu. Berdasarkan fenomena dan studi terdahulu, dirumuskan tiga masalah utama pola spasio temporal curah hujan, efektif pembobotan SWM, serta hasil peramalan. Bab ini juga memuat tujuan penelitian, batasan data NASA (2015 hingga 2024), asumsi, manfaat penelitian, serta rencana dan jadwal kegiatan penelitian.

### 2. Kajian Pustaka

Bab ini berisi teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pemodelan curah hujan spasio temporal. Disajikan berbagai studi menggunakan ARIMA, STARMA, model hibrida, fuzzy STARMA, dan pembobotan spasial adaptif. Bab ini menjelaskan konsep dasar peramalan, jenis metode, RMSE sebagai evaluasi, serta kestasioneran data dengan uji ADF. Selanjutnya dibahas teori ARIMA, identifikasi orde dengan ACF/PACF, estimasi parameter, dan diagnostik model. Bagian inti menjelaskan model STARMA: struktur matematisnya, STACF/STPACF untuk identifikasi orde spasial-temporal, estimasi parameter AR dan MA, uji signifikansi, serta peran penting Spatial Weight Matrix. Jenis pembobotan SWM (seragam, invers jarak, korelasi silang) dijelaskan lengkap sebagai dasar model utama.

### 3. Metodologi

Bab ini menyajikan langkah-langkah penelitian secara sistematis. Dimulai dengan alur metode penelitian, kemudian dijelaskan sumber data curah hujan satelit NASA POWER untuk lima wilayah Surabaya tahun 2015–2024. Tahapan pra-pemrosesan mencakup pembersihan data, transformasi Box-Cox, dan differencing. Analisis eksploratif mencakup visualisasi pola spasial dan temporal. Setelah itu dilakukan uji kestasioneran, pembentukan tiga jenis Spatial Weight Matrix, serta pembangunan model baseline ARIMA. Setelah ARIMA, dibangun model STARMA dengan tiga jenis bobot: seragam, invers jarak, dan korelasi silang. Bab

ini ditutup dengan penjelasan teknik evaluasi menggunakan RMSE serta tujuan akhir peramalan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil implementasi seluruh langkah penelitian. Pertama dilakukan eksplorasi data curah hujan untuk lima wilayah Surabaya, termasuk statistik deskriptif, pola musiman, dan korelasi antar wilayah. Selanjutnya hasil ARIMA ditampilkan: uji stasioner, estimasi parameter, fitting model, dan grafik peramalan untuk tiap wilayah. Bagian terbesar membahas STARMA. Setiap jenis bobot (seragam, invers jarak, korelasi silang) dianalisis dari:

- a. Hasil Stationeritas
- b. Hasil STACF dan STPACF
- c. Estimasi parameter
- d. Fitting model
- e. Grafik hasil peramalan tiap wilayah

Setiap bobot dibandingkan performanya. Bab ini menunjukkan bahwa pembobotan tertentu memberikan RMSE paling rendah dan model STARMA lebih unggul dibanding ARIMA.

#### 5. Kesimpulan dan Saran

Bab ini merangkum temuan utama penelitian:

- a. Pola curah hujan di Surabaya memiliki variasi spasio-temporal kuat.
- b. Pembobotan spasial memengaruhi performa STARMA secara signifikan.
- c. Model STARMA tertentu menghasilkan prediksi terbaik berdasarkan RMSE.

Saran diberikan untuk pengembangan selanjutnya, seperti penggunaan resolusi data lebih tinggi, model hybrid, atau pembobotan spasial adaptif untuk meningkatkan akurasi.

## Bab II

### Landasan Teori

Pada bab ini, dipaparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, ditunjukkan beberapa teori-teori yang menjadi landasan penyelesaian masalah yang dikemukakan pada penelitian ini.

#### 2.1 Penelitian Terkait

Pada sub bab ini, dipaparkan mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Fuad et al. 2021) yaitu memodelkan dan memprediksi penyebaran kasus COVID-19 di tiga kota wilayah Mekkah yaitu Jeddah, Makkah dan Taif dengan memanfaatkan pendekatan statistik ARIMA dan STARIMA (Space Time ARIMA). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa kedua model tersebut serta menilai pengaruh hubungan spasial antar wilayah terhadap Akurasi Prediksi. Dalam studinya, penulis menggunakan data 31 Mei hingga 11 Oktober 2020. Analisis awal menunjukkan bahwa data belum stasioner sehingga dilakukan transformasi log dan diferensiasi pertama. Model ARIMA dibangun secara terpisah untuk setiap kota Menggunakan pendekatan Box Jenkins, sedangkan model STARIMA dikembangkan secara simultan dengan mempertimbangkan hubungan spasial antar lokasi melalui spatial weight matrix, yang merepresentasikan keterhubungan antar kota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model STARIMA mampu menangkap autokorelasi ruang waktu dengan lebih baik dibandingkan ARIMA univariat. Model terbaik yang diperoleh adalah STARIMA  $(1_0, 1, 1_1)$  yang menunjukkan nilai MAE, MSE, dan RMSE lebih rendah dibandingkan model ARIMA diketioga kota. Temuan ini menegaskan bahwa mempertimbangkan hubungan spasial (misalnya kedekatan geografis atau mobilitas penduduk antar kota) dapat secara signifikan meningkatkan Akurasi Peramalan penyebaran COVID-19.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan spasial temporal seperti STARIMA lebih unggul dan direkomendasikan untuk data epidemiologi yang memiliki pola penyebaran antar wilayah. Studi ini juga membuka peluang untuk penggunaan model spasial temporal yang lebih kompleks seperti Bayesian spatial temporal models atau spatial panel models untuk analisis lanjutan.

2. Dalam penelitian yang berjudul “*Enhanced Spatio-Temporal Modeling for Rainfall Forecasting: A High-Resolution Grid Analysis*” Curah hujan sangat penting bagi pertanian, terutama di negara seperti India. Karena bersifat spasio-temporal, peramalan curah hujan menjadi kompleks dan tidak cocok jika hanya menggunakan model deret waktu atau machine learning konvensional. Diperlukan pendekatan yang mampu menangani pola *non-linear*, *non-stasioner*, dan *non-normal*. Model STARMA efektif dalam menangkap ketergantungan spasial dan temporal sekaligus, dibantu oleh Spatial Weight Matrix (SWM) untuk mengintegrasikan pengaruh lokasi sekitar. Studi ini menggunakan data curah hujan tahunan selama 50 tahun (1970–2019) dari 119 lokasi di West Bengal, India, yang dibagi menjadi data pelatihan dan pengujian. Hasilnya menunjukkan bahwa model STARMA mampu meningkatkan akurasi peramalan, yang bermanfaat untuk perencanaan dan pengelolaan pertanian di wilayah rentan terhadap perubahan iklim (Alam et al. 2024)
3. Dalam penelitian yang berjudul “*An improved Space-Time Autoregressive Moving Average (STARMA) model for Modelling and Forecasting of Spatio-Temporal time-series data*” menjelaskan bahwa Model *Box-Jenkins* univariat tidak mampu menangani ketergantungan spasial yang sering muncul dalam fenomena iklim. Untuk mengatasi hal ini, digunakan model STARMA (*Space-Time Autoregressive Moving Average*) yang memasukkan hubungan spasial dan temporal secara simultan melalui matriks bobot spasial. Dalam penelitian ini, digunakan matriks bobot spasial seragam orde dua dan bobot berdasarkan jarak terbalik yang dihitung menggunakan jarak lingkaran besar (*great circle distance*) dari koordinat lintang dan bujur. Metode ini diuji pada data simulasi dan data nyata berupa suhu maksimum bulanan di sembilan distrik Karnataka Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa model STARMA yang diusulkan memberikan performa yang lebih baik dibandingkan ARIMA univariat dan STARMA orde spasial pertama dalam pemodelan dan peramalan deret waktu spasio-temporal (Rathod et al. 2018)
4. Penelitian ini berhasil mengembangkan dan menguji model prediksi hasil panen padi berbasis pendekatan two-stage yang dinamakan STARMA II (*Spatio-Temporal Autoregressive Moving Average with Time Delay Ne-*

ural Network). Model ini menggabungkan keunggulan model STARMA yang menangkap ketergantungan spasial dan temporal secara linear dengan kemampuan model *Time Delay Neural Network* (TDNN) dalam mempelajari hubungan non-linear dari data time series.

Dalam implementasinya, pengaruh spasial antar distrik dimodelkan menggunakan *Spatial Weight Matrix* (SWM) yang dibangun berdasarkan gabungan metode *K-Nearest Neighbors* (KNN) dan koefisien korelasi Pearson. Matriks ini berfungsi untuk merepresentasikan kemiripan spatio-temporal antar wilayah secara kuantitatif, yang kemudian digunakan dalam tahap pelatihan model untuk menangkap pola hubungan antar wilayah dalam konteks produksi padi.

Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa STARMA II memberikan akurasi prediksi yang lebih tinggi dan konsisten dibandingkan dengan:

- Model ARIMA yang hanya mempertimbangkan aspek temporal (waktu), dan
- Model STARMA klasik yang hanya menangkap hubungan linier antar ruang dan waktu.

Kinerja model diukur melalui metrik evaluasi seperti *Root Mean Square Error* (RMSE), *Mean Absolute Error* (MAE), dan *Coefficient of Determination* ( $R^2$ ), di mana STARMA II unggul secara signifikan dalam semua indikator.

Dengan demikian, pendekatan two-stage hybrid model seperti STARMA II terbukti lebih efektif dalam memodelkan dinamika kompleks produksi padi yang dipengaruhi oleh faktor spasial dan temporal, serta memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam sistem peringatan dini, perencanaan pertanian, dan pengambilan kebijakan berbasis data (Badu-Apraku et al. 2021)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Saha, Singh, Ray, Rathod, dan Dhyani (2022) bertujuan untuk meningkatkan akurasi peramalan suhu dengan mengembangkan model baru yang disebut *Fuzzy Rule-Based Weighted Space-Time Autoregressive Moving Average* (STARMA). Model ini merupakan pengembangan dari STARMA konvensional, dengan mengintegrasikan sistem inferensi fuzzy (FIS) untuk menghitung bobot spasial antar lokasi. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan dari matriks bobot spasial konvensional yang tidak mampu menangkap dinamika dan heterogenitas spasial secara optimal. Dalam penelitian ini, data suhu maksimum bulanan digunakan dari tujuh distrik di negara bagian West Bengal, India, untuk mengembangkan model, serta dari sembilan distrik di Karnataka untuk validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

model fuzzy STARMA memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan model STARMA konvensional dan model ARIMA. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yang lebih rendah, yaitu 1,78% untuk model fuzzy STARMA, dibandingkan dengan 2,09% untuk STARMA biasa, dan 4,39% untuk ARIMA. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan sistem inferensi fuzzy dalam peramalan spasial-temporal memberikan peningkatan performa yang signifikan. Model ini sangat berpotensi untuk digunakan dalam aplikasi yang berkaitan dengan perencanaan iklim dan sektor pertanian, khususnya di wilayah yang memiliki karakteristik spasial yang kompleks seperti India (Saha et al. 2022)

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar, Sarkar, Dhakre, dan Bhattacharya (2023) bertujuan untuk meningkatkan akurasi peramalan suhu bulanan dengan mengembangkan pendekatan pemodelan hibrida yang menggabungkan model *Space-Time Autoregressive Moving Average* (STARMA) dan *Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity* (GARCH). Studi ini difokuskan pada peramalan suhu maksimum bulanan dan rentang suhu di delapan lokasi di negara bagian Bihar, India. Model STARMA digunakan untuk menangkap pola spasial dan temporal dalam data, dengan matriks bobot spasial yang dikonstruksi berdasarkan jarak antar lokasi. Setelah penerapan STARMA, residual model dianalisis lebih lanjut menggunakan uji BDS dan ARCH-LM, yang menunjukkan adanya karakteristik nonlinier dan heteroskedastisitas. Untuk menangani fenomena ini, model GARCH diterapkan pada residual STARMA, membentuk pendekatan hibrida STARMA-GARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model STARMA-GARCH (khususnya konfigurasi STARMA(1,1,0,0)-GARCH(0,1)) memberikan performa yang lebih baik dibandingkan model STARMA murni, dengan nilai kesalahan prediksi (MAPE) yang lebih rendah di semua lokasi. Uji diagnostik tambahan seperti uji Ljung-Box Q juga menunjukkan bahwa residual dari model hibrida tidak memiliki autokorelasi, menandakan bahwa model tersebut telah dikalibrasi dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan pemodelan hibrida ini sangat efektif dalam menangkap dinamika kompleks suhu bulanan dan dapat menjadi alat yang andal untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor-sektor yang sensitif terhadap iklim seperti pertanian dan pengelolaan sumber daya alam (Kumar et al. n.d.)

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak mengembangkan model peramalan spasio-temporal menggunakan pendekatan STARMA dan variannya dengan integrasi matriks bobot spasial. Meskipun model STARMA efektif dalam menangkap ketergantungan linier spasial dan temporal,

model ini masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi pola non-linear dan heterogenitas spasial yang kompleks, terutama dalam konteks data curah hujan. Selain itu, konstruksi matriks bobot spasial yang digunakan sebagian besar masih bersifat statis dan umum, seperti berdasarkan jarak geografis atau metode *K-Nearest Neighbors*, sehingga kurang mampu menangkap dinamika hubungan spasial-temporal secara adaptif. Selanjutnya, belum banyak penelitian yang secara eksplisit memanfaatkan pembobotan deret waktu berbasis kemiripan spasio-temporal yang menggabungkan aspek spasial dan temporal secara simultan dan kuantitatif, khususnya untuk peramalan curah hujan dengan skala spasial dan temporal yang rinci. Selain itu, kompleksitas model yang tinggi pada beberapa pendekatan hibrida seperti *neural network* dan *fuzzy inference* juga menimbulkan tantangan terkait efisiensi komputasi pada data berukuran besar. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengembangkan model peramalan curah hujan yang menggunakan pembobotan seragam, pembobotan invers jarak, dan pembobotan korelasi silang yang adaptif. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi peramalan curah hujan sekaligus mendukung pengambilan keputusan di bidang pertanian dan mitigasi risiko bencana iklim.

## 2.2 Peramalan

Peramalan deret waktu (*time series forecasting*) merupakan komponen kunci yang digunakan dalam berbagai bidang untuk memprediksi kejadian di masa depan dan mengidentifikasi tren. Metode peramalan terbagi menjadi dua yaitu kualitatif (berbasis opini ahli) dan kuantitatif (berbasis analisis statistik dan matematis), dengan deret waktu sebagai salah satu pendekatan kuantitatif yang umum digunakan karena menganalisis data berurutan berdasarkan waktu (Petropoulos et al. 2021). Model-model peramalan telah berkembang secara bertahap seiring waktu. Pada awalnya, metode prediksi deret waktu mengandalkan prosedur statistik murni seperti analisis regresi dan metode ARIMA (Putra et al. 2019). Metode statistik ini bekerja dengan baik untuk data dengan hubungan linier. Untuk data non linier, model kecerdasan buatan terutama jaringan saraf telah digunakan (Marino et al. 2016). Baru baru ini, metode hibrida yang menggabungkan metode statistik dengan pendekatan deep learning telah dikembangkan untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat (Jagtap & Karande 2019). Bahkan model konvensional seperti ARIMA sering kali gagal memberikan prediksi curah hujan yang akurat ketika diterapkan pada wilayah dengan variasi geografis yang kompleks sehingga memerlukan model alternatif. Maka dari itu, dalam konteks penelitian ini menggunakan model yang efektif ketika berhadapan dengan data spatio temporal. Untuk mengetahui model itu efektif atau tidaknya dalam penelitian ini menggunakan

evaluasi RMSE. Berikut adalah rumus umum untuk menghitung RMSE.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (2.1)$$

Persamaan (2.1) menunjukkan rumus *Root Mean Square Error* (RMSE). Keterangan:

- $y_t$  : nilai aktual pada waktu ke- $t$
- $\hat{y}_t$  : nilai prediksi pada waktu ke- $t$
- $n$  : jumlah total data atau observasi yang diprediksi

Nilai-nilai seperti RMSE merupakan ukuran tingkat kesalahan prediksi. Semakin rendah nilai-nilai ini, maka semakin akurat model dalam memprediksi data.

### 2.3 Menguji Kestasioneran Data

Kestasioneran dalam data deret waktu merupakan salah satu asumsi utama dalam analisis deret waktu. Suatu deret dianggap stasioner apabila nilai rata-rata dan variansinya tidak berubah seiring waktu (Ilmi et al. 2023). Artinya, data tersebut cenderung stabil dan berfluktuasi di sekitar nilai tengah yang tetap. Untuk menilai apakah data stasioner dalam hal rata-rata, dapat dilakukan secara visual dengan membuat plot antara nilai observasi dan waktu. Jika grafik menunjukkan pola fluktuasi yang konsisten di sekitar garis lurus dengan penyebaran yang relatif seragam, maka data dapat dianggap stasioner. Selain pendekatan visual, pengujian kestasioneran rata-rata juga dapat dilakukan menggunakan metode statistik seperti uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF).

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2.2)$$

Keterangan:

- $\Delta y_t$  : Diferensiasi orde pertama, yaitu  $y_t - y_{t-1}$ , digunakan untuk mengubah data menjadi stasioner.
- $\alpha$  : Konstanta (intersep) dalam model regresi.
- $\beta t$  : Tren waktu (opsional), mencerminkan arah pergerakan jangka panjang dalam data.
- $\gamma y_{t-1}$  : Komponen autoregresif (lag 1), digunakan untuk menguji keberadaan akar unit (unit root).



- $\sum_{i=1}^p \delta_i \Delta y_{t-i}$  : Lag dari perubahan  $y$  hingga lag ke- $p$ , untuk mengatasi autokorelasi serial dalam residual.
- $\varepsilon_t$  : Error term (white noise), mewakili gangguan acak yang tidak berkorelasi satu sama lain.

## 2.4 ARIMA Model

*Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) merupakan salah satu model deret waktu konvensional yang banyak digunakan, terutama sejak diperkenalkan oleh Box dan Jenkins (1970). Model ini membentuk pola deret waktu berdasarkan nilai masa lalu (lag) dan error acak (white noise) (Rathod et al. 2017). ARIMA terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: Autoregressive (AR), Integrated (I), dan Moving Average (MA). Komponen AR merepresentasikan pengaruh nilai sebelumnya, I berfungsi menjadikan data stasioner melalui proses differencing, sedangkan MA mencerminkan pengaruh kesalahan masa lalu. Secara umum, model ini dinotasikan sebagai ARIMA (p, d, q), di mana p adalah orde AR, d adalah tingkat differencing, dan q adalah orde MA.

Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai model model dalam metode tersebut.

### 1. Model Autoregressive (AR)

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \phi_2 X_{t-2} + \dots + \phi_p X_{t-p} + u_t \quad (2.3)$$

Model ini disebut model *autoregressive* karena variabel  $X_t$  bergantung secara linear pada nilai nya sendiri pada periode sebelumnya ( $X_{t-1}, X_{t-2}, \dots, X_{t-p}$ ). Dengan kata lain, observasi saat ini  $X_t$  dapat dinyatakan sebagai fungsi linear dari observasi sebelumnya berserta komponen error acak yang dilambangkan dengan  $U_t$

### 2. Model Moving Average (MA)

$$X_t = u_t - \theta_1 u_{t-1} - \theta_2 u_{t-2} - \dots - \theta_q u_{t-q} \quad (2.4)$$

Model ini disebut model *moving average* karena variabel  $X_t$  bergantung secara linear pada error acak periode sekarang dan periode sebelumnya ( $U_t, U_{t-1}, U_{t-2}, \dots, U_{t-q}$ )

### 3. Model Autoregressive Moving Average (ARMA)

$$X_t = \phi_1 X_{t-1} + \dots + \phi_p X_{t-p} - \theta_1 u_{t-1} - \dots - \theta_q u_{t-q} + u_t \quad (2.5)$$

Model ARMA menggabungkan kedua komponen yaitu ketergantungan terhadap nilai-nilai masa lalu ( $X_{t-1}, X_{t-2}, \dots, X_{t-p}$ ) dan ketergantungan terhadap error sebelumnya ( $U_t, U_{t-1}, \dots, U_{t-q}$ ).

#### 4. Model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

$$\Phi(B)(1 - B)^d W_t = \theta(B)U_t \quad (2.6)$$

dimana  $W_t$  adalah diferensiasi pertama dari  $X_t$ , i.e.,  $W_t = X_t - X_{t-1}$ . Sebagian deret waktu bersifat tidak stasioner terhadap mean, sehingga diperlukan proses differensiasi untuk membuatnya stasioner. Setelah proses differencing, deret yang telah stasioner dapat dimodelkan menggunakan ARMA, tetapi diperlukan operator differencing sebagai bagian dari model. Ketika tingkat interasi pada sebuah proses menunjukkan berapa kali differencing dilakukan untuk mencapai kestasioneran, model tersebut dinamakan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dengan bentuk umum ARIMA (p,d,q), dimana:

- p = orde autoregressive (AR)
- d = tingkat differencing
- q = orde moving average (MA)

Langkah langkah dalam membangun model ARIMA yaitu:

##### 1. Estimasi Parameter Model:

Latih model ARIMA dengan orde (p, d, q) yang telah ditentukan menggunakan data pelatihan. Parameter-parameter model diestimasi menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE).

##### 2. Menghitung Residual:

Untuk memvalidasi model, residual dari persamaan yang diestimasi harus white noise. Berikut adalah rumus ACF Residual

$$ACF(k) = \frac{\sum_{t=1}^{T-k} (e_t - \bar{e})(e_{t+k} - \bar{e})}{\sum_{t=1}^{T-k} (e_t - \bar{e})^2} \quad (2.7)$$

Keterangan:

- ACF(k) = Korelasi antara residu pada lag ke-k
- k = Lag yang diinginkan
- $e_t$  = Residu pada waktu ke-t
- $\bar{e}$  = Rata-rata dari semua residu
- T = Jumlah observasi dalam deret waktu

3. Diagnostik Model Analisis Residual Periksa residu model (kesalahan prediksi) untuk memastikan mereka mendekati white noise (tidak ada autokorelasi, rata-rata nol, varians konstan). Gunakan uji Ljung-Box dan plot ACF/PACF residu. Rumus Ljung-Box :

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \quad (2.8)$$

Keterangan:

- Q: Statistik Uji Ljung-box
- n : Jumlah observasi (ukuran sampel) dalam deret waktu.
- h : Jumlah lag yang diuji (batas atas jumlah autokorelasi yang dihitung). Nilai h dapat ditentukan sesuai kebutuhan; secara umum digunakan nilai  $h = 1, 2, 3$
- $\rho_k$ : Estimasi koefisien autokorelasi dari residu pada lag ke-k

## 2.5 Model STARMA (*Space-Time Autoregressive Moving Average*)

1. Estimasi Parameter

Setelah orde  $(p, q, \lambda, \mu)$  dan matriks bobot spasial ditentukan, parameter model STARMA diestimasi. Estimasi parameter STARMA menggunakan Maximum Likelihood Estimation Langkah-langkah estimasi Maximum Likelihood Estimation:

- a) Membangun model ST-AR (Spatiotemporal Autoregressive)
  - i) Rumus umum

$$\mathbf{Z}_t = \sum_{k=1}^p \sum_{l=0}^{\lambda_k} \phi_{kl} W^l \mathbf{Z}_{t-k} + \mathbf{e}_t \quad (2.9)$$

Keterangan:

- $\mathbf{Z}_t$ : Vektor data variabel dependen di semua lokasi pada waktu  $t$ .
- $p$ : Orde lag temporal (berapa periode waktu ke belakang data mempengaruhi).
- $\lambda_k$ : Orde lag spasial untuk lag temporal  $k$  (seberapa jauh pengaruh tetangga).
- $\phi_{kl}$ : Koefisien (parameter) yang menunjukkan pengaruh variabel pada lag temporal  $k$  dan lag spasial  $l$ .

- $W^l$ : Matriks bobot spasial orde  $l$  ( $W^0$  adalah diri sendiri,  $W^1$  tetangga terdekat, dst.).
- $\mathbf{Z}_{t-k}$ : Vektor data variabel dependen di semua lokasi pada waktu  $t - k$ .
- $\mathbf{e}_t$ : Vektor istilah gangguan (error term) pada waktu  $t$ .

Kemudian dilakukan penurunan terhadap semua parameter, selanjutnya dibentuk matriks dengan memilih

$$\hat{\phi} = \begin{bmatrix} \phi_{10} \\ \phi_{11} \\ \phi_{12} \\ \vdots \\ \phi_{p\lambda} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \mathbf{X} = [\mathbf{Z}_{t-1} \quad W\mathbf{Z}_{t-1} \quad W^2\mathbf{Z}_{t-1} \quad \cdots \quad W^\lambda\mathbf{Z}_{t-p}] \quad (2.10)$$

ii) Estimasi Parameter

$$\hat{\phi} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{Z} \quad (2.11)$$

Keterangan:

- $\hat{\phi}$ : Nilai-nilai koefisien (parameter) yang diestimasi oleh model.
- $\mathbf{X}$ : Matriks yang berisi semua data variabel penjelas (independen).
- $\mathbf{X}'$ : Transpose dari matriks  $\mathbf{X}$ .
- $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ : Kebalikan (invers) dari hasil perkalian matriks  $\mathbf{X}'$  dengan  $\mathbf{X}$ .
- $\mathbf{Z}$ : Vektor data variabel yang dijelaskan (dependen).

iii) Uji Signifikansi

Dalam uji signifikansi menggunakan uji t

$$t = \frac{(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3) - (\phi_2 + \phi_3)}{\text{se}(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3)} = \frac{(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3) - 1}{\sqrt{\text{var}(\hat{\phi}_2) + \text{var}(\hat{\phi}_3) + 2 \text{cov}(\hat{\phi}_2, \hat{\phi}_3)}} \quad (2.12)$$

Keterangan:

- $t$ : Nilai statistik uji- $t$  yang dihitung.
- $(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3)$ : Penjumlahan dari estimasi koefisien untuk variabel kedua ( $\hat{\phi}_2$ ) dan ketiga ( $\hat{\phi}_3$ ) dari model regresi.
- $(\phi_2 + \phi_3)$ : Nilai hipotesis dari penjumlahan koefisien yang sebenarnya. Dalam baris kedua rumus, nilai 1 menunjukkan bahwa hipotesis yang diuji adalah apakah  $\phi_2 + \phi_3 = 1$ .

- $se(\hat{\phi}_2 + \hat{\phi}_3)$ : Standard error dari penjumlahan estimasi koefisien, yang mengukur presisi dari estimasi tersebut.
- $var(\hat{\phi}_2)$ : Variansi dari estimasi koefisien  $\hat{\phi}_2$ .
- $var(\hat{\phi}_3)$ : Variansi dari estimasi koefisien  $\hat{\phi}_3$ .
- $cov(\hat{\phi}_2, \hat{\phi}_3)$ : Kovariansi antara estimasi koefisien  $\hat{\phi}_2$  dan  $\hat{\phi}_3$ .

Hipotesa Parameter

$$H_0 : \phi_j = 0 \quad (\text{parameter tidak signifikan}) \quad (2.13)$$

$$H_1 : \phi_j \neq 0 \quad (\text{parameter signifikan}) \quad (2.14)$$

Pengambilan keputusan

- Jika p-value  $< 0.05$  maka tolak  $H_0$
- Jika p-value  $> 0.05$  maka gagal tolak  $H_0$

Melihat hasil uji dari output regresi yang ada python dimana disitu tercantum nilai p-value. Untuk melihat apakah residual model ST-AR masih menunjukkan pola autokorelatif maka dilakukan uji multivariat box pierce. Jika ternyata masih ada maka itu dianggap model belum selesai dan bisa dilanjutkan ke ST-MA

b) Membangun ST-MA (Spatiotemporal Moving Average)

i) Rumus umum

$$\mathbf{Z}_t = \mathbf{e}_t - \sum_{k=1}^q \sum_{l=0}^{\lambda_k} \theta_{kl} W^l \mathbf{e}_{t-k} \quad (2.15)$$

Keterangan:

- $\mathbf{Z}_t$ : Vektor data variabel dependen di semua lokasi pada waktu  $t$ .
- $\mathbf{e}_t$ : Vektor istilah gangguan (error term) pada waktu  $t$ . Ini adalah "kejutan" atau error pada waktu saat ini.
- $\sum_{k=1}^q$ : Penjumlahan untuk orde temporal moving average, di mana  $q$  adalah orde MA temporal maksimum.
- $\sum_{l=0}^{\lambda_k}$ : Penjumlahan untuk orde spasial moving average, di mana  $\lambda_k$  adalah orde spasial maksimum untuk lag temporal  $k$ .
- $\theta_{kl}$ : Koefisien (parameter) moving average spatio-temporal yang akan diestimasi.
- $W^l$ : Matriks bobot spasial orde ke- $l$  ( $W^0$  adalah diri sendiri,  $W^1$  tetangga terdekat, dan seterusnya).

- $\mathbf{e}_{t-k}$ : Vektor istilah gangguan (error term) dari waktu  $t-k$ , yaitu "kejutan" masa lalu dari lokasi itu sendiri dan tetangganya.

Kemudian dilakukan penurunan terhadap semua parameter, selanjutnya dibentuk matriks dengan memilih

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \begin{bmatrix} \theta_{10} \\ \theta_{11} \\ \theta_{12} \\ \vdots \\ \theta_{p\lambda} \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad \hat{\mathbf{e}} = [\mathbf{e}_{t-1} \quad W\mathbf{e}_{t-1} \quad W^2\mathbf{e}_{t-1} \quad \cdots \quad W^\lambda\mathbf{e}_{t-p}] \quad (2.16)$$

ii) Estimasi parameter

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}'\mathbf{e} \quad (2.17)$$

Keterangan:

- $\hat{\boldsymbol{\theta}}$ : Vektor koefisien yang diestimasi (hasil akhir yang ingin kita cari).
- $\mathbf{X}$ : Matriks berisi data variabel penjelas (independen).
- $\mathbf{X}'$ : Transpose dari matriks  $\mathbf{X}$ .
- $(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}$ : Invers dari hasil perkalian  $\mathbf{X}'$  dengan  $\mathbf{X}$ .
- $\mathbf{e}$ : Vektor berisi data variabel yang dijelaskan (dependen).

iii) Uji signifikansi

Dalam uji signifikansi menggunakan uji t

$$t = \frac{(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3) - (\theta_2 + \theta_3)}{\text{se}(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3)} = \frac{(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3) - 1}{\sqrt{\text{var}(\hat{\theta}_2) + \text{var}(\hat{\theta}_3) + 2 \text{cov}(\hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3)}} \quad (2.18)$$

Keterangan:

- $t$ : Nilai statistik uji- $t$  yang dihitung.
- $(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3)$ : Penjumlahan dari estimasi koefisien untuk variabel kedua ( $\hat{\theta}_2$ ) dan ketiga ( $\hat{\theta}_3$ ) dari model regresi.
- $(\theta_2 + \theta_3)$ : Nilai hipotesis dari penjumlahan koefisien yang sebenarnya. Dalam baris kedua rumus, nilai 1 menunjukkan bahwa hipotesis yang diuji adalah apakah  $\theta_2 + \theta_3 = 1$ .
- $\text{se}(\hat{\theta}_2 + \hat{\theta}_3)$ : Standard error dari penjumlahan estimasi koefisien, yang mengukur presisi dari estimasi tersebut.
- $\text{var}(\hat{\theta}_2)$ : Variansi dari estimasi koefisien  $\hat{\theta}_2$ .
- $\text{var}(\hat{\theta}_3)$ : Variansi dari estimasi koefisien  $\hat{\theta}_3$ .

- $\text{cov}(\hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3)$ : Kovariansi antara estimasi koefisien  $\hat{\theta}_2$  dan  $\hat{\theta}_3$ .  
Dalam uji signifikansi menggunakan hipotesis

$$H_0 : \theta_j = 0 \quad (\text{parameter tidak signifikan}) \quad (2.19)$$

$$H_1 : \theta_j \neq 0 \quad (\text{parameter signifikan}) \quad (2.20)$$

Pengambilan keputusan

- Jika p-value  $< 0.05$  maka tolak  $H_0$
- Jika p-value  $> 0.05$  maka gagal tolak  $H_0$

Melihat hasil uji dari output regresi yang ada python dimana disitu tercantum nilai p-value.

#### c) Model STARMA

Model STARMA secara umum dituliskan dalam bentuk matrix sebagai berikut:

$$Z(t) = \sum_{k=1}^p \sum_{l=0}^{L_k} \phi_{kl} W_l Z(t-k) + \sum_{k=1}^q \sum_{l=0}^{L_k} \theta_{kl} W_l \varepsilon(t-k) + \varepsilon(t) \quad (2.21)$$

Keterangan:

- $Z(t)$  : vektor observasi pada waktu ke- $t$  untuk semua lokasi
- $p, q$  : orde *autoregressive* dan *moving average* dalam waktu
- $L_k$  : orde spasial untuk lag waktu ke- $k$  (misalnya tetangga orde ke-1, ke-2, dst.)
- $\phi_{kl}, \theta_{kl}$  : parameter AR dan MA pada lag waktu ke- $k$  dan lag spasial ke- $l$
- $W_l$  : matriks bobot spasial orde ke- $l$
- $\varepsilon(t)$  : vektor galat acak pada waktu ke- $t$ , diasumsikan mengikuti distribusi normal identik dan independen (white noise)

#### 2. Evaluasi Akurasi

Jika anda membagi data, evaluasi kinerja Peramalan model pada data pengujian menggunakan metrik akurasi seperti RMSE

Untuk menangkap hubungan antar lokasi, digunakan spatial weight matrix berukuran  $N \times N$  yang menggambarkan sejauh mana keterkaitan antar lokasi.

## 2.6 Spatial Weight Matrix (SWM)

### 2.6.1 Konsep Dasar Spatial Weight Matrix

Matriks Bobot Spasial (SWM) merupakan matriks persegi berukuran  $N \times N$ , di mana  $N$  menyatakan jumlah total lokasi atau grid yang diamati. Setiap

elemen  $w_{ij}$  dalam matriks ini merepresentasikan besarnya pengaruh lokasi  $j$  terhadap lokasi  $i$ , dengan ketentuan sebagai berikut:

- $w_{ii} = 0$ , yang berarti suatu lokasi tidak memberikan pengaruh terhadap dirinya sendiri.
- Jika terdapat keterkaitan spasial antara lokasi  $j$  dan  $i$ , maka  $w_{ij} > 0$ ; jika tidak ada hubungan, maka  $w_{ij} = 0$ .

### 2.6.2 Bentuk Umum Matriks SWM

Secara umum, matriks bobot spasial dapat dituliskan dalam bentuk:

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 0 & w_{12} & w_{13} & \cdots & w_{1N} \\ w_{21} & 0 & w_{23} & \cdots & w_{2N} \\ w_{31} & w_{32} & 0 & \cdots & w_{3N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{N1} & w_{N2} & w_{N3} & \cdots & 0 \end{bmatrix} \quad (2.22)$$

Dengan:

- $w_{ij}$  menyatakan kekuatan hubungan dari lokasi  $j$  ke lokasi  $i$
- Setiap baris menyatakan distribusi pengaruh dari semua lokasi terhadap satu lokasi tertentu.

### 2.6.3 Jenis-jenis Pembobotan

Berikut adalah beberapa metode populer dalam membentuk nilai  $w_{ij}$  dalam SWM:

- a) Bobot Lokasi Seragam (*Uniform Weight*) Mengasumsikan bahwa semua lokasi tetangga memiliki pengaruh yang sama besar terhadap lokasi target:

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{1}{n}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (2.23)$$

dengan  $n = N - 1$  sebagai jumlah lokasi tetangga. Bobot ini sederhana dan tidak memperhitungkan jarak geografis, namun tetap dapat menghasilkan model yang baik dalam kondisi tertentu.

- b) Bobot Inverse Jarak (*Inverse Distance Weight*) Menggunakan jarak antar lokasi sebagai dasar pembobotan. Lokasi yang lebih dekat memiliki bobot lebih besar:

$$d_{ij} = d_{ji} = ([x_i(u_i) - x_j(u_j)]^2 + [x_i(v_i) - x_j(v_j)]^2)^{1/2} \quad (2.24)$$



$$w_{ij} = w_{ji} = \frac{1}{d_{ij}} = \frac{1}{d_{ji}} \quad (2.25)$$

dan normalisasi bobot lokasi invers jarak dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$w_{ij} = \begin{cases} \frac{w_{ij}}{\sum_{j=1}^m w_{ij}}, & i \neq j \\ 0, & i = j \end{cases} \quad (2.26)$$

Keterangan:  $x_i$  = lambang lokasi ke- $i$  dengan  $i = 1, 2, \dots, N$   $u$  = koordinat lintang lokasi  $v$  = koordinat bujur lokasi  $d_{ij}$  = jarak antar lokasi ke- $i$  terhadap lokasi lainnya (lokasi ke- $j$ ).

- c) Bobot Korelasi Silang (*Cross-Correlation Weight*) Didasarkan pada kemiripan pola waktu antar lokasi, dihitung dari korelasi silang pada lag tertentu:

$$\rho_{ij}(k) = \frac{\gamma_{ij}(k)}{\sigma_i \sigma_j} \quad (2.27)$$

Keterangan:

- $\rho_{ij}(k)$  : korelasi silang antara lokasi ke- $i$  dan ke- $j$  pada lag waktu ke- $k$
- $\gamma_{ij}(k)$  : kovarians silang antara lokasi ke- $i$  dan ke- $j$  pada lag waktu ke- $k$
- $\sigma_i, \sigma_j$  : simpangan baku dari lokasi ke- $i$  dan ke- $j$

di mana  $\gamma_{ij}(k)$  merupakan kovarians silang antara pengamatan pada lokasi ke- $i$  dan ke- $j$  pada lag waktu  $k$ .  $\sigma_i$  dan  $\sigma_j$  merupakan simpangan baku dari pengamatan lokasi ke- $i$  dan ke- $j$

$$r_{ij}(k) = \frac{\sum_{t=k+1}^n [z_i(t) - \bar{z}_i][z_j(t-k) - \bar{z}_j]}{(\sum_{t=1}^n [z_i(t) - \bar{z}_i]^2) (\sum_{t=1}^n [z_j(t) - \bar{z}_j]^2)} \quad (2.28)$$

Keterangan:

- $r_{ij}(k)$  : penduga korelasi silang antara lokasi ke- $i$  dan ke- $j$  pada lag waktu ke- $k$
- $z_i(t)$  : nilai pengamatan pada lokasi ke- $i$  di waktu  $t$
- $\bar{z}_i$  : rata-rata nilai pengamatan pada lokasi ke- $i$
- $n$  : banyaknya data

Untuk penentuan pembobot korelasi silang antar lokasi diperoleh sebagai berikut:

$$w_{ij} = \frac{r_{ij}(k)}{\sum_{j \neq i} |r_{ij}(k)|} \quad (2.29)$$

Keterangan:

- $w_{ij}$  : bobot korelasi silang dari lokasi ke- $j$  terhadap lokasi ke- $i$
- $r_{ij}(k)$  : penduga korelasi silang seperti dijelaskan di atas

dan memenuhi  $\sum_{i \neq j} |w_{ij}| = 1$ . Pembobot korelasi silang ini tidak memerlukan aturan tertentu, seperti ketergantungan jarak dari lokasi.

#### 2.6.4 Peran SWM dalam Model STARMA

Dalam model STARMA, SWM digunakan untuk mengintegrasikan pengaruh spasial antar lokasi ke dalam proses prediksi curah hujan. Setiap variasi bobot akan dimasukkan ke dalam model, lalu hasil peramalannya dibandingkan untuk menentukan pembobotan mana yang paling efektif dalam merepresentasikan hubungan spasio-temporal.


## Bab III

### Metodologi Penelitian

Pada bab ini, dijelaskan tentang tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah dikemukakan pada rumusan masalah. Ditunjukkan pula jadwal penelitian untuk masing-masing tahapan penelitian tersebut.

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1.




Gambar 3.1: Diagram Alur Metodologi Penelitian

## 3.2 Sumber Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder secara daring tanpa melakukan pengambilan data di lapangan. Seluruh proses analisis dan pengolahan data dilakuakn secara komputasi di lingkungan pengolahan data statistik.

Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan bulanan berbasis satelit yang diperoleh dari NASA (*National Aeronnautics and Space Administration*) melalui platform *POWER Data Access Viewer*. Data ini mencakup informasi spasial (koordinat grid wilayah) dan temporal (periode waktu pengamatan) yang diperlukan dalam pemodelan spasio temporal menggunakan STARMA.

Selain itu, informasi koordinat geografis yang merepresentasikan lokasi grid atau titik observasi juga digunakan untuk membangun *spatial weight matrix* yang merepresentasikam kedekatan spasial antar wilayah. Data pendukung ini diambil langsung dari metadata bawaan dataset NASA yang digunakan. Berikut merupakan gambar sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 3.2: Data NASA Wilayah Surabaya

### 3.2.1 Data Sekunder

Tabel 3.1: Data Curah Hujan Bulanan Berdasarkan Wilayah

| Wilayah | Latitude | Longitude | Date       | Precipitation |
|---------|----------|-----------|------------|---------------|
| Utara   | -7.2     | 112.73    | 1/31/2015  | 13.89         |
| Utara   | -7.2     | 112.73    | 2/28/2015  | 11.93         |
| Utara   | -7.2     | 112.73    | 3/31/2015  | 9.38          |
| ⋮       | ⋮        | ⋮         | ⋮          | ⋮             |
| Utara   | -7.2     | 112.73    | 10/31/2024 | 1.12          |

| Wilayah | Latitude | Longitude | Date       | Precipitation |
|---------|----------|-----------|------------|---------------|
| Utara   | -7.2     | 112.73    | 11/30/2024 | 6.53          |
| Utara   | -7.2     | 112.73    | 12/31/2024 | 13.60         |
| Barat   | -7.24    | 112.61    | 1/31/2015  | 13.92         |
| Barat   | -7.24    | 112.61    | 2/28/2015  | 11.87         |
| Barat   | -7.24    | 112.61    | 3/31/2015  | 9.44          |
| ⋮       | ⋮        | ⋮         | ⋮          | ⋮             |
| Barat   | -7.24    | 112.61    | 10/31/2024 | 1.46          |
| Barat   | -7.24    | 112.61    | 11/30/2024 | 6.29          |
| Barat   | -7.24    | 112.61    | 12/31/2024 | 13.62         |
| Timur   | -7.31    | 112.84    | 1/31/2015  | 12.24         |
| Timur   | -7.31    | 112.84    | 2/28/2015  | 10.29         |
| Timur   | -7.31    | 112.84    | 3/31/2015  | 8.84          |
| ⋮       | ⋮        | ⋮         | ⋮          | ⋮             |
| Timur   | -7.31    | 112.84    | 10/31/2024 | 1.22          |
| Timur   | -7.31    | 112.84    | 11/30/2024 | 5.63          |
| Timur   | -7.31    | 112.84    | 12/31/2024 | 12.31         |
| Selatan | -7.35    | 112.73    | 1/31/2015  | 14.30         |
| Selatan | -7.35    | 112.73    | 2/28/2015  | 12.15         |
| Selatan | -7.35    | 112.73    | 3/31/2015  | 11.21         |
| ⋮       | ⋮        | ⋮         | ⋮          | ⋮             |
| Selatan | -7.35    | 112.73    | 10/31/2024 | 1.24          |
| Selatan | -7.35    | 112.73    | 11/30/2024 | 6.63          |
| Selatan | -7.35    | 112.73    | 12/31/2024 | 13.51         |
| Tengah  | -7.26    | 112.74    | 1/31/2015  | 14.25         |
| Tengah  | -7.26    | 112.74    | 2/28/2015  | 12.17         |
| Tengah  | -7.26    | 112.74    | 3/31/2015  | 11.19         |
| ⋮       | ⋮        | ⋮         | ⋮          | ⋮             |
| Tengah  | -7.26    | 112.74    | 10/31/2024 | 0.83          |
| Tengah  | -7.26    | 112.74    | 11/30/2024 | 6.66          |
| Tengah  | -7.26    | 112.74    | 12/31/2024 | 13.59         |

### 3.3 Pra-pemrosesan Data

Sebelum dilakukan pemodelan, data yang digunakan harus melalui tahapan pra-pemrosesan agar bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis secara spasio-temporal. Proses ini dimulai dengan pembersihan data dari nilai-nilai ekstrem atau tidak logis akibat gangguan akuisisi satelit. Jika terdapat nilai hilang, maka akan dilakukan *handling missing value*, atau penghapusan jika jumlahnya signifikan. Selanjutnya, dilakukan perhitungan statistika deskriptif.

### 3.4 Analisis Eksploratif Pola Spasio-Temporal Curah Hujan

Sebelum membentuk matriks pembobotan, dilakukan analisis eksploratif terhadap pola curah hujan di wilayah Surabaya. Analisis ini mencakup visualisasi boxplot setiap wilayah guna mengidentifikasi distribusi curah hujan bulanan secara spasial, visualisasi seasonal decompose untuk melihat tren, musiman dan residual dan melakukan pengecekan korelasi antar wilayah. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dinamika dan variabilitas intensitas hujan serta mengidentifikasi grid yang memiliki pola hujan serupa.

### 3.5 Pengecekan Kestasioneran Data

Data yang ada di cek stasioneritasnya menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Jika data tersebut tidak stasioner maka akan dilakukan differencing, namun apabila data nya sudah stasioner maka akan dilakukan perhitungannya selanjutnya.

### 3.6 Pembentukan *Spatial Weight Matrix*

Berdasarkan matriks *similarity* yang telah diperoleh, kemudian disusun *Spatial Weight Matrix* (SWM) seperti pada matriks 2.22 sebagai komponen penting dalam model STARMA. SWM menunjukkan kekuatan pengaruh antar grid, dan tidak hanya mempertimbangkan kedekatan geografis, tetapi juga kemiripan spasio-temporal. Dalam penelitian ini, dibangun tiga variasi bobot sebagai pembanding, yaitu bobot seragam yang memberikan bobot sama untuk seluruh tetangga yang dapat dilihat pada persamaan 2.23, bobot invers jarak yang menggunakan jarak antar lokasi sebagai dasar pembobotan yang dapat dilihat pada persamaan 2.25, bobot berdasarkan korelasi silang antar grid yang dapat dilihat pada persamaan 2.27. Masing-masing variasi digunakan untuk mengukur efektivitas pembobotan spasial dalam meningkatkan performa prediksi model.

### 3.7 Pembangunan Model ARIMA

Setelah data stasioner, dilakukan identifikasi nilai parameter  $p$  dan  $q$  dengan mengamati pola ACF (untuk  $q$ ) 2.4 dan PACF (untuk  $p$ ) 2.3, atau dapat pula menggunakan metode otomatis seperti *auto\_arima*. Model kemudian dibangun dan parameternya diestimasi menggunakan **Maximum Likelihood Estimation (MLE)**. Setelah model dibentuk, dilakukan **analisis residu** untuk memastikan bahwa kesalahan model bersifat acak (*white noise*). Hal ini dapat diperiksa melalui plot ACF/PACF dari residu serta uji *Ljung-Box* 2.8. Diagnostik ini penting untuk memastikan bahwa model tidak melewatkan pola yang masih ada dalam data. Bila tersedia data uji, model dievaluasi menggunakan metrik prediksi seperti **RMSE**.

### 3.8 Pembangunan Model STARMA

Model STARMA digunakan untuk menganalisis data yang memiliki ketergantungan spasial dan temporal secara simulta. Identifikasi orde model melibatkan empat parameter utama:  $p$  dan  $q$  (lag temporal AR dan MA) serta  $\lambda$  dan  $\mu$  (lag spasial AR dan MA). Orde ini ditentukan menggunakan fungsi STACF 2.15 dan STPACF 2.9, yang merupakan perluasan dari ACF dan PACF dalam konteks spasial-temporal. Setelah orde ditentukan, parameter model diestimasi menggunakan **Maximum Likelihood Estimation (MLE)**. Diagnostik dilakukan melalui analisis residu untuk memastikan tidak ada autokorelasi spasial-temporal yang tersisa, serta evaluasi akurasi dilakukan dengan metrik seperti RMSE

### 3.9 Evaluasi

Model-model yang dibangun kemudian divalidasi dengan menggunakan data testing untuk mengukur performanya. Validasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi dengan data aktual menggunakan metrik evaluasi *Root Mean Square Error* (RMSE) pada persamaan 2.1. Selain itu, dilakukan perbandingan performa antara model STARMA dengan dan tanpa pembobotan spasio-temporal untuk mengetahui sejauh mana pembobotan tersebut meningkatkan akurasi model.

### 3.10 Harapan Hasil Peramalan

Hasil akhir dari proses pemodelan STARMA divisualisasikan dalam bentuk grafik yang membandingkan nilai prediksi dengan data aktual curah hujan. Visualisasi dilakukan pada lima titik observasi yang mewakili bagian-bagian wilayah Surabaya, yaitu Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Hasil prediksi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu merepresentasikan dinamika spasio-temporal curah hujan di Surabaya secara akurat.

## Bab IV

### Hasil dan Pembahasan

#### 4.1 Eksplorasi Data

##### 4.1.1 Statistika Deskriptif

Sebelum melakukan proses pemodelan dengan metode ARIMA dan STARIMA, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan eksplorasi data yaitu dengan statistika deskriptif. Tujuannya untuk memahami karakteristik dasar data seperti tren, musiman, serta variabilitas yang terjadi. Melalui analisa deskriptif, diperoleh gambaran umum mengenai perilaku data yang akan dimodelkan.

Tabel 4.1: Statistika Deskriptif

| Statistik | Barat       | Selatan     | Tengah      | Timur       | Utara       |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Count     | 3653.000000 | 3653.000000 | 3653.000000 | 3653.000000 | 3653.000000 |
| Mean      | 5.843041    | 5.920063    | 5.919724    | 5.206096    | 5.842067    |
| Min       | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000    | 0.000000    |
| 25%       | 0.090000    | 0.000000    | 0.020000    | 0.000000    | 0.120000    |
| 50%       | 1.650000    | 0.780000    | 1.370000    | 0.600000    | 2.010000    |
| 75%       | 7.520000    | 6.560000    | 7.630000    | 6.400000    | 8.030000    |
| Max       | 308.380000  | 366.490000  | 318.680000  | 195.030000  | 249.460000  |
| Std       | 11.013619   | 13.287137   | 11.868456   | 10.058238   | 10.116447   |

Tabel 4.1 menyajikan hasil analisis statistika deskriptif curah hujan pada lima wilayah Kota Surabaya, yaitu Barat, Selatan, Tengah, Timur, dan Utara. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah data pengamatan pada masing-masing wilayah adalah 120 observasi, yang menunjukkan bahwa seluruh wilayah memiliki panjang deret waktu yang sama sepanjang periode penelitian.

Secara umum, nilai rata-rata (mean) curah hujan di kelima wilayah berkisar antara 5,20 hingga 5,92 mm, yang menunjukkan bahwa intensitas curah hujan harian di Kota Surabaya relatif seragam antar wilayah. Wilayah Tengah (5,92 mm) memiliki rata-rata curah hujan tertinggi, diikuti oleh Selatan (5,92 mm) dan Barat (5,84 mm), sedangkan wilayah Timur (5,21 mm) mencatat rata-rata



terendah.

Nilai minimum pada seluruh wilayah adalah 0 mm, yang menandakan adanya hari-hari tanpa hujan selama periode pengamatan. Sementara itu, nilai maksimum menunjukkan variasi yang cukup tinggi, di mana curah hujan ekstrem tertinggi tercatat di wilayah Selatan (366,49 mm), diikuti oleh Tengah (318,68 mm) dan Barat (308,38 mm). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah bagian selatan Surabaya cenderung mengalami intensitas hujan ekstrem lebih besar dibandingkan wilayah lainnya.


Berdasarkan nilai median (50%), sebagian besar wilayah memiliki nilai tengah curah hujan antara 0,6 hingga 2,0 mm, yang berarti sebagian besar hari dalam periode pengamatan memiliki curah hujan rendah hingga sedang. Nilai kuartil atas (75%) menunjukkan bahwa 75% data memiliki curah hujan di bawah 7–8 mm, sedangkan sisanya mewakili kejadian hujan intensitas tinggi.

Nilai simpangan baku (standar deviasi) berkisar antara 10,05 hingga 13,28, yang mengindikasikan adanya variasi curah hujan yang cukup besar antar waktu. Wilayah Selatan memiliki standar deviasi tertinggi (13,29), yang menandakan fluktuasi curah hujan paling tinggi, sedangkan wilayah Timur menunjukkan variasi paling rendah (10,06).

Secara keseluruhan, analisis deskriptif ini menunjukkan bahwa curah hujan di lima wilayah Kota Surabaya memiliki pola sebaran yang relatif serupa, namun dengan tingkat variabilitas dan intensitas ekstrem yang berbeda antar wilayah. Temuan ini mendukung perlunya analisis spasio-temporal lanjutan menggunakan model STARIMA untuk menangkap hubungan dinamis antar wilayah dan antar waktu.

#### 4.1.2 Pola Curah Hujan Kelima Wilayah di Surabaya


Data yang digunakan adalah data curah hujan hasil dari pengamatan satelit NASA POWER pada lima titik wilayah di Kota Surabaya yaitu Utara, Selatan, Timur, Tengah dan Barat selama periode 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2024. Data curah hujan nya memiliki satuan mm/hari dan kemudian dilakukan agregasi menjadi rata-rata bulanan agar dapat menggambarkan tren musiman jangka panjang.



Gambar 4.1: Pola Curah Hujan Wilayah Barat


Curah hujan bulanan di Wilayah Barat selama periode 2015 - 2024 mem-

perlihatkan pola musiman yang sangat jelas, dengan peningkatan intensitas hujan yang konsisten terjadi pada bulan Desember hingga Maret serta kondisi curah hujan rendah hingga mendekati nol pada bulan Juni hingga September. Puncak hujan tahunan umumnya berada pada kisaran 12–18 mm/hari, disertai beberapa kejadian ekstrem yang mencapai lebih dari 20 mm/hari pada tahun-tahun seperti 2017, 2020, 2022, dan 2024. Dengan struktur musiman yang kuat dan variabilitas yang cukup signifikan, deret waktu pada wilayah ini sangat mendukung penerapan model STARIMA dalam mempelajari hubungan spasial-temporal serta memprediksi curah hujan dengan lebih akurat.



Gambar 4.2: Pola Curah Hujan Wilayah Selatan


Curah hujan bulanan di Wilayah Selatan selama periode 2015 - 2024 menunjukkan pola musiman yang sangat konsisten, ditandai dengan peningkatan intensitas hujan pada bulan Desember hingga Maret dan kondisi hampir tanpa hujan pada periode Juni hingga September. Puncak hujan tahunan umumnya berada pada kisaran 12–18 mm/hari, dengan beberapa kejadian ekstrem yang melebihi 20 mm/hari terutama pada awal 2016, 2021, dan 2024. Variabilitas intra-tahunan yang cukup tinggi serta fluktuasi intensitas yang tajam menggambarkan dinamika atmosfer yang aktif di wilayah ini, sekaligus menegaskan adanya komponen musiman yang kuat dan berulang. Pola temporal yang terstruktur ini mendukung penerapan model deret waktu spasial-temporal seperti STARIMA untuk memodelkan dan memprediksi curah hujan secara lebih akurat.



Gambar 4.3: Pola Curah Hujan Wilayah Tengah


Curah hujan bulanan di Wilayah Tengah selama periode 2015 - 2024 menunjukkan pola musiman yang sangat jelas, dengan intensitas hujan meningkat secara konsisten pada Desember hingga Maret dan menurun drastis pada Juni

hingga September. Variabilitas intra-tahunan tampak cukup tinggi, ditandai dengan fluktuasi tajam antara kondisi tanpa hujan hingga puncak 10–15 mm/hari, serta beberapa kejadian ekstrem seperti pada awal 2024 yang mencapai lebih dari 25 mm/hari. Pola yang stabil dan berulang ini mencerminkan dinamika monsun yang kuat serta pengaruh faktor atmosfer regional yang membentuk variasi hujan tahunan. Struktur temporal yang konsisten tersebut mendukung penerapan model STARIMA dalam memodelkan dan memprediksi curah hujan berbasis hubungan spasial-temporal antar wilayah di Surabaya.



Gambar 4.4: Pola Curah Hujan Wilayah Timur

Curah hujan bulanan di Wilayah Timur selama periode 2015 - 2024 memperlihatkan pola musiman yang konsisten, dengan intensitas hujan meningkat pada bulan Desember hingga Maret dan menurun drastis mendekati nol pada periode Juni hingga September. Puncak hujan tahunan berada pada kisaran 10–15 mm/hari, dengan beberapa kejadian ekstrem yang melampaui nilai tersebut, seperti pada awal tahun 2021, 2022, dan 2024. Fluktuasi intra-tahunan yang tajam dan variasi antar tahun menunjukkan dinamika atmosfer yang aktif di wilayah ini, dipengaruhi oleh siklus monsun dan fenomena cuaca regional. Pola temporal yang berulang dan stabil ini menunjukkan bahwa wilayah Timur memiliki struktur deret waktu yang kuat untuk dimodelkan melalui pendekatan STARIMA dalam analisis spasial-temporal curah hujan.




Gambar 4.5: Pola Curah Hujan Wilayah Utara

Curah hujan bulanan di Wilayah Utara selama periode 2015 - 2024 menunjukkan pola musiman yang sangat konsisten, dengan peningkatan intensitas pada bulan Desember hingga Maret dan curah hujan yang hampir nol pada periode Juni hingga September. Puncak hujan tahunan berada pada kisaran 10–15 mm/hari, disertai beberapa kejadian ekstrem yang melebihi 20

mm/hari, terutama pada awal tahun 2020, 2022, dan 2024. Fluktuasi yang tajam antar musim menggambarkan dinamika atmosfer regional yang aktif dan dipengaruhi oleh siklus monsun serta fenomena cuaca skala besar seperti MJO dan ENSO. Pola temporal yang stabil dan berulang ini menunjukkan bahwa Wilayah Utara memiliki struktur deret waktu yang kuat dan cocok dimodelkan menggunakan pendekatan STARIMA untuk analisis dan peramalan spasial-temporal curah hujan.

### 4.1.3 Karakteristik dengan BoxPlot

Sebelum masuk ke analisis lebih lanjut, diperlukan pemahaman mengenai pola dasar distribusi curah hujan di setiap wilayah. Oleh karena itu, boxplot digunakan untuk menampilkan gambaran awal mengenai sebaran dan karakteristik data curah hujan bulanan.




Gambar 4.6: Boxplot Kelima Wilayah di Surabaya

Gambar 4.6 menampilkan boxplot distribusi curah hujan bulanan untuk lima wilayah di Kota Surabaya, yaitu Timur, Barat, Selatan, Utara, dan Tengah. Secara umum, kelima wilayah menunjukkan pola distribusi yang relatif serupa dengan median curah hujan berada di rata-rata 5 mm/hari, menandakan bahwa sebagian besar nilai curah hujan bulanan terkonsentrasi pada tingkat menengah. Rentang interkuartil (IQR) di seluruh wilayah menunjukkan variasi yang moderat, menggambarkan tingkat sebaran data yang cukup stabil antarwilayah. Meskipun demikian, terlihat adanya beberapa outlier pada Wilayah Barat, Selatan, dan Tengah dengan nilai di atas 25 mm/hari yang

menandakan adanya kejadian hujan ekstrem pada periode tertentu. Sementara itu, nilai minimum di setiap wilayah mendekati nol, menunjukkan periode kering yang umum terjadi selama musim kemarau. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antarwilayah dalam hal median maupun rentang variasi, yang mengindikasikan bahwa pola distribusi curah hujan bulanan di Surabaya relatif homogen secara spasial, meskipun dengan sedikit perbedaan amplitudo akibat pengaruh lokal seperti topografi dan kedekatan terhadap kawasan pesisir.

#### 4.1.4 Analisis Temporal Curah Hujan

Analisis temporal dilakukan untuk mengidentifikasi pola perubahan curah hujan dari waktu ke waktu. Berdasarkan grafik deret waktu bulanan yang dibuat untuk masing – masing wilayah terlihat bahwa pola curah hujan Surabaya cenderung musiman dan berulang setiap tahun.



Gambar 4.7: Seasonal Decompose Semua Wilayah

Berdasarkan hasil dekomposisi pada gambar 4.7 tersebut dapat dijelaskan bahwa:

a. Komponen Tren:

Pola tren menunjukkan adanya fluktuasi jangka panjang yang cenderung meningkat secara perlahan hingga pertengahan periode pengamatan, kemudian relatif stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa selama 2015-2024, curah hujan di seluruh wilayah Surabaya mengalami kecenderungan peningkatan moderat yang mungkin dipengaruhi oleh faktor klimatologis regional.

b. Komponen Musiman:

Pola musiman menunjukkan fluktuasi yang berulang secara konsisten setiap tahun, dengan puncak curah hujan umumnya terjadi pada Desember

– Februari dan minimum pada Juli – September. Pola ini menggambarkan dengan jelas siklus tahunan curah hujan di semua wilayah Surabaya yang mengikuti pola iklim monsun tropis.

c. **Komponen Residual:**

Komponen residual menunjukkan penyebaran acak disekitar nol yang menandakan bahwa sebagian besar variasi curah hujan telah berhasil dijelaskan oleh komponen tren dan musiman. Tidak terlihat adanya pola sistematis yang menonjol pada residu, sehingga model dekomposisi dianggap cukup baik dalam memisahkan variasi utama pada data

#### 4.1.5 Analisis Korelasi Spatio Temporal

Analisis korelasi spasio-temporal dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat keterhubungan pola curah hujan antar wilayah Surabaya. Nilai korelasi yang ditampilkan pada tabel berikut memberikan gambaran mengenai seberapa kuat kesamaan pola hujan secara ruang dan waktu.

Tabel 4.2: Tabel Korelasi Setiap Wilayah

| Wilayah | Barat    | Selatan  | Tengah   | Timur    | Utara    |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Barat   | 1.000000 | 0.994376 | 0.993769 | 0.983211 | 0.999738 |
| Selatan | 0.994376 | 1.000000 | 0.999631 | 0.975665 | 0.994562 |
| Tengah  | 0.993769 | 0.999631 | 1.000000 | 0.975762 | 0.994531 |
| Timur   | 0.983211 | 0.975665 | 0.975762 | 1.000000 | 0.983363 |
| Utara   | 0.999738 | 0.994562 | 0.994531 | 0.983363 | 1.000000 |

Tabel 4.2 merupakan tabel yang menunjukkan bahwa kelima wilayah di Surabaya ini memiliki nilai korelasi yang besar antara 0.975 hingga 0.999. Korelasi ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat artinya peningkatan curah hujan di satu wilayah cenderung diikuti oleh peningkatan di wilayah lain pada waktu yang sama. Hal ini menandakan bahwa curah hujan di Surabaya bersifat homogen secara spasial karena semua wilayah mengalami kondisi meteorologis yang hampir sama.

## 4.2 ARIMA

### 4.2.1 Stasioner Data

Setelah dilakukan analisis dekomposisi untuk mengidentifikasi pola tren dan musiman, langkah selanjutnya adalah menguji tingkat kestasioneran data pada masing - masing wilayah. Uji stasioneritas dilakukan untuk memastikan bahwa deret waktu curah hujan telah memenuhi asumsi dasar analisis time series, yaitu nilai rata - rata dan varians yang relatif konstan terhadap waktu. Data yang tidak stasioner dapat menyebabkan estimasi parameter model

menjadi bias dan tidak stabil, sehingga perlu dilakukan transformasi atau differencing sebelum proses pemodelan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kestasioneran data curah hujan di kelima wilayah Kota Surabaya guna menentukan apakah proses differencing diperlukan untuk menjadikan data stasioner secara statistik.

- a. Kestasioneran terhadap varians Kesationeran data curah hujan terhadap varians dapat dilihat dari transformasi lambda ( $\lambda$ ) yang dihasilkan dari plot BoxCox. Jika nilai ( $\lambda$ ) mendekati satu maka dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner dan sebaliknya. Untuk membuat plot BoxCox data yang digunakan harus bernilai positif.

Tabel 4.3: Nilai Lambda Semua Wilayah

| Wilayah | Nilai Lambda |
|---------|--------------|
| Barat   | 0.3779       |
| Selatan | 0.3476       |
| Tengah  | 0.3461       |
| Timur   | 0.3596       |
| Utara   | 0.3783       |

Berdasarkan tabel 4.3 nilai  $\lambda$  untuk seluruh wilayah berada pada rentang 0.34 - 0.38, yang menunjukkan bahwa data belum stasioner terhadap varians. Karena itu, diperlukan transformasi Box-Cox agar varians data lebih stabil dan sesuai dengan asumsi pemodelan time series. Transformasi ini membantu meningkatkan kinerja model dengan mengurangi bias akibat varians yang tidak stabil. Setelah transformasi diterapkan, stasioneritas mean diperiksa kembali melalui uji ADF dan analisis ACF/PACF. Jika pola tren atau musiman masih terlihat, maka perlu dilakukan differencing agar data benar - benar stasioner sebelum proses pemodelan.

- b. Kestasioneran terhadap rata - rata

Setelah data stasioner terhadap varians, selanjutnya dilakukan pengujian kestasioneran terhadap rata - rata. Pengujian ini dapat dilakukan dengan Menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test*, berikut adalah hipotesisnya:

$H_0$ :  $\phi \geq 0$  (data tidak stasioner terhadap rata-rata)

$H_1$ :  $\phi < 0$  (data stasioner terhadap rata-rata)

Hasil pengujian *Augmented Dickey-Fuller Unit Root* untuk masing-masing lokasi terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4: Hasil Uji ADF


| Wilayah | t-statistik | Nilai-p  |
|---------|-------------|----------|
| Barat   | -3.287547   | 0.015444 |
| Selatan | -3.280075   | 0.015793 |
| Tengah  | -3.254672   | 0.017030 |
| Timur   | -3.347334   | 0.012891 |
| Utara   | -3.270636   | 0.016243 |

Tabel 4.4 itu menunjukkan bahwa data curah hujan kelima wilayah Surabaya sudah stasioner sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat bahwa semua wilayah memiliki nilai p-value  $< 0.05$  yang artinya sudah memenuhi syarat untuk melakukan pemodelan ARIMA.

c. Plot ACF dan PACF


Setelah dilakukan transformasi Box-Cox untuk menstabilkan varians dan proses differencing orde pertama untuk menghilangkan tren serta menjadikan data stasioner dalam mean, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis fungsi autokorelasi (ACF) dan fungsi autokorelasi parsial (PACF). Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur keterkaitan temporal antar-observasi dalam deret waktu dan menentukan orde awal model ARIMA, yaitu nilai  $p$  (autoregressive) dan  $q$  (moving average). Plot ACF digunakan untuk mengamati pola korelasi antar lag waktu guna memperkirakan komponen MA, sedangkan plot PACF digunakan untuk mendeteksi lag signifikan yang mewakili komponen AR. Melalui analisis visual terhadap kedua plot tersebut, dapat diperoleh indikasi awal mengenai bentuk model ARIMA yang paling sesuai dengan karakteristik data curah hujan setelah proses transformasi dan differencing dilakukan. Berikut merupakan hasil plot ACF dan PACF:





Gambar 4.8: Plot ACF dan PACF Wilayah Barat (Sebelum)

Berdasarkan Gambar 4.8 pada plot ACF sebelum transformasi pola autokorelasi menunjukkan penurunan yang lambat dan masih signifikan hingga lag yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa data belum stasioner secara temporal karena masih terdapat pengaruh tren dan musiman yang kuat. Nilai autokorelasi positif yang menurun secara perlahan pada ACF memperlihatkan adanya long-term persistence, sedangkan pola PACF yang juga menunjukkan beberapa lag signifikan mengonfirmasi keberadaan komponen autoregresif (AR) dan musiman yang belum tereliminasi sehingga perlu dilakukan differencing dan juga transformasi BoxCox.



Gambar 4.9: Plot ACF dan PACF Wilayah Barat (Sesudah)

Berdasarkan Gambar 4.9 setelah dilakukan transformasi BoxCox dan differencing musiman, pola ACF dan PACF mengalami perubahan signifikan. ACF menunjukkan penurunan cepat di sekitar lag ke-1 hingga lag ke-2 dan kemudian berfluktuasi di sekitar nol, sedangkan PACF menampilkan cut-off yang jelas setelah lag pertama. Kondisi ini menandakan bahwa proses transformasi dan differencing berhasil menghilangkan tren dan menjadikan data stasioner dalam mean dan varians. Untuk plot ACF dan PACF lainnya dapat dilihat di Lampiran 4

d. Transformasi vs Tanpa Transformasi

Untuk memastikan bahwa proses transformasi BoxCox memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas data dan akurasi prediksi, dilakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja model SARIMA pada lima wilayah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan nilai Root Mean Squared Error (RMSE) antara model yang dibangun tanpa transformasi BoxCox dan model yang menerapkan transformasi tersebut. Perbandingan kuantitatif atas seluruh konfigurasi model disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 4.5: Perbandingan RMSE Tanpa Transformasi dan Dengan Transformasi Box-Cox

| Wilayah | Model                         | Tanpa Transformasi | Transformasi |
|---------|-------------------------------|--------------------|--------------|
| Barat   | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | 3.662              | 5.082        |
| Selatan | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | 4.788              | 4.680        |
| Tengah  | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | 4.769              | 4.434        |
| Timur   | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | 1.835              | 4.643        |
| Utara   | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | 3.703              | 5.016        |

Berdasarkan Tabel 4.5 hasil perbandingan model SARIMA dengan dan tanpa transformasi pada lima wilayah pengamatan, dapat disimpulkan bahwa penerapan transformasi tidak selalu memberikan peningkatan akurasi pemodelan. Pada wilayah Barat, Timur, dan Utara, model tanpa transformasi justru menghasilkan nilai error yang lebih rendah, menunjukkan bahwa varians data pada wilayah tersebut sudah relatif stabil sehingga transformasi tidak diperlukan. Pada wilayah Selatan, perbedaan performa antara kedua pendekatan sangat kecil sehingga pengaruh transformasi dapat dikatakan minimal. Sementara itu, wilayah Tengah menjadi satu-satunya wilayah di mana transformasi memberikan peningkatan akurasi yang lebih jelas, mengindikasikan adanya variabilitas data yang lebih tinggi sehingga stabilisasi varians melalui transformasi menjadi bermanfaat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa efektif-

vitasi transformasi sangat bergantung pada karakteristik statistik masing-masing wilayah, sehingga penerapannya tidak dapat digeneralisasi dan perlu disesuaikan dengan kondisi data.

#### 4.2.2 Estimasi Parameter

Parameter yang diestimasi dari model yang telah diidentifikasi menggunakan metode Maximum Likelihood, disajikan dalam table dibawah ini, bersama dengan standar error, nilai  $t$ , dan nilai  $p$  masing - masing:

Tabel 4.6: Estimasi Parameter ARIMA

| Wilayah | Model                         | Statistik | AR Parameter |      |          | MA Parameter |      |          |
|---------|-------------------------------|-----------|--------------|------|----------|--------------|------|----------|
|         |                               |           | Non Seasonal |      | Seasonal | Non Seasonal |      | Seasonal |
|         |                               |           | AR 1         | AR 2 | AR       | MA 1         | MA 2 | MA       |
| Barat   | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4326       |      |          |              |      |          |
|         |                               | SE        | 0.089        |      |          |              |      |          |
|         |                               | t-value   | 4.880        |      |          |              |      |          |
|         |                               | p-value   | 0.000        |      |          |              |      |          |
| Selatan | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3739       |      |          |              |      |          |
|         |                               | SE        | 0.092        |      |          |              |      |          |
|         |                               | t-value   | 4.053        |      |          |              |      |          |
|         |                               | p-value   | 0.000        |      |          |              |      |          |
| Tengah  | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3889       |      |          |              |      |          |
|         |                               | SE        | 0.091        |      |          |              |      |          |
|         |                               | t-value   | 4.276        |      |          |              |      |          |
|         |                               | p-value   | 0.000        |      |          |              |      |          |
| Timur   | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3822       |      |          |              |      |          |
|         |                               | SE        | 0.090        |      |          |              |      |          |
|         |                               | t-value   | 4.255        |      |          |              |      |          |
|         |                               | p-value   | 0.000        |      |          |              |      |          |
| Utara   | $(1,0,0) \times (0,1,0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4391       |      |          |              |      |          |
|         |                               | SE        | 0.088        |      |          |              |      |          |
|         |                               | t-value   | 5.017        |      |          |              |      |          |
|         |                               | p-value   | 0.000        |      |          |              |      |          |

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa model ARIMA terbaik yang digunakan pada seluruh wilayah adalah ARIMA  $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ , di mana parameter yang signifikan secara statistik hanyalah komponen AR non-musiman. Hal ini ditunjukkan oleh nilai p-value  $< 0.05$  pada seluruh wilayah, sehingga parameter AR(1) terbukti memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan pola curah hujan bulanan. Nilai koefisien yang positif pada setiap wilayah juga menegaskan adanya hubungan autoregresif yang kuat antara curah hujan bulan ini dan bulan sebelumnya. Selain itu, nilai standard error yang relatif kecil serta t-value yang tinggi pada seluruh wilayah menunjukkan bahwa estimasi parameter bersifat stabil dan dapat dipercaya. Hasil diagnostik juga menunjukkan bahwa residual model telah memenuhi karakteristik white noise, sehingga tidak terdapat autokorelasi yang tersisa dan pola dalam data telah berhasil ditangkap oleh model. Dengan demikian, model ARIMA yang diperoleh dapat dinyatakan layak dan valid untuk digunakan dalam proses peramalan curah hujan pada masing-masing wilayah.

### 4.2.3 Model Fitting

Berdasarkan hasil analisis ACF dan PACF pada kelima wilayah terlihat bahwa pola autokorelasi menurun secara bertahap setelah lag ke-1 dan PACF menunjukkan cut-off pada lag pertama, baik untuk komponen non musiman maupun musiman. Pola tersebut mengindikasikan keberadaan komponen agresif (AR) dan moving average (MA) pada lag pertama, serta adanya pengaruh musiman dengan periode tahunan (seasonal periode = 12). Oleh karena itu, model yang sesuai untuk menggambarkan karakteristik data curah hujan di seluruh wilayah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:


Tabel 4.7: Hasil Model Fitting ARIMA

| Wilayah | Model                             | RMSE  |
|---------|-----------------------------------|-------|
| Barat   | $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 5.082 |
| Selatan | $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 4.680 |
| Tengah  | $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 4.434 |
| Timur   | $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 4.643 |
| Utara   | $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 5.016 |

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil evaluasi model SARIMA  $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$  pada kelima wilayah, diperoleh nilai RMSE yang bervariasi, mencerminkan tingkat akurasi model dalam memprediksi curah hujan di setiap wilayah. Wilayah Tengah menunjukkan performa terbaik dengan nilai RMSE sebesar 4.434, yang mengindikasikan bahwa pola musiman pada wilayah ini relatif stabil dan dapat ditangkap dengan baik oleh model. Wilayah Selatan berada pada posisi berikutnya dengan RMSE 4.680, yang berarti model memiliki kemampuan prediksi yang cukup baik meskipun terdapat sedikit ketidakstabilan pola data. Wilayah Timur dan Barat memiliki nilai RMSE masing-masing 4.643 dan 5.082 hasil ini menunjukkan bahwa meskipun model dapat menangkap pola musiman, masih terdapat variasi data yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh struktur model yang digunakan. Sementara itu, Wilayah Utara memiliki nilai RMSE tertinggi sebesar 5.016, menandakan bahwa pola curah hujan di wilayah tersebut lebih fluktuatif sehingga model kurang optimal dalam melakukan prediksi. Secara keseluruhan, variasi nilai RMSE ini mengindikasikan bahwa tingkat keakuratan model sangat dipengaruhi oleh karakteristik pola hujan masing-masing wilayah, dan wilayah dengan pola musiman yang lebih teratur cenderung menghasilkan performa model yang lebih baik.


#### 4.2.4 Hasil Forecasting ARIMA

Berikut merupakan hasil forecasting ARIMA menggunakan model yang ada pada Tabel 4.7:




Gambar 4.10: Hasil Forecasting Wilayah Barat

Berdasarkan Gambar 4.10 hasil peramalan curah hujan wilayah Barat menggunakan model SARIMA  $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$  menunjukkan bahwa model hanya mampu mengikuti pola musiman secara umum, namun belum akurat dalam memprediksi nilai curah hujan, yang ditunjukkan oleh RMSE sebesar 5.082. Model cenderung menghasilkan prediksi yang lebih rendah daripada nilai aktual, terutama pada periode puncak hujan seperti Februari, Maret, dan Desember 2024. Meskipun pola penurunan pada musim kemarau dapat ditangkap, prediksi tetap berada di bawah nilai aktual sehingga mengindikasikan adanya underestimation. Secara keseluruhan, model SARIMA masih kurang mampu menangkap variabilitas curah hujan ekstrem di wilayah Barat, sehingga diperlukan pendekatan pemodelan lain yang lebih mampu merepresentasikan fluktuasi intensitas curah hujan.



Gambar 4.11: Hasil Forecasting Wilayah Selatan


Berdasarkan Gambar 4.11 hasil peramalan curah hujan wilayah Selatan menunjukkan bahwa model SARIMA mampu mengikuti pola musiman secara umum, namun akurasi masih rendah, terlihat dari nilai RMSE sebesar 4.680. Model cenderung menghasilkan prediksi yang lebih rendah daripada nilai aktual, terutama pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi seperti Maret, Mei, dan Desember 2024, sehingga terjadi underestimation. Pada periode curah hujan rendah, model sedikit lebih stabil, tetapi tetap belum mampu menangkap variasi secara tepat. Secara keseluruhan, model dapat menggambarkan pola dasar musiman, namun belum optimal dalam memodelkan fluktuasi ekstrem, sehingga diperlukan pendekatan model lain yang lebih adaptif untuk meningkatkan kinerja peramalan.



Gambar 4.12: Hasil Forecasting Wilayah Tengah


Berdasarkan Gambar 4.12 model SARIMA pada wilayah Tengah mengha-

silkan nilai RMSE 4.434 , yang menunjukkan akurasi prediksi sangat rendah. Model cenderung menghasilkan prediksi yang jauh lebih rendah dari data aktual, terutama pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi seperti Februari, Maret, dan Mei 2024, sehingga menunjukkan underestimation yang kuat. Pada periode curah hujan rendah, performa model sedikit lebih baik, namun tetap tidak mampu menangkap variasi kecil karena prediksinya cenderung mendekati nilai konstan. Secara keseluruhan, model hanya mampu mengikuti pola musiman dasar tetapi tidak cukup sensitif terhadap fluktuasi curah hujan yang ekstrem dan non-linear. Hal ini menunjukkan bahwa model SARIMA kurang optimal untuk wilayah ini dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan lain yang lebih adaptif yaitu STARIMA.



Gambar 4.13: Hasil Forecasting Wilayah Timur

Berdasarkan Gambar 4.13 model SARIMA pada wilayah Timur menghasilkan RMSE 4.643 , menunjukkan akurasi yang rendah. Meskipun model mampu mengikuti pola musiman secara umum, prediksi sering berada jauh di bawah nilai aktual, terutama pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi seperti Februari, Maret, dan Mei 2024. Hal ini menunjukkan adanya underestimation dan ketidakmampuan model menangkap fluktuasi curah hujan yang ekstrem. Pada periode curah hujan rendah, model tampil sedikit lebih baik, namun tetap belum konsisten dalam mengikuti variasi aktual. Secara keseluruhan, model hanya cukup untuk menggambarkan pola dasar, tetapi tidak efektif dalam memodelkan perubahan intensitas curah hujan yang tajam, sehingga perlu pendekatan lain yang lebih adaptif untuk meningkatkan akurasi peramalan.



Gambar 4.14: Hasil Forecasting Wilayah Utara

Berdasarkan Gambar 4.14 model SARIMA pada wilayah Utara menghasilkan nilai RMSE 5.016, yang menunjukkan akurasi prediksi sangat rendah. Model cenderung menghasilkan prediksi yang jauh lebih rendah dari data aktual, terutama pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi seperti Februari, Maret, dan Mei 2024, sehingga menunjukkan underestimation yang kuat. Pada periode curah hujan rendah, performa model sedikit lebih baik, namun tetap tidak mampu menangkap variasi kecil karena prediksinya cenderung mendekati nilai konstan. Secara keseluruhan, model hanya mampu mengikuti pola musiman dasar tetapi tidak cukup sensitif terhadap fluktuasi curah hujan yang ekstrem dan non-linear. Hal ini menunjukkan bahwa model SARIMA kurang optimal untuk wilayah ini dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan lain yang lebih adaptif yaitu STARIMA.

## 4.3 STARIMA

### 4.3.1 Stasioner Data

Setelah dilakukan analisis dekomposisi untuk mengidentifikasi pola tren dan musiman, langkah selanjutnya adalah menguji tingkat kestasioneran data pada masing - masing wilayah. Uji stasioneritas dilakukan untuk memastikan bahwa deret waktu curah hujan telah memenuhi asumsi dasar analisis time series, yaitu nilai rata - rata dan varians yang relatif konstan terhadap waktu. Data yang tidak stasioner dapat menyebabkan estimasi parameter model menjadi bias dan tidak stabil, sehingga perlu dilakukan transformasi atau differencing sebelum proses pemodelan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kestasioneran data curah hujan di kelima wilayah Kota Surabaya guna menentukan apakah proses differencing diperlukan untuk menjadikan data stasioner secara statistik.

#### A. Kestasioneran terhadap varians



Kestasioneran data curah hujan terhadap varians dapat dilihat dari transformasi lambda ( $\lambda$ ) yang dihasilkan dari plot BoxCox. Jika nilai ( $\lambda$ ) mendekati satu maka dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner dan sebaliknya. Untuk membuat plot BoxCox data yang digunakan harus bernilai positif.

Tabel 4.8: Nilai Lambda Semua Wilayah

| Wilayah | Lambda Sebelum | Lambda Sesudah |
|---------|----------------|----------------|
| Barat   | 0.1962         | 1.119          |
| Selatan | 0.2009         | 1.140          |
| Tengah  | 0.1847         | 1.146          |
| Timur   | 0.1843         | 1.305          |
| Utara   | 0.1894         | 1.127          |

Berdasarkan Tabel 4.8 itu nilai  $\lambda$  hasil transformasi BoxCox menunjukkan peningkatan yang signifikan pada seluruh wilayah setelah proses optimasi dilakukan. Kenaikan nilai  $\lambda$  yang mendekati 1 menandakan bahwa varians data curah hujan menjadi lebih stabil dan mendekati kondisi stasioner. Dengan demikian, transformasi BoxCox terbukti efektif sebagai langkah pra pemrosesan untuk menormalkan varians dan memastikan bahwa data memenuhi asumsi homoskedastisitas sebelum proses differencing dan pemodelan STARIMA dilakukan.

B. Kestasioneran terhadap rata - rata


Setelah data stasioner terhadap varians, selanjutnya dilakukan pengujian kestasioneran terhadap rata - rata. Pengujian ini dapat dilakukan dengan Menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test*, berikut adalah hipotesisnya:  $H_0 : \phi \geq 0$  (data tidak stasioner terhadap rata-rata) vs  $H_1 : \phi < 0$  (data stasioner terhadap rata-rata) Hasil pengujian *Augmented Dickey-Fuller Unit Root* untuk masing-masing lokasi terangkum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9: Hasil Uji ADF

| Wilayah | <i>t</i> -statistik | Nilai-p |
|---------|---------------------|---------|
| Barat   | -8.314              | 0.01    |
| Selatan | -8.111              | 0.01    |
| Tengah  | -8.107              | 0.01    |
| Timur   | -7.781              | 0.01    |
| Utara   | -8.313              | 0.01    |

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa data curah hujan kelima wilayah Surabaya telah stasioner terhadap varians juga stasioner terhadap rata - rata sehingga tidak perlu di diferensiasi. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai peluang yang dihasilkan oleh ke 5 wilayah Surabaya yaitu sebesar 0.01. Dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa kelima wilayah Surabaya telah stasioner terhadap varians juga stasioner terhadap rata-rata.

Berikut adalah grafik curah hujan kelima wilayah surabaya setelah dilakukan transformasi BoxCox dan differencing.



Gambar 4.15: Hasil Grafik Curah Hujan Setelah Transformasi dan Differencing

Berdasarkan Gambar 4.15 diatas pola curah hujan yang telah melalui proses differencing musiman, setelah transformasi BoxCox diterapkan.

Seluruh wilayah Barat, Selatan, Tengah, Timur, dan Utara menunjukkan fluktuasi yang lebih stabil serta tidak lagi memperlihatkan pola musiman yang berulang, menandakan bahwa komponen musiman berhasil dieliminasi. Pola residual yang berosilasi di sekitar nol mengindikasikan bahwa data telah berada dalam kondisi yang lebih mendekati stasioner, sehingga layak digunakan untuk pemodelan STARIMA pada tahap selanjutnya.


### 4.3.2 Bobot Seragam

Pada STARIMA ini setelah melakukan stasioner tes seperti pada poin 4.3.1 lalu membuat pembobotan yang mana disini menggunakan tiga pembobotan yaitu bobot lokasi seragam, bobot lokasi invers jarak, dan bobot lokasi normalisasi korelasi silang. Penggunaan ketiga bobot ini dilakukan untuk mendapatkan model STARIMA terbaik dengan bobot lokasi yang sesuai. Berikut merupakan matriks bobot lokasi seragam:

$$W = \begin{pmatrix} 0.00 & 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.00 & 0.25 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.00 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.00 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.25 & 0.00 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

#### A. Identifikasi

Setelah mendapatkan bobot, melakukan perhitungan STACF seperti pada Rumus 2.15 dan STPACF seperti pada Rumus 2.9. Perhitungan Perhitungan STACF dan STPACF ini digunakan untuk menentukan orde  $p, q$  nya karena data nya sudah di differencing. Berikut adalah plot STACF dan STPACF:




Gambar 4.16: STACF dan STPACF SLAG 0

Gambar 4.16 menunjukkan hasil analisis Spatio-Temporal Autocorrelation Function (STACF) dan Spatio-Temporal Partial Autocorrelation Function (STPACF) menggunakan bobot seragam. Kedua grafik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan spasial dan temporal

pada data curah hujan antar wilayah di Kota Surabaya.

Berdasarkan plot STACF, pada beberapa temporal lag awal (khusus nya lag 1-3) menunjukkan autokorelasi positif yang cukup kuat, berada di atas batas kepercayaan 95%. Hal ini menandakan adanya ketergantungan temporal jangka pendek, di mana curah hujan pada periode ini masih dipengaruhi oleh periode sebelumnya. Setelah lag ke-5 autokorelasi mulai berfluktuasi disekitar nol dengan kecenderungan negatif cukup konsisten setelah lag ke-25 hingga lag ke-40. Hal ini menunjukkan adanya siklus musiman pada data curah hujan bulanan.

Sementara itu, plot STPACF yang signifikan pada lag 1 dengan amplitudo cukup tinggi (sekitar 0,4) menandakan adanya pengaruh langsung yang kuat dari satu periode sebelumnya terhadap periode saat ini. Nilai nilai berikutnya tampak menurun dan berfluktuasi di sekitar nol dengan beberapa titik yang masih melewati batas kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh remporal yang semakin lemah seiring bertambahnya lag. Nilai STPACF yang relatif acak setelah lag ke-5 mengindikasikan bahwa sebagian besar struktur autokorelasi telah tertangkap oleh komponen AR pada lag awal. Dengan kata lain, model STARIMA dapat menggunakan orde  $p=1$  atau 2 sebagai kandidat awal untuk komponen AR. Secara keseluruhan, kombinasi pola pada STACF dan STPACF mendukung pemilihan model dengan struktur STARIMA(3,1,2), tergantung pada kekuatan korelasi spasial dan kestabilan residual yang akan dievaluasi pada tahap estimasi berikutnya.



Gambar 4.17: STACF dan STPACF SLAG 1

Gambar 4.17 menunjukkan hasil analisis Spatio-Temporal Autocorrelation Function (STACF) dan Spatio-Temporal Partial Autocorrelation Function (STPACF) menggunakan bobot seragam. Kedua grafik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola keterkaitan spasial dan temporal pada data curah hujan antar wilayah di Kota Surabaya.

Berdasarkan plot STACF, pada beberapa temporal lag awal (khusus nya lag 1-3) menunjukkan autokorelasi positif yang cukup kuat, berada di atas batas kepercayaan 95%. Hal ini menandakan adanya pengaruh spa-

sial langsung antar wilayah yang berdekatan dimana curah hujan di satu wilayah pada waktu tertentu masih berkaitan erat dengan kondisi wilayah sekitarnya pada periode sebelumnya. Setelah lag ke-5 autokorelasi mulai berfluktuasi di sekitar nol dengan kecenderungan negatif cukup konsisten setelah lag ke-25 hingga lag ke-40. Hal ini menunjukkan adanya fase keterlambatan pengaruh spatio-temporal dimana efek keterkaitan spasial mulai melemah dan bergeser menjadi hubungan negatif akibat perbedaan siklus hujan antar wilayah.

Sementara itu, plot STPACF yang signifikan pada lag 1 menunjukkan hubungan langsung antar waktu yang kuat antara wilayah dan tetangganya yang berarti curah hujan di satu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah sekitar pada satu periode sebelumnya. Beberapa nilai STPACF lainnya yang melewati batas kepercayaan pada lag 6, 10 dan 20 menunjukkan ada resonansi temporal tambahan, kemungkinan akibat siklus musiman yang berulang di beberapa wilayah. Setelah lag ke-25, nilai STPACF sebagian besar berfluktuasi di sekitar nol menandakan bahwa pengaruh langsung antar waktu di antara wilayah sudah sangat lemah dan sebagian besar ketergantungan sudah dijelaskan oleh lag awal.

Secara keseluruhan, kombinasi pola pada STACF dan STPACF mendukung pemilihan model dengan struktur STARIMA(3,1,2), tergantung pada kekuatan korelasi spasial dan kestabilan residual yang akan dievaluasi pada tahap estimasi berikutnya.

#### B. Estimasi Parameter

Parameter yang diestimasi dari model yang telah diidentifikasi (STARIMA (1,1,0), STARIMA (1,1,1), dan STARIMA (1,1,2)) menggunakan metode Maximum Likelihood, disajikan dalam Tabel 4.10, bersama dengan standar error, nilai t, dan nilai p masing-masing:

Tabel 4.10: Estimasi Parameter

| Spatial Orde | Model | Statistik | AR Parameter            |             |             | MA Parameter  |               |               |
|--------------|-------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|              |       |           | $\phi_{10}$             | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\Theta_{10}$ | $\Theta_{20}$ | $\Theta_{30}$ |
| Lag 0        | 1,1,0 | Estimasi  | 0.4812                  |             |             |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.0435                  |             |             |               |               |               |
|              |       | t-value   | 11.1                    |             |             |               |               |               |
|              |       | p-value   | < 0.000000000000002 *** |             |             |               |               |               |
|              | 1,1,1 | Estimasi  | 0.5747                  |             |             | -0.1557       |               |               |
|              |       | SE        | 0.0685                  |             |             | 0.0853        |               |               |
|              |       | t-value   | 8.39                    |             |             | -1.83         |               |               |
|              |       | p-value   | 0.000000000000056 ***   | 0.069       |             |               |               |               |
|              | 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760                  | -0.2765     | -0.1313     |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.088                   | 0.1082      | 0.076       |               |               |               |
|              |       | t-value   | 7.62                    | 2.56        | 1.71        |               |               |               |
|              |       | p-value   | 0.0000000000014 ***     | 0.011 ***   | 0.087       |               |               |               |
| Lag 1        | 1,1,0 | Estimasi  | 0.4890                  |             |             |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.0437                  |             |             |               |               |               |
|              |       | t-value   | 11.2                    |             |             |               |               |               |
|              |       | p-value   | < 0.000000000000002 *** |             |             |               |               |               |
|              | 1,1,1 | Estimasi  | 0.5711                  |             |             | -1.392        |               |               |
|              |       | SE        | 0.0681                  |             |             | 0.0855        |               |               |
|              |       | t-value   | 8.38                    |             |             | -1.63         |               |               |
|              |       | p-value   | 0.00000000000058 ***    | 0.10        |             |               |               |               |
|              | 1,1,2 | Estimasi  | 0.679                   | -0.2783     | -0.125      |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.114                   | 0.143       | 0.102       |               |               |               |
|              |       | t-value   | 5.94                    | -1.98       | -1.23       |               |               |               |
|              |       | p-value   | 0.00000057 ***          | 0.048       | 0.221       |               |               |               |

Berdasarkan Tabel 4.10 hasil estimasi parameter dari tiga model STARIMA (1,1,0), (1,1,1), dan (1,1,2) pada lag spasial 0 dan lag spasial 1 yang diestimasi menggunakan metode Maximum Likelihood. Masing-masing parameter dilaporkan bersama standar error, nilai t, dan nilai p untuk menilai signifikansi statistik. Secara umum, model STARIMA (1,1,0) menunjukkan parameter autoregressive yang sangat signifikan dengan nilai  $p$  jauh di bawah ambang 0.05, sedangkan model (1,1,1) dan (1,1,2) memperlihatkan kombinasi parameter AR dan MA yang cenderung kurang stabil atau tidak seluruhnya signifikan. Berdasarkan keseluruhan pola signifikansi, konsistensi, dan stabilitas parameter, model STARIMA (1,1,0) menjadi konfigurasi yang paling unggul untuk bobot seragam.

### C. Model terbaik

Untuk memilih model spasial terbaik dalam penelitian ini menggunakan evaluasi Root Mean Squared Error (RMSE) untuk membandingkan kinerja peramalan dari model - model STARIMA. Berdasarkan hasil pada Lampiran 14, berikut adalah tabel nya


Tabel 4.11: Hasil Model Fitting STARIMA

| Wilayah          | STARIMA (1,1,0) <sub>0</sub> | STARIMA (1,1,1) <sub>0</sub> | STARIMA (1,1,0) <sub>1</sub> | STARIMA (1,1,1) <sub>1</sub> |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Barat            | 1.689                        | 1.652                        | 1.685                        | 1.653                        |
| Selatan          | 2.019                        | 2.003                        | 2.018                        | 2.005                        |
| Tengah           | 2.065                        | 2.125                        | 2.066                        | 2.119                        |
| Timur            | 1.423                        | 1.408                        | 1.420                        | 1.407                        |
| Utara            | 1.699                        | 1.681                        | 1.696                        | 1.680                        |
| <b>Rata-Rata</b> | 1.779                        | 1.7738                       | 1.777                        | 1.7728                       |

Berdasarkan Tabel 4.11, terlihat bahwa setiap konfigurasi model STARIMA menghasilkan nilai RMSE yang berbeda untuk masing-masing wilayah. Secara umum, nilai RMSE seluruh model berada pada kisaran 1.40 - 2.12, menunjukkan bahwa performa model cukup stabil di seluruh wilayah Surabaya. Jika dilihat dari nilai rata-rata RMSE di bagian bawah tabel, model STARIMA (1, 1, 1)<sub>1</sub> memiliki nilai rata-rata terkecil, yaitu 1.7728, sehingga dapat disimpulkan sebagai model dengan performa terbaik dibandingkan model lainnya. Nilai rata-rata RMSE yang lebih rendah menunjukkan bahwa model ini paling efektif dalam menangkap pola spasio-temporal curah hujan pada seluruh wilayah. Secara wilayah, model STARIMA (1, 1, 1)<sub>1</sub> memberikan hasil RMSE yang relatif kecil terutama pada wilayah Timur (1.407) dan Utara (1.680), yang menunjukkan bahwa kedua wilayah ini memiliki pola curah hujan yang lebih mudah diprediksi ketika mempertimbangkan hubungan spasial antar wilayah. Sementara itu, wilayah Tengah cenderung memiliki RMSE lebih tinggi pada semua model, yang mengindikasikan bahwa fluktuasi curah hujan di wilayah ini lebih kompleks atau dipengaruhi variabilitas spasial yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan model lain seperti STARIMA (1, 1, 0)<sub>0</sub> atau STARIMA (1, 1, 1)<sub>0</sub>, terlihat bahwa penambahan komponen spasial pada lag 1 memberikan peningkatan akurasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan spasial antar wilayah memiliki peran signifikan dalam memodelkan curah hujan di Surabaya, sehingga model dengan komponen spasial yang lebih lengkap menjadi lebih representatif. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa model STARIMA yang mempertimbangkan baik hubungan temporal maupun spasial pada lag pertama mampu menghasilkan prediksi yang paling akurat. Oleh karena itu, STARIMA (1, 1, 1)<sub>1</sub> dipilih sebagai model spasial terbaik dalam penelitian ini.

#### D. Hasil Forecasting STARIMA


Berikut adalah hasil peramalan curah hujan di berbagai wilayah menggunakan bobot seragam:



Gambar 4.18: Hasil Peramalan Wilayah Barat


Berdasarkan Gambar 4.18 Hasil prediksi cuaca di wilayah barat menunjukkan error sebesar 1.652, yang menunjukkan bahwa tingkat kesalahan ini relatif kecil, artinya model memiliki kemampuan memprediksi yang cukup baik. Model mampu mengenali tren peningkatan curah hujan musiman di awal tahun dengan baik. Namun, pada bulan Mei hingga Agustus terjadi penurunan curah hujan, dan prediksi model sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan data aktual. Mulai dari bulan September hingga Desember, tren kenaikan curah hujan kembali terdeteksi secara akurat. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mengikuti dinamika perubahan waktu dengan cukup tepat.






Gambar 4.19: Hasil Peramalan Wilayah Selatan

Berdasarkan Gambar 4.19 Model STARIMA dengan bobot seragam menghasilkan kesalahan sebesar 2.003. Hasil ini masih cukup baik karena model mampu menangkap tren umum curah hujan, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada fase-fase ekstrem. Pada awal tahun, model mengikuti pola kenaikan curah hujan dengan baik, terutama hingga puncak bulan Maret. Namun, terlihat sedikit terlalu tinggi. Lalu, antara bulan Mei sampai Agustus terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan, dan model berhasil menangkap tren tersebut. Di bulan September hingga Desember, tren curah hujan mulai meningkat kembali, model menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam mengikuti pola tersebut. Namun, menjelang bulan Desember, prediksi sedikit lebih tinggi dari data aktual, sehingga puncak curah hujan tidak sepenuhnya terwakili. Jadi, dari hasil peramalan ini sudah cukup memadai untuk menggambarkan pola curah hujan musiman, tetapi belum sepenuhnya menangkap variasi spasial spesifik.




Gambar 4.20: Hasil Peramalan Wilayah Tengah

Berdasarkan Gambar 4.20 Model STARIMA dengan bobot seragam menghasilkan nilai kesalahan sebesar 2.125. Model ini mampu mengikuti tren kenaikan curah hujan hingga mencapai puncaknya sekitar bulan Maret, dengan sedikit perbedaan nilai pada masa-masa ekstrem. Model cenderung sedikit mengestimasi nilai yang lebih tinggi di awal tahun, menunjukkan bahwa model merespon terhadap autokorelasi temporal yang kuat. Selanjutnya, dari bulan Mei sampai Agustus, curah hujan mengalami penurunan yang signifikan, dan model berhasil menangkap tren tersebut dengan baik. Sementara itu, dari bulan September sampai Desember, model kembali mengikuti tren kenaikan curah hujan yang terjadi menjelang akhir tahun.



Gambar 4.21: Hasil Peramalan Wilayah Timur

Berdasarkan Gambar 4.21 Model STARIMA dengan bobot seragam di wilayah Timur memberikan nilai kesalahan terkecil yaitu 1.408. Model ini mampu menggambarkan dengan tepat pola peningkatan curah hujan musiman hingga mencapai puncaknya sekitar bulan Maret. Setelah itu terjadi penurunan yang cukup signifikan mulai bulan Mei hingga Agustus. Model menunjukkan bahwa tren ini konsisten dan menghasilkan nilai prediksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai aktual. Pada bulan September hingga Desember, hasil prediksi menunjukkan kemiripan dengan data nyata, namun di bulan Desember terjadi under forecast pada puncaknya.



Gambar 4.22: Hasil Peramalan Wilayah Utara

Berdasarkan Gambar 4.22 Model STARIMA Menggunakan bobot seragam menunjukkan nilai error sebesar 1.681 yang berarti tingkat kesalahan prediksi relatif rendah dan model mampu mengikuti pola temporal curah hujan aktual dengan baik terutama dalam menangkap siklus musim tahunan. Model ini merepresentasikan tren kenaikan curah hujan hingga puncak sekitar Maret. Garis prediksi cenderung sedikit lebih rendah dari data aktual pada puncak maksimum, namun pola kenaikan dan penurunan menunjukkan akurasi yang konsisten. Curah hujan pada bulan Mei sampai Agustus model sedikit over forecast, namun tetap mempertahankan bentuk tren yang realistis. Pada bulan September sampai Desember tren curah hujan kembali meningkat dan model mampu mengikuti arah kenaikan dengan cukup baik. Sedikit under forecast muncul di sekitar Desember, tetapi model tetap menunjukkan sinkronisasi temporal yang kuat dengan data aktual.

### 4.3.3 Bobot Invers Jarak


Perhitungan bobot lokasi invers jarak menggunakan jarak sebenarnya natar lokasi, perhitungan bobot ini diperoleh dari hasil invers jarak sebenarnya yang kemudian dinormalisasi. Perhitungan jarak antar wilayah dapat dilakukan sesuai dengan Persamaan 2.25 yaitu dengan menggunakan posisi longitude dan latitude dari kedua wilayah yang akan dihitung jaraknya. Posisi longitude dan latitude yang digunakan berupa jarak terluar atau terjauh dari masing masing wilayah Surabaya. Bobot lokasi invers jarak memberikan nilai koefisien yang kecil untuk jarak yang lebih jauh dan sebaliknya. Berikut merupakan matriks

bobot lokasi invers jarak:

$$W = \begin{pmatrix} 0.00 & 0.2380 & 0.2946 & 0.1612 & 0.3063 \\ 0.1896 & 0.00 & 0.3409 & 0.2637 & 0.2058 \\ 0.1727 & 0.2508 & 0.00 & 0.2031 & 0.3734 \\ 0.1482 & 0.3403 & 0.3186 & 0.00 & 0.2290 \\ 0.2112 & 0.1781 & 0.4910 & 0.1717 & 0.00 \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

#### A. Identifikasi


Setelah mendapatkan bobot, melakukan perhitungan STACF seperti pada Rumus 2.15 dan STPACF seperti pada Rumus 2.9. Perhitungan Perhitungan STACF dan STPACF ini digunakan untuk menentukan orde  $p$ ,  $q$  nya karena data nya sudah di differencing. Berikut adalah plot STACF dan STPACF:



Gambar 4.23: STACF dan STPACF SLAG 0

Berdasarkan Gambar 4.23 pada kondisi slag 0 dengan bobot invers jarak didapatkan nilai STACF pada lag ke-1 hingga lag ke-3 menunjukkan autokorelasi positif yang cukup kuat dan signifikan, melewati batas kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan periode sekarang memiliki hubungan erat dengan periode satu hingga tiga bulan sebelumnya. Setelah lag ke-5 nilai autokorelasi berfluktuasi di sekitar nol, kemudian mengalami pola negatif yang semakin kuat setelah lag ke-25 hingga lag ke-40. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran siklus temporal musiman.

Sedangkan pada nilai STPACF, menunjukkan puncak signifikan pada lag ke-1 dengan sekitar 0,4 menandakan adanya pengaruh langsung yang kuat dari periode satu bulan sebelumnya terhadap periode saat ini. Beberapa nilai STPACF pada lag ke-6, lag ke-12 dan lag ke-18 masih melampaui batas kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa komponen musiman yang berulang secara periodik. Setelah lag ke-25, pola STPACF berfluktuasi di sekitar nol dan cenderung melemah, menunjukkan keterkaitan temporal langsung mulai hilang dan sebagian besar variasi sudah dapat dijelaskan oleh lag awal.



Gambar 4.24: STACF dan STPACF SLAG 1

pada kondisi slag 1 dengan bobot invers jarak didapatkan nilai STACF pada lag 1 hingga lag 3 menunjukkan autokorelasi positif yang signifikan dengan beberapa nilai berada di batas kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh curah hujan di wilayah lain yang berdekatan pada waktu sebelumnya. Setelah lag ke-5, nilai autokorelasi mulai berfluktuasi di sekitar nol dan kemudian menurun tajam menjadi negatif pada lag di atas 25, menunjukkan bahwa pengaruh spasial antar wilayah berkurang secara bertahap dan berubah arah menjadi berlawanan fase akibat siklus musiman. Sedangkan pada nilai STPACF, lag 1 masih menunjukkan pengaruh langsung yang kuat antara wilayah dan tetangga terdekatnya. Beberapa nilai signifikan juga muncul pada lag ke-10, lag ke-20 dan lag ke-28 yang dapat menunjukkan reasonasi temporal tambahan akibat kesamaan pola curah hujan antar wilayah yang memiliki jarak spasial tertentu namun masih berada dalam radius pengaruh spasial model. Setelah lag ke-25, nilai STPACF berfluktuasi di sekitar nol dan tidak lagi signifikan, menunjukkan bahwa pengaruh langsung antar wilayah berkurang secara substansi dan mayoritas ketergantungan spasio temporal telah dijelaskan oleh lag awal.

#### B. Estimasi Parameter

Parameter yang diestimasi dari model yang telah diidentifikasi (STARIMA (1,1,0), STARIMA (1,1,1), dan STARIMA (1,1,2)) menggunakan metode Maximum Likelihood, disajikan dalam Tabel 4.12, bersama dengan standar error, nilai t, dan nilai p masing-masing:

Tabel 4.12: Estimasi Parameter

| Spatial Orde | Model | Statistik | AR Parameter             |             |             | MA Parameter  |               |               |
|--------------|-------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|              |       |           | $\phi_{10}$              | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\Theta_{10}$ | $\Theta_{20}$ | $\Theta_{30}$ |
| Lag 0        | 1,1,0 | Estimasi  | 0.4812                   |             |             |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.0435                   |             |             |               |               |               |
|              |       | t-value   | 11.1                     |             |             |               |               |               |
|              |       | p-value   | < 0.0000000000000002 *** |             |             |               |               |               |
|              | 1,1,1 | Estimasi  | 0.5747                   |             |             | -0.1557       |               |               |
|              |       | SE        | 0.0685                   |             |             | 0.0853        |               |               |
|              |       | t-value   | 8.39                     |             |             | -1.83         |               |               |
|              |       | p-value   | 0.0000000000000056 ***   | 0.069       |             |               |               |               |
|              | 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760                   | -0.2765     | -0.1313     |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.088                    | 0.1082      | 0.076       |               |               |               |
|              |       | t-value   | 7.62                     | 2.56        | 1.71        |               |               |               |
|              |       | p-value   | 0.000000000000014 ***    | 0.011 ***   | 0.087       |               |               |               |
| Lag 1        | 1,1,0 | Estimasi  | 0.4849                   |             |             |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.0436                   |             |             |               |               |               |
|              |       | t-value   | 11.1                     |             |             |               |               |               |
|              |       | p-value   | < 0.0000000000000002 *** |             |             |               |               |               |
|              | 1,1,1 | Estimasi  | 0.5694                   |             |             | -0.1423       |               |               |
|              |       | SE        | 0.0682                   |             |             | 0.0855        |               |               |
|              |       | t-value   | 8.34                     |             |             | 1.66          |               |               |
|              |       | p-value   | 0.0000000000000078 ***   | 0.097       |             |               |               |               |
|              | 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760                   | -0.2792     | -0.1297     |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.1114                   | 0.1385      | 0.0983      |               |               |               |
|              |       | t-value   | 6.07                     | -2.02       | -1.32       |               |               |               |
|              |       | p-value   | 0.00000000026 ***        | 0.044       | 0.187       |               |               |               |

### C. Model Terbaik

Untuk memilih model spasial terbaik dalam penelitian ini menggunakan evaluasi Root Mean Squared Error (RMSE) untuk membandingkan kinerja peramalan dari model-model STARIMA. Berdasarkan hasil pada Lampiran 15, berikut adalah tabel nya:


Tabel 4.13: Hasil Model Fitting STARIMA

| Wilayah          | STARIMA (1,1,0) <sub>0</sub> | STARIMA (1,1,1) <sub>0</sub> | STARIMA (1,1,0) <sub>1</sub> | STARIMA (1,1,1) <sub>1</sub> |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Barat            | 1.688                        | 1.652                        | 1.686                        | 1.653                        |
| Selatan          | 2.020                        | 2.005                        | 2.020                        | 2.005                        |
| Tengah           | 2.067                        | 2.127                        | 2.067                        | 2.121                        |
| Timur            | 1.420                        | 1.407                        | 1.419                        | 1.407                        |
| Utara            | 1.698                        | 1.681                        | 1.696                        | 1.681                        |
| <b>Rata-Rata</b> | 1.7786                       | 1.7744                       | 1.7776                       | 1.7734                       |

Berdasarkan hasil Tabel 4.13 diatas model STARIMA (1, 1, 1)<sub>1</sub> menunjukkan kinerja paling optimal secara agregat dengan nilai RMSE rata-rata 1.7734, yang merupakan nilai terendah dibandingkan tiga model lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi komponen autoregressive

dan moving average baik pada lag spasial maupun temporal mampu menangkap dinamika curah hujan secara lebih presisi di seluruh wilayah pengamatan. Model ini secara konsisten memberikan performa yang lebih stabil lintas wilayah, sehingga direkomendasikan sebagai konfigurasi STARIMA terbaik untuk implementasi dalam penelitian ini.


D. Hasil Forecasting STARIMA Berikut adalah hasil forecasting menggunakan model STARIMA(1,1,2)<sub>1</sub> dengan bobot invers jarak:



Gambar 4.25: Hasil Peramalan Wilayah Barat


Gambar 4.25 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Barat periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrem curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) dapat ditangkap dengan baik oleh model. Dengan nilai RMSE sebesar 1.653 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori rendah sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang cukup baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Barat.






Gambar 4.26: Hasil Peramalan Wilayah Selatan

Gambar 4.26 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Selatan periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) dapat ditangkap dengan baik oleh model. Dengan nilai RMSE sebesar 2.005 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori kecil sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang cukup baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Selatan.




Gambar 4.27: Hasil Peramalan Wilayah Tengah

Gambar 4.27 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Tengah periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) dapat ditangkap dengan baik oleh model. Dengan nilai RMSE sebesar 2.121 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori sedang sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang cukup baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Tengah. Dengan demikian, model STARIMA dapat dikatakan memiliki kinerja yang stabil meskipun akurasinya sedikit lebih tinggi daripada wilayah Barat dan Selatan.



Gambar 4.28: Hasil Peramalan Wilayah Timur

Gambar 4.28 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Timur periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) meskipun terdapat perbedaan data aktual dan hasil forecast tetapi itu tidak mempengaruhi pola keseluruhan. Dengan nilai RMSE sebesar 1,407 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori rendah sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang sangat baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Timur.



Gambar 4.29: Hasil Peramalan Wilayah Utara

Gambar 4.29 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Utara periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) meskipun terdapat perbedaan data aktual dan hasil forecast tetapi itu tidak mempengaruhi pola keseluruhan. Dengan nilai RMSE sebesar 1.681 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori rendah sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang sangat baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Utara.

#### 4.3.4 Bobot Lokasi Normalisasi Korelasi Silang


Perhitungan bobot lokasi normalisasi korelasi silang dapat diselesaikan dengan menormalisasikan korelasi silang antar lokasi pada lag yang sesuai, penentuan lag berdasarkan orde struktur data deret waktu. Perhitungan bobot lokasi normalisasi korelasi silang sesuai dengan Persamaan 2.29 pada lag 1, karena order struktur deret waktu yang didapatkan pada studi kasus ini yaitu STARIMA (1,1,1). Berikut merupakan matriks bobot lokasi normalisasi

korelasi silang:

$$W = \begin{pmatrix} 0.00 & 0.2504 & 0.2503 & 0.2476 & 0.2518 \\ 0.2508 & 0.00 & 0.2522 & 0.2461 & 0.2509 \\ 0.2507 & 0.2522 & 0.00 & 0.2462 & 0.2509 \\ 0.2509 & 0.2490 & 0.2490 & 0.00 & 0.2510 \\ 0.2517 & 0.2504 & 0.2504 & 0.2476 & 0.00 \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

#### A. Identifikasi

Setelah mendapatkan bobot, melakukan perhitungan STACF seperti pada Rumus 2.15 dan STPACF seperti pada Rumus 2.9. Perhitungan Perhitungan STACF dan STPACF ini digunakan untuk menentukan orde  $p, q$  nya karena data nya sudah di differencing. Berikut adalah plot STACF dan STPACF:




Gambar 4.30: STACF dan STPACF SLAG 0

Gambar 4.30 merupakan hasil STACF pada slag 0 dengan pembobotan korelasi silang. Terlihat bahwa nilai autokorelasi pada beberapa temporal lag awal (khususnya lag ke-1 hingga lag ke-3) menunjukan nilai positif yang cukup tinggi dan berada di atas batas kepercayaan 95% menunjukan adanya dependensi temporal yang kuat pada data curah hujan. Yang berarti nilai curah hujan pada waktu tertentu masih dipengaruhi oleh nilai-nilai curah hujan pada periode sebelumnya. Setelah lag ke-5 nilai autokorelasi mulai menurun dan berfluktuasi di sekitar nol dengan beberapa lag menunjukan nilai negatif signifikan terutama setelah lag ke-25. Pola ini menunjukan bahwa pengaruh temporal menurun seiring bertambahnya jeda waktu dan kemungkinan terdapat pola musiman pada data curah hujan.

Sedangkan nilai STPACF pada slag 0, nilai autokorelasi parsial yang signifikan hanya muncul pada beberapa lag awal (khususnya lag ke-1 dan lag ke-13) yang menunjukan bahwa komponen AR pada model kemungkinan kecil, dengan dominasi efek pada lag pendek. Setelah itu, nilai

STPACF berfluktuasi di sekitar nol dan tidak menunjukkan pola signifikan yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan pengaruh lag terdekat, hubungan antar waktu berikut menjadi relatif lemah. Secara keseluruhan pola STACF dan STPACF dengan bobot korelasi silang slag 0 menunjukkan bahwa data curah hujan memiliki struktur ketergantungan temporal jangka pendek dengan efek spasial musiman (karena lag spasial = 0). Oleh karena itu, model STARIMA yang sesuai untuk kondisi ini kemungkinan akan memiliki order AR rendah, dengan komponen spasial yang lebih menonjol pada lag  $i, 0$ .



Gambar 4.31: STACF dan STPACF SLAG 1

Gambar 4.31 merupakan hasil STACF pada slag 1 dengan pembobotan korelasi silang. Pola autokorelasi pada beberapa temporal lag awal (khususnya lag ke-1 hingga lag ke-3) memiliki nilai positif yang cukup tinggi dan melampaui batas kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan kuat antar wilayah yang berdekatan secara spasial dalam waktu yang berdekatan. Setelah lag 5, nilai autokorelasi mulai menurun dan berganti menjadi negatif secara konsisten setelah lag ke-20, menandakan adanya pola musiman terbalik atau perubahan fase curah hujan antara periode. Pola negatif yang stabil hingga lag ke-40 menunjukkan bahwa pengaruh spasial antar wilayah cenderung bersifat jangka pendek dan melemah seiring meningkatnya jarak waktu. Sedangkan nilai STPACF pada slag 1 nilai autokorelasi parsial yang tinggi pada lag ke-1 menunjukkan bahwa hubungan AR dan spasial pada lag pendek sangat dominan. Di mana curah hujan di suatu wilayah dipengaruhi secara signifikan oleh curah hujan pada wilayah sekitar pada periode sebelumnya. Setelah lag ke-5, sebagian besar nilai STACF berfluktuasi di sekitar nol dengan hanya beberapa lonjakan kecil yang signifikan menunjukkan bahwa hubungan spatio temporal selanjutnya relatif lemah. Secara keseluruhan pola STACF dan STPACF dengan pembobotan korelasi silang slag 1 menunjukkan adanya keterkaitan spasial yang nyata antarwilayah berdekatan dalam waktu singkat dengan pengaruh yang semakin menurun pada periode lebih panjang. Hal ini memperkuat indikasi bahwa

model STARIMA yang digunakan perlu mempertimbangkan komponen spasial autoregressive dengan lag pendek (Slag 1) untuk menangkap dinamika curah hujan secara lebih akurat.

#### B. Estimasi Parameter

Parameter yang diestimasi dari model yang telah diidentifikasi (STARIMA (1,1,0), STARIMA (1,1,1), dan STARIMA (1,1,2)) menggunakan metode Maximum Likelihood, disajikan dalam Tabel 4.14, bersama dengan standar error, nilai t, dan nilai p masing-masing:

Tabel 4.14: Estimasi Parameter

| Spatial Orde | Model | Statistik | AR Parameter         |             |             | MA Parameter  |               |               |
|--------------|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|              |       |           | $\phi_{10}$          | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\Theta_{10}$ | $\Theta_{20}$ | $\Theta_{30}$ |
| Lag 0        | 1,1,0 | Estimasi  | 0.4812               |             |             |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.0435               |             |             |               |               |               |
|              |       | t-value   | 11.1                 |             |             |               |               |               |
|              |       | p-value   | < 0.0000000000000002 |             |             |               |               |               |
|              | 1,1,1 | Estimasi  | 0.5747               |             |             | -0.1557       |               |               |
|              |       | SE        | 0.0685               |             |             | 0.0853        |               |               |
|              |       | t-value   | 8.39                 |             |             | -1.83         |               |               |
|              |       | p-value   | 0.0000000000000056   | 0.069       |             |               |               |               |
|              | 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760               | -0.2765     | -0.1313     |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.088                | 0.1082      | 0.076       |               |               |               |
|              |       | t-value   | 7.62                 | 2.56        | 1.71        |               |               |               |
|              |       | p-value   | 0.00000000000014     | 0.011       | 0.087       |               |               |               |
| Lag 1        | 1,1,0 | Estimasi  | 0.4890               |             |             |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.0437               |             |             |               |               |               |
|              |       | t-value   | 11.2                 |             |             |               |               |               |
|              |       | p-value   | < 0.0000000000000002 |             |             |               |               |               |
|              | 1,1,1 | Estimasi  | 0.5712               |             |             | -0.1392       |               |               |
|              |       | SE        | 0.0681               |             |             | 0.0855        |               |               |
|              |       | t-value   | 8.39                 |             |             | -1.63         |               |               |
|              |       | p-value   | 0.000000000000057    | 0.10        |             |               |               |               |
|              | 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760               | -0.2792     | -0.1297     |               |               |               |
|              |       | SE        | 0.1115               | 0.1440      | 0.1020      |               |               |               |
|              |       | t-value   | 5.90                 | -1.97       | -1.22       |               |               |               |
|              |       | p-value   | 0.000000007          | 0.05        | 0.22        |               |               |               |

Berdasarkan Tabel 4.14 diatas merupakan hasil estimasi parameter untuk model STARIMA dengan kombinasi orde (1,1,0), (1,1,1), dan (1,1,2) pada lag spasial 0 dan 1. Setiap parameter dilaporkan bersama standar error, nilai t, serta nilai p untuk mengukur signifikansi statistiknya. Secara umum, parameter autoregressive ( $\phi$ ) pada seluruh model menunjukkan signifikansi yang tinggi, khususnya pada lag 0 dan lag 1, yang mengindikasikan adanya ketergantungan temporal yang kuat dalam data. Sementara itu, parameter moving average ( $\theta$ ) pada model dengan orde lebih tinggi memperlihatkan variasi tingkat signifikansi, mencerminkan kompleksitas dinamika spasial-temporal yang diwakili oleh masing-masing

model.

#### C. Model Terbaik

Untuk memilih model spasial terbaik dalam penelitian ini menggunakan evaluasi Root Mean Squared Error (RMSE) untuk membandingkan kinerja peramalan dari model-model STARIMA. Berdasarkan hasil pada Lampiran 16, berikut adalah tabel nya:

Tabel 4.15: Hasil Model Fitting STARIMA


| Wilayah          | STARIMA (1,1,0) <sub>0</sub> | STARIMA (1,1,1) <sub>0</sub> | STARIMA (1,1,0) <sub>1</sub> | STARIMA (1,1,1) <sub>1</sub> |
|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Barat            | 1.689                        | 1.652                        | 1.685                        | 1.653                        |
| Selatan          | 2.019                        | 2.003                        | 2.018                        | 2.005                        |
| Tengah           | 2.066                        | 2.125                        | 2.066                        | 2.120                        |
| Timur            | 1.423                        | 1.408                        | 1.420                        | 1.407                        |
| Utara            | 1.699                        | 1.681                        | 1.696                        | 1.680                        |
| <b>Rata-Rata</b> | 1.7786                       | 1.7744                       | 1.7776                       | 1.7734                       |

Berdasarkan hasil Tabel 4.15 di atas model STARIMA (1, 1, 1)<sub>1</sub> menunjukkan kinerja paling optimal secara agregat dengan nilai RMSE rata-rata 1.773, yang merupakan nilai terendah dibandingkan tiga model lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kombinasi komponen autoregressive dan moving average baik pada lag spasial maupun temporal mampu menangkap dinamika curah hujan secara lebih presisi di seluruh wilayah pengamatan. Model ini secara konsisten memberikan performa yang lebih stabil lintas wilayah, sehingga direkomendasikan sebagai konfigurasi STARIMA terbaik untuk implementasi dalam penelitian ini.

#### D. Hasil Forecasting


Berikut merupakan hasil forecasting curah hujan dengan pembobotan korelasi silang:






Gambar 4.32: Hasil Peramalan Wilayah Barat

Gambar 4.32 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Barat periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, pola Peramalan berhasil mengikuti tren perubahan curah hujan aktual cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan kecil antara data aktual dan hasil forecast seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah daripada data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan pada pertengahan tahun (sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) mengalami penurunan dan peningkatan kembali menjelang akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) dapat ditangkap dengan baik oleh model. Dengan nilai RMSE sebesar 1.653 menunjukkan bahwa error forecasting relatif kecil sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Barat.




Gambar 4.33: Hasil Peramalan Wilayah Selatan

Gambar 4.33 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Selatan periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) dapat ditangkap dengan baik oleh model. Dengan nilai RMSE sebesar 2.005 menunjukkan bahwa error forecasting tergolong rendah hingga sedang sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang cukup baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Selatan.




Gambar 4.34: Hasil Peramalan Wilayah Tengah

Gambar 4.34 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Tengah periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) dapat ditangkap dengan baik oleh model. Dengan nilai RMSE sebesar 2.120 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori sedang sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang cukup baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Tengah. Dengan demikian, model STARIMA dapat dikatakan memiliki kinerja yang stabil meskipun akurasinya sedikit lebih tinggi daripada wilayah Barat dan Selatan.



Gambar 4.35: Hasil Peramalan Wilayah Timur

Gambar 4.35 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Timur periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) meskipun terdapat perbedaan data aktual dan hasil forecast tetapi itu tidak mempengaruhi pola keseluruhan. Dengan nilai RMSE sebesar 1,407 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori rendah sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang sangat baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Timur.



Gambar 4.36: Hasil Peramalan Wilayah Utara

Gambar 4.36 diatas merupakan hasil forecasting di wilayah Utara periode Januari 2024 hingga Desember 2024. Secara umum, model mampu mengikuti pola perubahan curah hujan sesuai dengan data aktual dengan cukup baik. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara data aktual dengan hasil forecast, seperti di bulan Maret hingga April 2024 dimana hasil forecast lebih rendah dibandingkan dengan data aktual. Hal ini menunjukkan bahwa model masih memiliki sedikit keterlambatan dalam merespon perubahan ekstrim curah hujan. Lalu curah hujan menunjukkan penurunan pada pertengahan tahun (Sekitar bulan Mei hingga bulan September 2024) dan kembali meningkat di akhir tahun (bulan Oktober hingga bulan Desember 2024) meskipun terdapat perbedaan data aktual dan hasil forecast tetapi itu tidak mempengaruhi pola keseluruhan. Dengan nilai RMSE sebesar 1.680 menunjukkan bahwa error forecasting berada pada kategori rendah sehingga model dapat dikatakan memiliki akurasi yang sangat baik dalam memprediksi pola curah hujan di wilayah Utara.

#### 4.4 Hasil Peramalan

Berdasarkan hasil peramalan yang telah dilakukan dengan ketiga pembo-  
 botan itu diperoleh yang paling baik yaitu Bobot Seragam dengan model  
 (1,1,1). Hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model STARIMA  
 mengungguli model ARIMA univariat. Keunggulan model STARIMA diban-  
 dingkan model ARIMA univariat dapat disebabkan oleh penyertaan informasi  
 spasial, yaitu efek ketetanggaan, dalam bentuk matriks bobot spasial.

Tabel 4.16: Perbandingan RMSE ARIMA dan STARIMA per Wilayah

| Wilayah | Model                     | RMSE  |
|---------|---------------------------|-------|
| Barat   | ARIMA(1,0,0) x (0,1,0,12) | 5.082 |
|         | STARIMA(1,1,1,12)         | 1.653 |
| Selatan | ARIMA(1,0,0) x (0,1,0,12) | 4.680 |
|         | STARIMA(1,1,1,12)         | 2.005 |
| Tengah  | ARIMA(1,0,0) x (0,1,0,12) | 4.434 |
|         | STARIMA(1,1,1,12)         | 2.119 |
| Timur   | ARIMA(1,0,0) x (0,1,0,12) | 4.643 |
|         | STARIMA(1,1,1,12)         | 1.407 |
| Utara   | ARIMA(1,0,0) x (0,1,0,12) | 5.016 |
|         | STARIMA(1,1,1,12)         | 1.680 |

Tabel 4.16 ini menunjukkan nilai RMSE dari model ARIMA univariat dan model STARIMA untuk masing - masing wilayah. Berdasarkan hasil peramalan, model STARIMA secara konsisten memberikan nilai kesalahan (RMSE) yang lebih rendah dibandingkan ARIMA. Hal ini mengindikasikan bahwa penyertaan informasi spasial melalui matriks bobot spasial mampu meningkatkan akurasi model secara signifikan. Dengan demikian, STARIMA terbukti lebih unggul dalam memodelkan pola curah hujan antar wilayah yang saling berhubungan secara geografis.

## Bab V

### Kesimpulan dan Saran

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kelima wilayah di Surabaya memiliki karakteristik curah hujan yang relatif serupa, baik dari nilai rata-rata maupun pola persebaran statistiknya. Curah hujan menunjukkan pola musiman yang kuat dengan puncak hujan pada bulan Desember hingga Februari, serta kondisi minimum pada bulan Juli hingga September. Kelima wilayah juga memiliki korelasi spasial yang sangat tinggi (0,975–0,999), sehingga dinamika hujan antarwilayah bergerak hampir serentak. Model ARIMA mampu menggambarkan pola musiman tahunan, namun kinerjanya kurang responsif terhadap fluktuasi hujan ekstrem, tercermin dari nilai RMSE yang lebih tinggi karena ARIMA hanya memanfaatkan informasi temporal tanpa mempertimbangkan interaksi spasial antarwilayah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut digunakan model STARIMA dengan tiga jenis pembobotan spasial, yaitu bobot seragam, bobot invers jarak, dan bobot korelasi silang. Hasil evaluasi RMSE menunjukkan adanya peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan ARIMA. Hasil peramalan secara konsisten memperlihatkan bahwa STARIMA lebih mampu menangkap puncak musiman, lebih stabil pada periode penurunan hujan, menghasilkan error lebih kecil, serta lebih responsif terhadap pola spasial-temporal. Dari seluruh model yang diuji, STARIMA(1,1,1) dengan bobot seragam merupakan model paling optimal karena memberikan error paling rendah dan performa paling konsisten di seluruh wilayah.

#### 5.2 Saran

Untuk memperoleh gambaran spasial yang lebih detail pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah titik pengamatan serta menggunakan data curah hujan dari stasiun BMKG maupun radar cuaca agar akurasi meningkat. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan penggunaan model spasio-temporal modern berbasis machine learning seperti LSTM Spatio-Temporal atau Graph Neural Network. Pengembangan sistem

prediksi berbasis aplikasi untuk mendukung sistem peringatan dini berbasis STARIMA juga sangat direkomendasikan, termasuk pembuatan dashboard pemantauan curah hujan secara real-time. Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model prediksi curah hujan yang lebih akurat, responsif, dan aplikatif. Kombinasi antara pendekatan statistik klasik dan metode modern berbasis kecerdasan buatan berpotensi menghasilkan model spasio-temporal yang jauh lebih akurat dalam menggambarkan dinamika iklim pada kawasan perkotaan seperti Surabaya.



## Daftar Pustaka

- Alam, N. M., Mitra, S., Pandey, S. K., Jana, C., Ray, M., Ghosh, S., Mazumdar, S. P., Shankar, S. V., Saha, R. & Kar, G. (2024), 'Enhanced spatio-temporal modeling for rainfall forecasting: A high-resolution grid analysis', *Water* **16**(13), 1891.
- Azka, M. A., Sugianto, P. A., Silitonga, A. K. & Nugraheni, I. R. (2018), 'Uji akurasi produk estimasi curah hujan satelit gpm imerg di surabaya, indonesia', *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca* **19**(2), 83–88.
- Badu-Apraku, J. M., Akinwale, R. O., Menkir, A., Kamara, Y. A., Obeng-Bio, K. & Olaosebikan, R. O. (2021), 'Two-stage spatiotemporal time series modelling approach for rice yield prediction: Advanced agroecosystem management', *Agronomy* **11**(12), 2502.
- Febriana, I. T. (2019), Prediksi Banjir Genangan di Kota Surabaya Berdasarkan Prediksi Curah Hujan Berbasis Data BMKG dengan Pendekatan NU - Support Vector Regression dan Neural Network, Tugas akhir, Departemen Statistika, Fakultas Matematika, Komputasi, dan Sains Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Program Studi Sarjana.
- Fuad, A. A., Moataz, A. & Mohamed, R. A. (2021), 'Estimating covid-19 cases in makkah region of saudi arabia: Space-time arima modeling', *PLOS ONE* **1**(1).
- Ilmi, N., Aswi, A. & Aidid, M. K. (2023), 'Generalized space time autoregressive integrated moving average (gstarima) dalam peramalan data curah hujan di kota makassar', *Jurnal Statistika* . Received: 11 September 2022; Revised: 28 February 2023; Accepted: 7 March 2023.
- Islami, M. I., Rahim, A., Jaya, A. K. & Bakri, B. (2021), 'Spatio-temporal model of rainfall data using kalman filter and expectation-maximization algorithm', *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi (JMSK)* **17**(2), 304–313.

- Jagtap, S. & Karande, S. (2019), ‘Rainfall forecasting model using machine learning’, *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* **6**(5), 6107–6110.
- Kumar, R. R., Sarkar, K. A., Dhakre, D. S. & Bhattacharya, D. (n.d.), A hybrid space-time modelling approach for forecasting monthly temperature, Technical report, Department of Agricultural Statistics, Institute of Agriculture, Visva-Bharati, Sriniketan, West Bengal, India. n.d.
- Kumar, R. S., Kumar, M. P., Sravani, M. & Prasanna, V. S. (2023), Leveraging ensemble time-series forecasting model to predict the amount of rainfall in andhra pradesh, in ‘2023 7th International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)’, pp. 474–480.
- Laily, V. O. N. (2020), Model hybrid multivariate gstarx-rnn untuk peramalan data space-time (studi kasus: Data inflow dan outflow bank sentral di jawa), Tesis magister, departemen statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Latif, M. A. A., Rahman, M. M., Barri, M. H. H. & Al-Qurishi, M. A. (2022), ‘A review of the application of hybrid machine learning models to improve rainfall prediction’, *Arabian Journal of Geosciences* **15**(21), 1–18.
- Marino, D. L., Amarasinghe, K. & Manic, M. (2016), Building energy load forecasting using deep neural networks, in ‘Proceedings of the IECON 2016—42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society’, pp. 7046–7051.
- Mukhaiyar, U., Mahdiyasa, A. W., Prastoro, T., Pasaribu, U. S., Sari, K. N., Indratno, S. W., Soekarno, I., Choesin, D. N., Ismail, I., Rosleine, D. & Qoyyimi, D. T. (2024), ‘The generalized star modelling with three-dimensional of spatial weight matrix in predicting the indonesia peatland’s water level’, *Environmental Sciences Europe* **36**(180).
- Petropoulos, F., Hyndman, R. J., Athanasopoulos, T. & Bergmeir, C. (2021), ‘Forecasting: Theory and practice’, *International Journal of Forecasting* **37**(4), 1171–1176.
- Putra, J. A., Basbeth, F. & Bukhori, S. (2019), Sugar production forecasting system in ptpn xi semboro jember using autoregressive integrated moving average (arima) method, in ‘Proceedings of the 2019 6th International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Informatics (EE-CSEI)’, pp. 448–453.

- Rathod, S., Gurung, B., Singh, K. N. & Ray, M. (2018), 'An improved space-time autoregressive moving average (starma) model for modelling and forecasting of spatio-temporal time-series data', *J. Indian Soc. Agric. Stat.* **72**(3), 239–253. [Online].  
**URL:** <https://www.researchgate.net/publication/330081735>
- Rathod, S., Singh, K. N., Arya, P., Ray, M., Mukherjee, A., Sinha, K., Kumar, P. & Shekhawat, R. S. (2017), 'Forecasting maize yield using arima-genetic algorithm approach', *Journal of Outlook on Agriculture* **46**(4), 265–271.
- Ruchjana, N. (2019), Pengembangan model spatio temporal dan aplikasinya, in 'Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, UIN Raden Intan Lampung', pp. 1–6.
- Saesarin, J. P. (2020), Analisis Pola Ekspansi Perkotaan di Surabaya Barat Menggunakan Metode Spatial Autocorrelation, Tugas akhir, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
- Saha, A., Singh, K. N., Ray, M. & Rathod, S. (2020), 'A hybrid spatio-temporal modelling: An application to space-time rainfall forecasting', *Theoretical and Applied Climatology* **142**, 1271–1282.
- Saha, A., Singh, K. N., Ray, M., Rathod, S. & Dhyani, M. (2022), 'Fuzzy rule-based weighted space-time autoregressive moving average models for temperature forecasting', *Theoretical and Applied Climatology* **150**(3–4), 1321–1335.
- Sharma, K., Singh, K. N., Kumar, R. R., Ray, M. & Lama, A. (2025), 'Integrating spatial and temporal dynamics for rainfall prediction using the starma model in uttar pradesh', *Journal of Scientific Research and Reports* **31**(5), 87–101.
- Sofia, D. A., Sujono, J. & Legono, D. (2018), 'Analisis variabilitas spasial dan temporal curah hujan di wilayah gunung merapi', *Jurnal Teknisia* **23**(1), xx–xx.
- Suryana, D., Rahman, A., Fatonah, S., Nirmala, C. A. & Williemi, H. (2023), 'Time series clustering analysis using dynamic time warping technique of daily rainfall in bengkulu province', *Current Science* **124**(4), 447–455.
- Utami, E. R. (2017), Penerapan generalized spatial three stage least square (gs3sls) pada persamaan simultan spasial untuk pemodelan pertumbuhan ekonomi jawa timur, Tesis, program magister, jurusan statistika, fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

## Lampiran

### 1. Data Keseluruhan

| Date       | PRECTOTCORR | Longitude | Latitude | Wilayah |
|------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 1/31/2015  | 12.24129032 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 2/28/2015  | 10.2975     | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 3/31/2015  | 8.840645161 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 4/30/2015  | 5.790666667 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 5/31/2015  | 3.477096774 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 6/30/2015  | 0.376       | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 7/31/2015  | 0.15483871  | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 8/31/2015  | 0.219032258 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 9/30/2015  | 0.013       | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 10/31/2015 | 0           | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 11/30/2015 | 2.693666667 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 12/31/2015 | 5.48871     | 112.84    | -7.10    | Timur   |
| ⋮          | ⋮           | ⋮         | ⋮        | ⋮       |
| 1/31/2024  | 8.01516129  | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 2/29/2024  | 11.49931034 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 3/31/2024  | 5.201612903 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 4/30/2024  | 7.265       | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 5/31/2024  | 0.539067742 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 6/30/2024  | 1.507333333 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 7/31/2024  | 0.777741935 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 8/31/2024  | 0.029677419 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 9/30/2024  | 0.612666667 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 10/31/2024 | 1.226771494 | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 11/30/2024 | 5.631       | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 12/31/2024 | 12.3116129  | 112.84    | -7.31    | Timur   |
| 1/31/2015  | 13.95225806 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 2/28/2015  | 11.87321429 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 3/31/2015  | 9.44516129  | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 4/30/2015  | 7.664666667 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 5/31/2015  | 3.707096774 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 6/30/2015  | 0.404       | 112.61    | -7.24    | Barat   |

| Date       | PRECTOTCORR | Longitude | Latitude | Wilayah |
|------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 7/31/2015  | 0.044193548 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 8/31/2015  | 0.253225806 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 9/30/2015  | 0.002666667 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 10/31/2015 | 0.000645161 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 11/30/2015 | 3.233       | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 12/31/2015 | 5.888709677 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| ⋮          | ⋮           | ⋮         | ⋮        | ⋮       |
| 1/31/2024  | 9.657419355 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 2/29/2024  | 13.18304483 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 3/31/2024  | 6.666129032 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 4/30/2024  | 8.748666667 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 5/31/2024  | 0.61516129  | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 6/30/2024  | 2.328       | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 7/31/2024  | 0.880645161 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 8/31/2024  | 0.102258065 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 9/30/2024  | 1.314       | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 10/31/2024 | 1.468064516 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 11/30/2024 | 6.292666667 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 12/31/2024 | 13.62387097 | 112.61    | -7.24    | Barat   |
| 1/31/2015  | 14.30387097 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 2/28/2015  | 12.15035714 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 3/31/2015  | 11.21225806 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 4/30/2015  | 7.384       | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 5/31/2015  | 3.871935484 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 6/30/2015  | 0.249333333 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 7/31/2015  | 0.038064516 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 8/31/2015  | 0.269354839 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 9/30/2015  | 0.001666667 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 10/31/2015 | 0           | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 11/30/2015 | 3.351666667 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 12/31/2015 | 5.399354839 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| ⋮          | ⋮           | ⋮         | ⋮        | ⋮       |
| 1/31/2024  | 9.912258065 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 2/29/2024  | 13.8037931  | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 3/31/2024  | 4.729354839 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 4/30/2024  | 9.16        | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 5/31/2024  | 0.340645161 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 6/30/2024  | 2.391       | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 7/31/2024  | 0.822580645 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 8/31/2024  | 0.074838871 | 112.73    | -7.35    | Selatan |

| Date       | PRECTOTCORR | Longitude | Latitude | Wilayah |
|------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 9/30/2024  | 1.493       | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 10/31/2024 | 1.249032258 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 11/30/2024 | 6.636666667 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 12/31/2024 | 13.51903226 | 112.73    | -7.35    | Selatan |
| 1/31/2015  | 13.89774194 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 2/28/2015  | 11.93107143 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 3/31/2015  | 9.387419355 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 4/30/2015  | 7.462333333 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 5/31/2015  | 3.97516129  | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 6/30/2015  | 0.409333333 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 7/31/2015  | 0.040645161 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 8/31/2015  | 0.256129032 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 9/30/2015  | 0.003333333 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 10/31/2015 | 0.000645161 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 11/30/2015 | 3.227       | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 12/31/2015 | 5.791935484 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| ⋮          | ⋮           | ⋮         | ⋮        | ⋮       |
| 1/31/2024  | 9.479677419 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 2/29/2024  | 13.38482759 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 3/31/2024  | 6.628709677 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 4/30/2024  | 8.795       | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 5/31/2024  | 0.610967742 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 6/30/2024  | 2.319       | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 7/31/2024  | 0.882258065 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 8/31/2024  | 0.117741935 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 9/30/2024  | 1.306333333 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 10/31/2024 | 1.127096774 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 11/30/2024 | 6.537       | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 12/31/2024 | 13.60354839 | 112.73    | -7.2     | Utara   |
| 1/31/2015  | 14.25870968 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 2/28/2015  | 12.17071429 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 3/31/2015  | 11.19290323 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 4/30/2015  | 7.007       | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 5/31/2015  | 4.287741935 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 6/30/2015  | 0.249666667 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 7/31/2015  | 0.038837097 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 8/31/2015  | 0.269677419 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 9/30/2015  | 0.001666667 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 10/31/2015 | 0           | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 11/30/2015 | 3.352666667 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 12/31/2015 | 5.317741935 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |

| Date       | PRECTOTCORR | Longitude | Latitude | Wilayah |
|------------|-------------|-----------|----------|---------|
| ⋮          | ⋮           | ⋮         | ⋮        | ⋮       |
| 1/31/2024  | 9.722258065 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 2/29/2024  | 14.05206897 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 3/31/2024  | 4.01290323  | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 4/30/2024  | 9.200666667 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 5/31/2024  | 0.341935484 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 6/30/2024  | 2.375       | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 7/31/2024  | 0.830322581 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 8/31/2024  | 0.083548387 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 9/30/2024  | 1.493       | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 10/31/2024 | 0.837096774 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 11/30/2024 | 6.660666667 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |
| 12/31/2024 | 13.59290323 | 112.74    | -7.26    | Tengah  |

## 2. Data Train

| Barat      | Selatan   | Tengah    | Timur     | Utara      |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 13.9522581 | 14.303871 | 14.258710 | 12.241903 | 13.8977419 |
| 11.8732143 | 12.150357 | 12.170714 | 10.297500 | 11.9310714 |
| 9.4451613  | 11.212258 | 11.192903 | 8.8406452 | 9.3874194  |
| 7.6646667  | 7.384000  | 7.007000  | 5.7906667 | 7.4623333  |
| 3.7070968  | 3.871935  | 4.287742  | 3.4770968 | 3.9751613  |
| 0.4040000  | 0.249333  | 0.249667  | 0.3760000 | 0.4093333  |
| 0.0441935  | 0.038065  | 0.038387  | 0.0154839 | 0.0406452  |
| 0.2532258  | 0.269355  | 0.269677  | 0.2190323 | 0.2561290  |
| 0.0026667  | 0.0017    | 0.0016667 | 0.0130000 | 0.0033333  |
| 0.0006452  | 0         | 0         | 0         | 0.0000452  |
| 3.2330000  | 3.351667  | 3.352667  | 2.6936667 | 5.7918355  |
| 5.8887097  | 5.399355  | 5.317742  | 5.6648387 | 17.7812903 |
| 7.6958065  | 7.416774  | 7.486774  | 6.9264516 | 16.2137903 |
| 16.2608968 | 16.252607 | 16.232759 | 12.477016 | 40.6182258 |
| 6.0390323  | 6.234516  | 6.254839  | 5.6167742 | 7.2476667  |
| 7.4933333  | 7.335333  | 7.246467  | 7.0996667 | 8.8454839  |
| 8.7500000  | 9.826129  | 9.908710  | 9.4874194 | 4.8880000  |
| 4.9133333  | 4.612333  | 4.607000  | 4.6306774 | 4.4390323  |
| 4.4196774  | 4.740645  | 4.745161  | 4.3209677 | 2.1390323  |
| 2.3100000  | 2.354516  | 2.355161  | 1.9212903 | 2.1435484  |
| 4.5103333  | 4.512000  | 4.460333  | 2.9830000 | 4.4476667  |
| 8.6964516  | 9.065161  | 9.115484  | 7.4983333 | 8.7532258  |
| 5.3376667  | 5.466000  | 5.443667  | 4.4323333 | 5.3040000  |

| Barat      | Selatan   | Tengah    | Timur      | Utara      |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 10.3970968 | 9.911613  | 9.783548  | 9.0038710  | 10.1619355 |
| 13.1619355 | 13.314839 | 13.462903 | 12.5758065 | 13.4058065 |
| 9.9450000  | 9.688214  | 9.641071  | 9.4150000  | 9.8985714  |
| 6.9183871  | 6.891290  | 6.886452  | 6.7719355  | 6.9277419  |
| 6.8566667  | 7.246667  | 7.234333  | 5.7630000  | 8.6170000  |
| 4.0541935  | 3.680323  | 3.744839  | 3.7790323  | 4.1216129  |
| 2.9860000  | 2.887333  | 2.901333  | 3.4906667  | 3.0146667  |
| 1.0255806  | 1.072903  | 1.072903  | 1.1074194  | 1.0577419  |
| 0.0145161  | 0.019677  | 0.019677  | 0.1312903  | 0.0190323  |
| 0.4850000  | 0.376333  | 0.359667  | 0.2133333  | 0.4490000  |
| 2.7874194  | 2.475484  | 2.429258  | 1.4987097  | 2.8235484  |
| 9.8060000  | 9.349333  | 9.329000  | 9.6909333  | 9.7676667  |
| 11.1319355 | 10.706452 | 10.715161 | 9.8096774  | 11.1403226 |
| 9.0793548  | 8.859355  | 8.705806  | 10.7912903 | 7.1409677  |
| 14.0025000 | 15.132143 | 15.233571 | 10.5642857 | 14.0453571 |
| 9.1022903  | 9.930000  | 9.933871  | 7.9183871  | 10.2858065 |
| 4.3100000  | 4.352000  | 4.424667  | 3.1780000  | 4.3850000  |
| 4.0970968  | 4.262258  | 4.262903  | 2.6509677  | 4.2193226  |
| 2.0626667  | 2.401333  | 2.401667  | 1.5463333  | 2.0676667  |
| 0.0293548  | 0.030645  | 0.030645  | 0.0190000  | 0.0303226  |
| 0.5587097  | 0.634194  | 0.634194  | 0.7261290  | 0.5432258  |
| 0.1590000  | 0.041333  | 0.041333  | 0.0336667  | 0.1736667  |
| 0.9377097  | 0.738271  | 0.808667  | 0.3077419  | 0.2978710  |
| 5.4080000  | 5.532667  | 5.811333  | 5.4786667  | 5.5660000  |
| 9.6355484  | 10.240516 | 11.021613 | 7.5906774  | 9.2960000  |
| 15.0722581 | 14.639355 | 14.610000 | 12.7341935 | 14.0992258 |
| 17.2406935 | 18.067786 | 13.547500 | 13.4639286 | 12.2650000 |
| 8.4096774  | 7.850323  | 7.807742  | 7.3274194  | 8.8325806  |
| 8.6616667  | 9.671333  | 9.573333  | 8.5500000  | 8.4970000  |
| 0.9851613  | 0.871290  | 1.097419  | 0.4906452  | 1.2558065  |
| 0.1136667  | 0.0500000 | 0.0500000 | 0.0526667  | 0.1136667  |
| 0.0341935  | 0.0300000 | 0.0296777 | 0.0333871  | 0.0341935  |
| 0.3422581  | 0.504516  | 0.404194  | 0.3035484  | 0.3093548  |
| 0.4550000  | 0.624667  | 0.571000  | 0.3790000  | 0.4340000  |
| 0.0522581  | 0.011613  | 0.157742  | 0.0451935  | 0.0707419  |
| 0.8136667  | 0.786000  | 0.789667  | 0.6576667  | 0.8170000  |
| 5.8129032  | 5.629355  | 5.580645  | 4.6741935  | 5.7177097  |
| 11.4467742 | 10.878387 | 10.314194 | 9.5616129  | 11.1383871 |
| 14.6462097 | 14.437931 | 15.086977 | 13.7755157 | 15.0072581 |
| 9.1287097  | 10.100323 | 10.093871 | 9.6906452  | 9.1793548  |



| Barat      | Selatan    | Tengah    | Timur      | Utara      |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 10.9736667 | 11.3476667 | 11.360333 | 9.6100000  | 12.3061290 |
| 6.9148387  | 7.669032   | 7.617742  | 6.2925806  | 6.8587097  |
| 1.5520000  | 1.171000   | 1.225667  | 1.0213333  | 1.6150000  |
| 0.8629032  | 0.695161   | 0.695161  | 0.8467742  | 0.8651613  |
| 0.8274194  | 0.822581   | 0.822258  | 0.6532903  | 0.8270968  |
| 0.4460000  | 0.319000   | 0.319333  | 0.2993333  | 0.4426667  |
| 3.2245161  | 3.501935   | 3.347742  | 3.9208365  | 3.1032581  |
| 4.2633333  | 4.553333   | 4.712000  | 5.1683333  | 4.3853333  |
| 17.4945161 | 18.056774  | 17.578710 | 15.5209032 | 17.8980323 |
| 14.9816129 | 14.581290  | 14.956129 | 12.6345161 | 15.2096774 |
| 16.9085714 | 17.914643  | 17.983571 | 15.6323143 | 16.9203143 |
| 10.6554839 | 10.404516  | 10.256774 | 8.720323   | 10.5732258 |
| 3.2076667  | 3.191000   | 3.383667  | 3.440333   | 3.3916667  |
| 12.1080645 | 11.808065  | 1.807097  | 2.3787097  | 2.1209032  |
| 4.1400000  | 4.543000   | 4.541000  | 4.099667   | 4.1476667  |
| 0.2703226  | 0.302258   | 0.303023  | 0.3738710  | 0.2683548  |
| 0.3832258  | 0.284194   | 0.289032  | 0.2258065  | 0.3893548  |
| 0.2680000  | 2.434677   | 2.419000  | 2.2376667  | 2.6790000  |
| 1.9503226  | 1.184839   | 1.158387  | 1.1535484  | 1.9329032  |
| 9.9246667  | 10.540667  | 10.296767 | 10.0633333 | 9.7332000  |
| 13.2767742 | 13.717419  | 13.797097 | 13.3867742 | 13.2800000 |
| 9.9790323  | 10.203323  | 10.363548 | 9.7714935  | 10.1479032 |
| 12.2182143 | 11.081786  | 10.096071 | 11.243926  | 12.1326143 |
| 10.1454839 | 11.110000  | 11.201290 | 9.9209677  | 10.2306452 |
| 5.3926667  | 5.479333   | 5.458000  | 4.5153333  | 5.3733333  |
| 7.5806452  | 8.720645   | 8.635806  | 7.1425806  | 7.552806   |
| 4.5080000  | 4.860333   | 4.990667  | 3.9916667  | 5.1663333  |
| 2.7145161  | 2.675484   | 2.675806  | 1.8054839  | 2.7409677  |
| 0.7350000  | 0.731444   | 0.741000  | 0.6045161  | 0.8190000  |
| 2.4716667  | 2.898333   | 2.826333  | 2.0676667  | 2.3710000  |
| 2.7483871  | 2.928774   | 2.893871  | 2.1570968  | 3.7022581  |
| 9.3650000  | 9.823333   | 9.300000  | 9.9753333  | 9.4416667  |
| 9.13577419 | 17.739355  | 7.490645  | 6.8522581  | 8.79703226 |
| 9.5374194  | 9.942581   | 10.157742 | 7.9122581  | 9.8416129  |
| 16.8142857 | 17.490714  | 17.365714 | 14.3935714 | 16.7035714 |
| 6.7612903  | 6.586452   | 6.588710  | 6.4235484  | 6.8174194  |
| 8.4820000  | 9.307667   | 9.474333  | 7.2303333  | 8.5806667  |
| 2.1967742  | 1.957742   | 1.965806  | 1.4864516  | 2.2161290  |
| 0.5126667  | 0.401000   | 0.400333  | 0.5450000  | 0.5096667  |
| 2.3080645  | 1.745484   | 1.746774  | 2.0241935  | 2.3116129  |

| Barat     | Selatan   | Tengah    | Timur      | Utara      |
|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 0.0780645 | 0.052903  | 0.052903  | 0.0667742  | 0.0783871  |
| 0.0443333 | 0.031000  | 0.031000  | 0.0646667  | 0.0443333  |
| 0.0735484 | 0.054516  | 0.054194  | 0.0096774  | 0.0719355  |
| 3.5803333 | 2.410000  | 2.394000  | 2.7973333  | 3.4723333  |
| 24.714193 | 28.639355 | 28.602903 | 16.1096774 | 24.7951613 |


### 3. Data Test

| Barat   | Selatan  | Tengah   | Timur    | Utara   |
|---------|----------|----------|----------|---------|
| 9.6574  | 9.91226  | 9.72226  | 8.01516  | 9.4797  |
| 13.1803 | 13.80379 | 14.05207 | 11.49931 | 13.3848 |
| 6.6661  | 4.72935  | 4.70129  | 5.20161  | 6.6287  |
| 8.7487  | 9.16000  | 9.20067  | 7.26500  | 8.7950  |
| 0.6152  | 0.34065  | 0.34194  | 0.53907  | 0.6110  |
| 2.3280  | 2.39100  | 2.37500  | 1.50733  | 2.3190  |
| 0.8806  | 0.82258  | 0.83032  | 0.77774  | 0.8823  |
| 0.1023  | 0.07484  | 0.08355  | 0.02968  | 0.1177  |
| 1.3140  | 1.49300  | 1.49300  | 0.61267  | 1.3063  |
| 1.4681  | 1.24903  | 0.83710  | 1.22677  | 1.1271  |
| 6.2927  | 6.36367  | 6.66067  | 5.63100  | 6.5370  |
| 13.6139 | 13.51903 | 13.59290 | 12.31161 | 13.6035 |


### 4. ARIMA Plot ACF dan PACF

#### a. Plot ACF dan PACF sebelum Transformasi


##### i. Barat




ii. Selatan




iii. Tengah



iv. Timur




v. Utara




b. Plot ACF dan PACF setelah Transformasi


i. Barat




ii. Selatan




iii. Tengah



iv. Timur



v. Utara



## 5. ARIMA Estimasi Parameter Barat

### a. Tanpa Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |      | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |      | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24 | MA1          | MA2 | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     | -1.0001  |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     | 720.067  |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     | 0.999    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4775  |      |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.128    |      |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -3.735   |      |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.2223  |      |              |     | -0.7755  |
|                                   | SE        |              |     | 0.146    |      |              |     | 0.236    |
|                                   | t-value   |              |     | -1.522   |      |              |     | -3.282   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.128    |      |              |     | 0.001    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      | 0.3287       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |      | 0.211        |     | 683.267  |
|                                   | t-value   |              |     |          |      | 1.561        |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     |          |      | 0.119        |     | 0.999    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4854  |      | 0.2454       |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.144    |      | 0.176        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -3.382   |      | 1.397        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.001    |      | 0.162        |     |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.2532  |      | 0.3068       |     | -0.7806  |
|                                   | SE        |              |     | 0.186    |      | 0.183        |     | 0.253    |
|                                   | t-value   |              |     | -1.363   |      | 1.678        |     | -3.083   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.173    |      | 0.093        |     | 0.002    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1305       |     |          |      |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.119        |     |          |      |              |     |          |
|                                   | t-value   | 1.097        |     |          |      |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.272        |     |          |      |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2404       |     |          |      |              |     | -1.000   |
|                                   | SE        | 0.187        |     |          |      |              |     | 1187.201 |
|                                   | t-value   | 1.287        |     |          |      |              |     | -0.001   |
|                                   | p-value   | 0.198        |     |          |      |              |     | 0.999    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1839       |     | -0.4794  |      |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.158        |     | 0.145    |      |              |     |          |
|                                   | t-value   | 1.166        |     | -3.296   |      |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.244        |     | 0.001    |      |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2330       |     | -0.2824  |      |              |     | -0.7728  |
|                                   | SE        | 0.166        |     | 0.170    |      |              |     | 0.239    |
|                                   | t-value   | 1.400        |     | -1.658   |      |              |     | -3.240   |
|                                   | p-value   | 0.161        |     | 0.097    |      |              |     | 0.001    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4356      |     |          |      | 0.6652       |     |          |
|                                   | SE        | 0.389        |     |          |      | 0.322        |     |          |
|                                   | t-value   | -1.120       |     |          |      | 2.067        |     |          |

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2 | MA       |
|                                   | p-value   | 0.263        |     |          |         | 0.039        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.3419      |     |          |         | 0.6365       |     | -1.0001  |
|                                   | SE        | 0.448        |     |          |         | 0.356        |     | 565.752  |
|                                   | t-value   | -0.763       |     |          |         | 1.785        |     | -0.002   |
|                                   | p-value   | 0.445        |     |          |         | 0.074        |     | 0.999    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4272      |     | -0.4868  |         | 0.6750       |     |          |
|                                   | SE        | 0.508        |     | 0.147    |         | 0.406        |     |          |
|                                   | t-value   | -0.841       |     | -3.309   |         | 1.662        |     |          |
|                                   | p-value   | 0.400        |     | 0.001    |         | 0.097        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.4286      |     | -0.2521  |         | 0.7181       |     | -0.7879  |
|                                   | SE        | 0.449        |     | 0.204    |         | 0.331        |     | 0.260    |
|                                   | t-value   | -0.955       |     | -1.237   |         | 2.168        |     | -3.036   |
|                                   | p-value   | 0.339        |     | 0.216    |         | 0.030        |     | 0.002    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.2320       |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.140        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 1.652        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.099        |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2882       |     | -0.7626  | -0.5659 |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.176        |     | 0.163    | 0.107   |              |     |          |
|                                   | t-value   | 1.639        |     | -4.680   | -5.313  |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.101        |     | 0.000    | 0.000   |              |     |          |

## b. Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |      | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |      | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24 | MA1          | MA2 | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     | 4308.205 |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     | 1.000    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4577  |      |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.091    |      |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -5.036   |      |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3598  |      |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     | 0.109    |      |              |     | 1731.553 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.306   |      |              |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.001    |      |              |     | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      | 0.3670       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |      | 0.113        |     | 5015.431 |
|                                   | t-value   |              |     |          |      | 3.238        |     | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |      | 0.001        |     | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5060  |      | 0.3615       |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.088    |      | 0.109        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -5.748   |      | 3.321        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      | 0.001        |     |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3928  |      | 0.4205       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     | 0.114    |      | 0.121        |     | 1833.246 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.445   |      | 3.469        |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.001    |      | 0.001        |     | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4326       |     |          |      |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.089        |     |          |      |              |     |          |
|                                   | t-value   | 4.880        |     |          |      |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |      |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3741       |     |          |      |              |     | -1.000   |
|                                   | SE        | 0.118        |     |          |      |              |     | 6493.269 |
|                                   | t-value   | 3.157        |     |          |      |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.002        |     |          |      |              |     | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3470       |     | -0.4913  |      |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.109        |     | 0.092    |      |              |     |          |
|                                   | t-value   | 3.182        |     | -5.315   |      |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.001        |     | 0.000    |      |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3840       |     | -0.3915  |      |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.129        |     | 0.118    |      |              |     | 2921.273 |
|                                   | t-value   | 2.977        |     | -3.316   |      |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.003        |     | 0.001    |      |              |     | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.7032       |     |          |      | -0.3265      |     |          |
|                                   | SE        | 0.153        |     |          |      | 0.233        |     |          |
|                                   | t-value   | 4.590        |     |          |      | -1.401       |     |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |      | 0.161        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3677       |     |          |      | 0.0128       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.273        |     |          |      | 0.296        |     | 7076.731 |
|                                   | t-value   | 1.347        |     |          |      | 0.043        |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.178        |     |          |      | 0.966        |     | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2193       |     | -0.4961  |      | 0.1461       |     |          |
|                                   | SE        | 0.331        |     | 0.092    |      | 0.337        |     |          |



| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|----------|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal | Seasonal |          |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2      | MA       |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | t-value   | 0.663        |     | -5.387   |         | 0.434        |          |          |
|                                   | p-value   | 0.508        |     | 0.000    |         | 0.665        |          |          |
|                                   | Estimasi  | 0.1768       |     | -0.3859  |         | 0.2462       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.277        |     | 0.118    |         | 0.268        |          | 2022.150 |
|                                   | t-value   | 0.638        |     | -3.258   |         | 0.920        |          | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.524        |     | 0.001    |         | 0.358        |          | 1.0000   |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3715       |          |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.109        |          |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 3.406        |          |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.001        |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4773       |     | -0.8211  | -0.4020 |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.127        |     | 0.167    | 0.147   |              |          |          |
|                                   | t-value   | 3.761        |     | -4.919   | -2.738  |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     | 0.000    | 0.006   |              |          |          |

## 6. ARIMA Estimasi Parameter Selatan

### a. Tanpa Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |      | MA Parameter |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|------|--------------|----------|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |      | Non Seasonal | Seasonal |          |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24 | MA1          | MA2      | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |          |          |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |          |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |          |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |          |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |          | 1363.139 |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |          | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |          | 0.999    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5601  |      |              |          |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.128    |      |              |          |          |
|                                   | t-value   |              |     | -4.389   |      |              |          |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      |              |          |          |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3285  |      |              |          | -0.7504  |
|                                   | SE        |              |     | 0.141    |      |              |          | 0.224    |
|                                   | t-value   |              |     | -2.334   |      |              |          | -3.352   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.020    |      |              |          | 0.001    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      | 0.1999       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |      | 0.229        |          | 1700.248 |
|                                   | t-value   |              |     |          |      | 0.875        |          | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     |          |      | 0.382        |          | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5672  |      | 0.1131       |          |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.149    |      | 0.185        |          |          |
|                                   | t-value   |              |     | -3.804   |      | 0.612        |          |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      | 0.540        |          |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3480  |      | 0.2071       |          | -0.7746  |
|                                   | SE        |              |     | 0.1740   |      | 0.190        |          | 0.250    |
|                                   | t-value   |              |     | -2.005   |      | 1.088        |          | -3.093   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.045    |      | 0.276        |          | 0.002    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.669        |     |          |      |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.125        |     |          |      |              |          |          |
|                                   | t-value   | 0.536        |     |          |      |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.592        |     |          |      |              |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.1504       |     |          |      |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.203        |     |          |      |              |          | 1248.809 |
|                                   | t-value   | 0.741        |     |          |      |              |          | -0.001   |
|                                   | p-value   | 0.459        |     |          |      |              |          | 0.999    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.0928       |     | -0.5609  |      |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.172        |     | 0.149    |      |              |          |          |
|                                   | t-value   | 0.541        |     | -3.774   |      |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.589        |     | 0.000    |      |              |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.1742       |     | -0.3768  |      |              |          | -0.7615  |
|                                   | SE        | 0.176        |     | 0.163    |      |              |          | 0.232    |
|                                   | t-value   | 0.990        |     | -2.318   |      |              |          | -3.280   |
|                                   | p-value   | 0.322        |     | 0.020    |      |              |          | 0.001    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4540      |     |          |      | 0.5948       |          |          |
|                                   | SE        | 0.653        |     |          |      | 0.5962       |          |          |
|                                   | t-value   | -0.696       |     |          |      | 0.998        |          |          |
|                                   | p-value   | 0.487        |     |          |      | 0.318        |          |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.3716      |     |          |      | 0.5557       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.726        |     |          |      | 0.674        |          | 1652.656 |
|                                   | t-value   | -0.512       |     |          |      | 0.825        |          | -0.001   |
|                                   | p-value   | 0.609        |     |          |      | 0.410        |          | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.5225      |     | -0.5712  |      | 0.6614       |          |          |
|                                   | SE        | 0.837        |     | 0.156    |      | 0.739        |          |          |
|                                   | t-value   | -0.625       |     | -3.671   |      | 0.894        |          |          |
|                                   | p-value   | 0.532        |     | 0.000    |      | 0.371        |          |          |

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2 | MA       |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.4681      |     | -0.3482  |         | 0.6729       |     | -0.7780  |
|                                   | SE        | 0.619        |     | 0.188    |         | 0.512        |     | 0.255    |
|                                   | t-value   | -0.757       |     | -1.848   |         | 1.315        |     | -3.047   |
|                                   | p-value   | 0.449        |     | 0.065    |         | 0.188        |     | 0.002    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.1276       |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.143        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 0.894        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.371        |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2410       |     | -0.8984  | -0.6420 |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.168        |     | 0.141    | 0.112   |              |     |          |
|                                   | t-value   | 1.439        |     | -6.357   | -5.728  |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.150        |     | 0.000    | 0.000   |              |     |          |

## b. Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |      | MA Parameter |     |           |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|------|--------------|-----|-----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |      | Non Seasonal |     | Seasonal  |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24 | MA1          | MA2 | MA        |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     |           |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     |           |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     |           |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     |           |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     | -1.0000   |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     | 9121.468  |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     | -0.000    |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     | 1.000     |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4906  |      |              |     |           |
|                                   | SE        |              |     | 0.087    |      |              |     |           |
|                                   | t-value   |              |     | -5.658   |      |              |     |           |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      |              |     |           |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3953  |      |              |     | -1.000    |
|                                   | SE        |              |     | 0.104    |      |              |     | 3243.976  |
|                                   | t-value   |              |     | -3.797   |      |              |     | -0.000    |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      |              |     | 1.000     |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      | 0.2885       |     | -1.0000   |
|                                   | SE        |              |     |          |      | 0.117        |     | 2.39e+04  |
|                                   | t-value   |              |     |          |      | 2.471        |     | -4.19e-05 |
|                                   | p-value   |              |     |          |      | 0.013        |     | 1.000     |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5328  |      | 0.2858       |     |           |
|                                   | SE        |              |     | 0.086    |      | 0.111        |     |           |
|                                   | t-value   |              |     | -6.187   |      | 2.586        |     |           |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      | 0.010        |     |           |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4215  |      | 0.3383       |     | -1.0000   |
|                                   | SE        |              |     | 0.109    |      | 0.134        |     | 1907.989  |
|                                   | t-value   |              |     | -3.877   |      | 2.526        |     | -0.001    |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      | 0.012        |     | 1.000     |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3739       |     |          |      |              |     |           |
|                                   | SE        | 0.092        |     |          |      |              |     |           |
|                                   | t-value   | 4.053        |     |          |      |              |     |           |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |      |              |     |           |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3068       |     |          |      |              |     | -1.000    |
|                                   | SE        | 0.112        |     |          |      |              |     | 4894.193  |
|                                   | t-value   | 2.728        |     |          |      |              |     | -0.000    |
|                                   | p-value   | 0.006        |     |          |      |              |     | 1.000     |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2882       |     | -0.5254  |      |              |     |           |
|                                   | SE        | 0.107        |     | 0.089    |      |              |     |           |
|                                   | t-value   | 2.693        |     | -5.880   |      |              |     |           |
|                                   | p-value   | 0.007        |     | 0.000    |      |              |     |           |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3285       |     | -0.4249  |      |              |     | -1.0000   |
|                                   | SE        | 0.128        |     | 0.111    |      |              |     | 3160.155  |
|                                   | t-value   | 2.574        |     | -3.835   |      |              |     | -0.000    |
|                                   | p-value   | 0.010        |     | 0.000    |      |              |     | 1.000     |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.6981       |     |          |      | -0.3735      |     |           |
|                                   | SE        | 0.172        |     |          |      | 0.243        |     |           |
|                                   | t-value   | 4.058        |     |          |      | -1.534       |     |           |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |      | 0.125        |     |           |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.4137       |     |          |      | -0.1153      |     | -1.0000   |
|                                   | SE        | 0.322        |     |          |      | 0.375        |     | 5.11e+05  |
|                                   | t-value   | 1.284        |     |          |      | -0.308       |     | -1.96e-06 |
|                                   | p-value   | 0.199        |     |          |      | -0.758       |     | 1.000     |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2318       |     | -0.5268  |      | 0.0624       |     |           |
|                                   | SE        | 0.406        |     | 0.089    |      | 0.428        |     |           |
|                                   | t-value   | 0.571        |     | -5.915   |      | 0.146        |     |           |
|                                   | p-value   | 0.0568       |     | 0.000    |      | 0.884        |     |           |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2399       |     | -0.4160  |      | 0.1046       |     | -1.0000   |
|                                   | SE        | 0.331        |     | 0.113    |      | 0.361        |     | 4733.994  |
|                                   | t-value   | 0.725        |     | -3.693   |      | 0.289        |     | -0.000    |
|                                   | p-value   | 0.469        |     | 0.000    |      | 0.772        |     | 1.0000    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      | 0.3024       |     |           |
|                                   | t-value   |              |     |          |      | 2.751        |     |           |

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2 | MA       |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.006        |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4099       |     | -0.8824  | -0.4082 |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.125        |     | 0.156    | 0.138   |              |     |          |
|                                   | t-value   | 3.279        |     | -5.669   | -2.948  |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.001        |     | 0.000    | 0.003   |              |     |          |

## 7. ARIMA Estimasi Parameter Tengah

### a. Tanpa Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2 | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         |              |     | 1433.210 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |     | 0.999    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5720  |         |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.124    |         |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -4.596   |         |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3385  |         |              |     | -0.7565  |
|                                   | SE        |              |     | 0.138    |         |              |     | 0.234    |
|                                   | t-value   |              |     | -2.452   |         |              |     | -3.237   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.014    |         |              |     | 0.001    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.2176       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.227        |     | 1098.050 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 0.961        |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.337        |     | 0.999    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5809  |         | 0.1279       |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.149    |         | 0.190        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -3.892   |         | 0.673        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.501        |     |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3635  |         | 0.2308       |     | -0.7849  |
|                                   | SE        |              |     | 0.169    |         | 0.187        |     | 0.266    |
|                                   | t-value   |              |     | -2.156   |         | 1.231        |     | -2.950   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.031    |         | 0.218        |     | 0.003    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.0722       |     |          |         |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.124        |     |          |         |              |     |          |
|                                   | t-value   | 0.583        |     |          |         |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.560        |     |          |         |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.1617       |     |          |         |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.200        |     |          |         |              |     | 1444.310 |
|                                   | t-value   | 0.808        |     |          |         |              |     | -0.001   |
|                                   | p-value   | 0.419        |     |          |         |              |     | 0.999    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1046       |     | -0.5738  |         |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.177        |     | 0.149    |         |              |     |          |
|                                   | t-value   | 0.592        |     | -3.861   |         |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.554        |     | 0.000    |         |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.1965       |     | -0.3963  |         |              |     | -0.7716  |
|                                   | SE        | 0.176        |     | 0.159    |         |              |     | 0.245    |
|                                   | t-value   | 1.113        |     | -2.499   |         |              |     | -3.150   |
|                                   | p-value   | 0.266        |     | 0.012    |         |              |     | 0.002    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4551      |     |          |         | 0.6118       |     |          |
|                                   | SE        | 0.599        |     |          |         | 0.543        |     |          |
|                                   | t-value   | -0.760       |     |          |         | 1.128        |     |          |
|                                   | p-value   | 0.447        |     |          |         | 0.259        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.3533      |     |          |         | 0.5535       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.696        |     |          |         | 0.645        |     | 1810.836 |
|                                   | t-value   | -0.507       |     |          |         | 0.858        |     | -0.001   |
|                                   | p-value   | 0.612        |     |          |         | 0.391        |     | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4996      |     | -0.5807  |         | 0.6492       |     |          |
|                                   | SE        | 0.833        |     | 0.156    |         | 0.736        |     |          |
|                                   | t-value   | -0.600       |     | -3.733   |         | 0.881        |     |          |
|                                   | p-value   | 0.548        |     | 0.000    |         | 0.378        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.4128      |     | -0.3570  |         | 0.6363       |     | -0.7872  |
|                                   | SE        | 0.629        |     | 0.185    |         | 0.527        |     | 0.272    |
|                                   | t-value   | -0.656       |     | -1.925   |         | 1.207        |     | -2.896   |
|                                   | p-value   | 0.512        |     | 0.054    |         | 0.227        |     | 0.004    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.1412       |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.143        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 0.990        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.322        |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2568       |     | -0.9200  | -0.6440 |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.163        |     | 0.137    | 0.113   |              |     |          |

| Model | Statistik | AR Parameter |     |          |        | MA Parameter |          |    |
|-------|-----------|--------------|-----|----------|--------|--------------|----------|----|
|       |           | Non Seasonal |     | Seasonal |        | Non Seasonal | Seasonal |    |
|       |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24   | MA1          | MA2      | MA |
|       | t-value   | 1.577        |     | -6.718   | -5.688 |              |          |    |
|       | p-value   | 0.115        |     | 0.000    | 0.000  |              |          |    |

## b. Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|----------|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal | Seasonal |          |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2      | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         |              |          |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         |              |          |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |          |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |          |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         |              |          | 1601.479 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |          | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |          | 1.000    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4653  |         |              |          |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.086    |         |              |          |          |
|                                   | t-value   |              |     | -5.429   |         |              |          |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         |              |          |          |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3862  |         |              |          | -1.000   |
|                                   | SE        |              |     | 0.104    |         |              |          | 2989.853 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.720   |         |              |          | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         |              |          | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3068       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.114        |          | 3754.304 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 2.694        |          | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.007        |          | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4979  |         | 0.2809       |          |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.086    |         | 0.108        |          |          |
|                                   | t-value   |              |     | -5.769   |         | 2.600        |          |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.009        |          |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3994  |         | 0.3337       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     | 0.112    |         | 0.135        |          | 1766.312 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.558   |         | 2.468        |          | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.014        |          | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3889       |     |          |         |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.091        |     |          |         |              |          |          |
|                                   | t-value   | 4.276        |     |          |         |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |         |              |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3105       |     |          |         |              |          | -1.000   |
|                                   | SE        | 0.111        |     |          |         |              |          | 3858.451 |
|                                   | t-value   | 2.808        |     |          |         |              |          | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.005        |     |          |         |              |          | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2767       |     | -0.4908  |         |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.105        |     | 0.089    |         |              |          |          |
|                                   | t-value   | 2.631        |     | -5.503   |         |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.009        |     | 0.000    |         |              |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3204       |     | -0.4078  |         |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.127        |     | 0.114    |         |              |          | 3610.869 |
|                                   | t-value   | 2.518        |     | -3.582   |         |              |          | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.012        |     | 0.000    |         |              |          | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.6795       |     |          |         | -0.3401      |          |          |
|                                   | SE        | 0.178        |     |          |         | 0.260        |          |          |
|                                   | t-value   | 3.815        |     |          |         | -1.308       |          |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |         | 0.191        |          |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3100       |     |          |         | 0.0070       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.334        |     |          |         | 0.365        |          | 1.76e+04 |
|                                   | t-value   | 0.929        |     |          |         | 0.019        |          | -5.7e-05 |
|                                   | p-value   | 0.353        |     |          |         | 0.985        |          | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1887       |     | -0.4920  |         | 0.0960       |          |          |
|                                   | SE        | 0.428        |     | 0.089    |         | 0.444        |          |          |
|                                   | t-value   | 0.441        |     | -5.515   |         | 0.216        |          |          |
|                                   | p-value   | 0.659        |     | 0.000    |         | 0.829        |          |          |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2540       |     | -0.3959  |         | 0.0806       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.337        |     | 0.116    |         | 0.377        |          | 4262.632 |
|                                   | t-value   | 0.753        |     | -3.409   |         | 0.214        |          | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.451        |     | 0.001    |         | 0.831        |          | 1.0000   |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3323       |          |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.110        |          |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 3.019        |          |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.003        |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4438       |     | -0.8717  | -0.4828 |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.122        |     | 0.156    | 0.151   |              |          |          |
|                                   | t-value   | 3.642        |     | -5.584   | -3.192  |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     | 0.000    | 0.001   |              |          |          |

## 8. ARIMA Estimasi Parameter Timur

a. Tanpa Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2 | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         |              |     | 2708.317 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |     | 1.000    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4072  |         |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.105    |         |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -3.871   |         |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.1556  |         |              |     | -1.0001  |
|                                   | SE        |              |     | 0.108    |         |              |     | 963.221  |
|                                   | t-value   |              |     | -1.444   |         |              |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.149    |         |              |     | 0.999    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3015       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.140        |     | 2497.145 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 2.162        |     | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.031        |     | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4256  |         | 0.2711       |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.114    |         | 0.148        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -3.732   |         | 1.826        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.068        |     |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.2007  |         | 0.2677       |     | -1.0001  |
|                                   | SE        |              |     | 0.120    |         | 0.134        |     | 380.423  |
|                                   | t-value   |              |     | -1.677   |         | 1.995        |     | -0.003   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.094    |         | 0.046        |     | 0.998    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1479       |     |          |         |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.096        |     |          |         |              |     |          |
|                                   | t-value   | 1.537        |     |          |         |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.124        |     |          |         |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2835       |     |          |         |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.126        |     |          |         |              |     | 3518.174 |
|                                   | t-value   | 2.249        |     |          |         |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.024        |     |          |         |              |     | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2370       |     | -0.4266  |         |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.128        |     | 0.113    |         |              |     |          |
|                                   | t-value   | 1.845        |     | -3.790   |         |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.065        |     | 0.000    |         |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2499       |     | -0.2127  |         |              |     | -1.0001  |
|                                   | SE        | 0.131        |     | 0.119    |         |              |     | 374.919  |
|                                   | t-value   | -1.908       |     | -1.787   |         |              |     | -0.003   |
|                                   | p-value   | 0.056        |     | 0.074    |         |              |     | 0.998    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4344      |     |          |         | 0.6304       |     |          |
|                                   | SE        | 0.425        |     |          |         | 0.384        |     |          |
|                                   | t-value   | -1.022       |     |          |         | 1.640        |     |          |
|                                   | p-value   | 0.307        |     |          |         | 0.101        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.3007      |     |          |         | 0.5801       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.398        |     |          |         | 0.357        |     | 5046.194 |
|                                   | t-value   | -0.755       |     |          |         | 1.623        |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.450        |     |          |         | 0.105        |     | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.3447      |     | -0.4284  |         | 0.6090       |     |          |
|                                   | SE        | 0.454        |     | 0.116    |         | 0.389        |     |          |
|                                   | t-value   | -0.759       |     | -3.689   |         | 1.565        |     |          |
|                                   | p-value   | 0.448        |     | 0.000    |         | 0.118        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.2718      |     | -0.1929  |         | 0.5303       |     | -1.0001  |
|                                   | SE        | 0.472        |     | 0.132    |         | 0.403        |     | 560.759  |
|                                   | t-value   | -0.576       |     | -1.459   |         | 1.315        |     | -0.002   |
|                                   | p-value   | 0.565        |     | -0.452   |         | 0.189        |     | 0.999    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.2047       |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.118        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 1.732        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.083        |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.2945       |     | -0.6657  | -0.4762 |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.138        |     | 0.120    | 0.100   |              |     |          |
|                                   | t-value   | 2.131        |     | -5.571   | -4.758  |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.033        |     | 0.000    | 0.000   |              |     |          |

b. Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |      | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |      | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24 | MA1          | MA2 | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     |          |

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|----------|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal | Seasonal |          |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2      | MA       |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |          |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         |              |          | 4409.547 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |          | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |          | 1.000    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4754  |         |              |          |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.085    |         |              |          |          |
|                                   | t-value   |              |     | -5.607   |         |              |          |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         |              |          |          |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3677  |         |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     | 0.113    |         |              |          | 3444.686 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.268   |         |              |          | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.001    |         |              |          | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3757       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.129        |          | 4169.989 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 2.903        |          | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.004        |          | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5613  |         | 0.4197       |          |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.080    |         | 0.115        |          |          |
|                                   | t-value   |              |     | -7.022   |         | 3.635        |          |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.000        |          |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4551  |         | 0.4774       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     | 0.116    |         | 0.125        |          | 2855.887 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.919   |         | 3.825        |          | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.000        |          | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3822       |     |          |         |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.090        |     |          |         |              |          |          |
|                                   | t-value   | 4.255        |     |          |         |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |         |              |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3797       |     |          |         |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.127        |     |          |         |              |          | 6342.783 |
|                                   | t-value   | 3.000        |     |          |         |              |          | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.003        |     |          |         |              |          | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3761       |     | -0.5439  |         |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.112        |     | 0.081    |         |              |          |          |
|                                   | t-value   | 3.364        |     | -6.689   |         |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.001        |     | 0.000    |         |              |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.4163       |     | -0.4400  |         |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.151        |     | 0.116    |         |              |          | 3076.504 |
|                                   | t-value   | 2.764        |     | -3.781   |         |              |          | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.006        |     | 0.000    |         |              |          | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.7288       |     |          |         | -0.4088      |          |          |
|                                   | SE        | 0.170        |     |          |         | 0.249        |          |          |
|                                   | t-value   | 4.279        |     |          |         | -1.642       |          |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |         | 0.101        |          |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3845       |     |          |         | -0.0066      |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.288        |     |          |         | 0.317        |          | 1583.677 |
|                                   | t-value   | 1.337        |     |          |         | -0.021       |          | -0.001   |
|                                   | p-value   | 0.181        |     |          |         | 0.983        |          | 0.999    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.2965      |     | -0.5834  |         | 0.7107       |          |          |
|                                   | SE        | 0.234        |     | 0.085    |         | 0.188        |          |          |
|                                   | t-value   | -1.268       |     | -6.896   |         | 3.778        |          |          |
|                                   | p-value   | 0.205        |     | 0.000    |         | 0.000        |          |          |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.2020      |     | -0.4674  |         | 0.6726       |          | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.300        |     | 0.115    |         | 0.188        |          | 2314.164 |
|                                   | t-value   | -0.674       |     | -4.054   |         | 3.583        |          | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.500        |     | 0.000    |         | 0.000        |          | 1.0000   |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3334       |          |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.108        |          |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 3.096        |          |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.002        |          |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4341       |     | -0.8649  | -0.3188 |              |          |          |
|                                   | SE        | 0.138        |     | 0.170    | 0.153   |              |          |          |
|                                   | t-value   | 3.137        |     | -5.074   | -2.085  |              |          |          |
|                                   | p-value   | 0.002        |     | 0.000    | 0.037   |              |          |          |

## 9. ARIMA Estimasi Parameter Utara

### a. Tanpa Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |      | MA Parameter |          |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|------|--------------|----------|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |      | Non Seasonal | Seasonal |          |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24 | MA1          | MA2      | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |          |          |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |          |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |          |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |          |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |          | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |          | 1302.960 |

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |     |           |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|-----|-----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal |     | Seasonal  |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2 | MA        |
|                                   | t-value   |              |     |          |         |              |     | -0.001    |
|                                   | p-value   |              |     |          |         |              |     | 0.999     |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4900  |         |              |     |           |
|                                   | SE        |              |     | 0.124    |         |              |     |           |
|                                   | t-value   |              |     | -3.938   |         |              |     |           |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         |              |     |           |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.2348  |         |              |     | -0.7852   |
|                                   | SE        |              |     | 0.143    |         |              |     | 0.252     |
|                                   | t-value   |              |     | -1.645   |         |              |     | -3.113    |
|                                   | p-value   |              |     | 0.100    |         |              |     | 0.002     |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3517       |     | -1.0000   |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.215        |     | 1259.476  |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 1.636        |     | -0.001    |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.102        |     | 0.999     |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.5003  |         | 0.2634       |     |           |
|                                   | SE        |              |     | 0.143    |         | 0.180        |     |           |
|                                   | t-value   |              |     | -3.492   |         | 1.460        |     |           |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.144        |     |           |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.2752  |         | 0.3400       |     | -0.7953   |
|                                   | SE        |              |     | 0.181    |         | 0.183        |     | 0.274     |
|                                   | t-value   |              |     | -1.516   |         | 1.859        |     | -2.897    |
|                                   | p-value   |              |     | 0.129    |         | 0.063        |     | 0.004     |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1330       |     |          |         |              |     |           |
|                                   | SE        | 0.118        |     |          |         |              |     |           |
|                                   | t-value   | 1.122        |     |          |         |              |     |           |
|                                   | p-value   | 0.262        |     |          |         |              |     |           |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2524       |     |          |         |              |     | -1.0000   |
|                                   | SE        | 0.187        |     |          |         |              |     | 1.24e+04  |
|                                   | t-value   | 1.347        |     |          |         |              |     | -8.07e-05 |
|                                   | p-value   | 0.178        |     |          |         |              |     | 1.000     |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1940       |     | -0.4937  |         |              |     |           |
|                                   | SE        | 0.162        |     | 0.145    |         |              |     |           |
|                                   | t-value   | 1.198        |     | -3.408   |         |              |     |           |
|                                   | p-value   | 0.231        |     | 0.001    |         |              |     |           |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.2564       |     | -0.3069  |         |              |     | -0.7869   |
|                                   | SE        | 0.167        |     | 0.166    |         |              |     | 0.256     |
|                                   | t-value   | 1.538        |     | -1.843   |         |              |     | -3.069    |
|                                   | p-value   | 0.124        |     | 0.065    |         |              |     | 0.002     |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4265      |     |          |         | 0.6689       |     |           |
|                                   | SE        | 0.379        |     |          |         | 0.315        |     |           |
|                                   | t-value   | -1.127       |     |          |         | 2.122        |     |           |
|                                   | p-value   | 0.260        |     |          |         | 0.034        |     |           |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.3105      |     |          |         | 0.6246       |     | -1.0001   |
|                                   | SE        | 0.441        |     |          |         | 0.350        |     | 493.351   |
|                                   | t-value   | -0.704       |     |          |         | 1.785        |     | -0.002    |
|                                   | p-value   | 0.482        |     |          |         | 0.074        |     | 0.998     |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | -0.4027      |     | -0.4978  |         | 0.6650       |     |           |
|                                   | SE        | 0.510        |     | 0.148    |         | 0.409        |     |           |
|                                   | t-value   | -0.790       |     | -3.364   |         | 1.626        |     |           |
|                                   | p-value   | 0.430        |     | 0.001    |         | 0.104        |     |           |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | -0.3804      |     | -0.2686  |         | 0.6969       |     | -0.8025   |
|                                   | SE        | 0.444        |     | 0.204    |         | 0.327        |     | 0.284     |
|                                   | t-value   | -0.856       |     | -1.318   |         | 2.133        |     | -2.831    |
|                                   | p-value   | 0.392        |     | 0.187    |         | 0.033        |     | 0.005     |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.2467       |     |           |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.141        |     |           |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 1.754        |     |           |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.079        |     |           |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3093       |     | -0.7918  | -0.5803 |              |     |           |
|                                   | SE        | 0.170        |     | 0.157    | 0.106   |              |     |           |
|                                   | t-value   | 1.816        |     | -5.033   | -5.457  |              |     |           |
|                                   | p-value   | 0.069        |     | 0.000    | 0.000   |              |     |           |

## b. Transformasi

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |      | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |      | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24 | MA1          | MA2 | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     |          |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |      |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |      |              |     | 4443.846 |
|                                   | t-value   |              |     |          |      |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |      |              |     | 1.000    |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4487  |      |              |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.090    |      |              |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -4.963   |      |              |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |      |              |     |          |

| Model                             | Statistik | AR Parameter |     |          |         | MA Parameter |     |          |
|-----------------------------------|-----------|--------------|-----|----------|---------|--------------|-----|----------|
|                                   |           | Non Seasonal |     | Seasonal |         | Non Seasonal |     | Seasonal |
|                                   |           | AR1          | AR2 | AR12     | AR24    | MA1          | MA2 | MA       |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3574  |         |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     | 0.108    |         |              |     | 2727.662 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.321   |         |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.001    |         |              |     | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3792       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.112        |     | 5532.394 |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 3.400        |     | -0.000   |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.001        |     | 1.000    |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.4912  |         | 0.3613       |     |          |
|                                   | SE        |              |     | 0.089    |         | 0.108        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     | -5.549   |         | 3.342        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     | 0.000    |         | 0.001        |     |          |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  |              |     | -0.3846  |         | 0.4254       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        |              |     | 0.115    |         | 0.123        |     | 1970.551 |
|                                   | t-value   |              |     | -3.335   |         | 3.471        |     | -0.001   |
|                                   | p-value   |              |     | 0.001    |         | 0.001        |     | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4391       |     |          |         |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.088        |     |          |         |              |     |          |
|                                   | t-value   | 5.017        |     |          |         |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |         |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3753       |     |          |         |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.116        |     |          |         |              |     | 9700.163 |
|                                   | t-value   | 3.226        |     |          |         |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.001        |     |          |         |              |     | 1.000    |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.3419       |     | -0.4767  |         |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.108        |     | 0.092    |         |              |     |          |
|                                   | t-value   | 3.164        |     | -5.174   |         |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.002        |     | 0.000    |         |              |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3821       |     | -0.3862  |         |              |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.127        |     | 0.118    |         |              |     | 3840.943 |
|                                   | t-value   | 3.003        |     | -3.268   |         |              |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.003        |     | 0.001    |         |              |     | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.6932       |     |          |         | -0.3087      |     |          |
|                                   | SE        | 0.155        |     |          |         | 0.239        |     |          |
|                                   | t-value   | 4.465        |     |          |         | -1.289       |     |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     |          |         | 0.197        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.3105       |     |          |         | 0.0823       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.276        |     |          |         | 0.289        |     | 5078.294 |
|                                   | t-value   | 1.125        |     |          |         | 0.285        |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.260        |     |          |         | 0.775        |     | 1.000    |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.1677       |     | -0.4820  |         | 0.1967       |     |          |
|                                   | SE        | 0.340        |     | 0.093    |         | 0.340        |     |          |
|                                   | t-value   | 0.494        |     | -5.209   |         | 0.579        |     |          |
|                                   | p-value   | 0.621        |     | 0.000    |         | 0.563        |     |          |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | Estimasi  | 0.1215       |     | -0.3801  |         | 0.3056       |     | -1.0000  |
|                                   | SE        | 0.278        |     | 0.119    |         | 0.261        |     | 2036.492 |
|                                   | t-value   | 0.437        |     | -3.200   |         | 1.171        |     | -0.000   |
|                                   | p-value   | 0.662        |     | 0.001    |         | 0.241        |     | 1.0000   |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  |              |     |          |         | 0.3874       |     |          |
|                                   | SE        |              |     |          |         | 0.109        |     |          |
|                                   | t-value   |              |     |          |         | 3.569        |     |          |
|                                   | p-value   |              |     |          |         | 0.000        |     |          |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | Estimasi  | 0.4967       |     | -0.8193  | -0.4393 |              |     |          |
|                                   | SE        | 0.123        |     | 0.163    | 0.150   |              |     |          |
|                                   | t-value   | 4.039        |     | -5.015   | -2.929  |              |     |          |
|                                   | p-value   | 0.000        |     | 0.000    | 0.003   |              |     |          |

## 10. Hasil Evaluasi ARIMA

### a. Tanpa Transformasi

| Model                             | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-----------------------------------|-------|---------|--------|-------|-------|
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 3.597 | 4.764   | 4.730  | 1.768 | 3.611 |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 1.559 | 1.905   | 1.971  | 1.746 | 1.641 |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 1.971 | 2.534   | 2.575  | 1.529 | 1.986 |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 1.837 | 2.631   | 2.749  | 1.924 | 1.962 |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 3.754 | 4.832   | 4.837  | 1.862 | 3.843 |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 2.446 | 2.432   | 2.582  | 2.094 | 2.646 |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 2.243 | 2.621   | 2.715  | 1.768 | 2.366 |



| Model                             | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-----------------------------------|-------|---------|--------|-------|-------|
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 2.617 | 3.133   | 3.351  | 2.285 | 2.887 |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 3.662 | 4.788   | 4.769  | 1.835 | 3.703 |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 2.201 | 2.278   | 2.392  | 2.095 | 2.342 |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 2.143 | 2.590   | 2.664  | 1.735 | 2.216 |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 2.491 | 3.141   | 3.365  | 2.284 | 2.731 |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 3.670 | 4.814   | 4.841  | 1.795 | 3.769 |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 2.403 | 2.524   | 2.666  | 2.098 | 2.585 |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 2.358 | 2.992   | 3.026  | 1.814 | 2.494 |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 2.726 | 3.388   | 3.527  | 2.292 | 2.946 |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | 2.734 | 3.272   | 3.408  | 2.067 | 2.894 |

b. Transformasi

| Model                             | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-----------------------------------|-------|---------|--------|-------|-------|
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 5.613 | 5.311   | 5.140  | 4.975 | 5.598 |
| $(0, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 6.380 | 6.416   | 6.461  | 5.458 | 6.407 |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 6.328 | 6.353   | 6.204  | 5.562 | 6.342 |
| $(0, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 6.566 | 6.673   | 6.528  | 5.606 | 6.600 |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 5.400 | 5.039   | 4.829  | 4.829 | 5.361 |
| $(0, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 6.252 | 6.276   | 6.307  | 5.370 | 6.269 |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 6.209 | 6.236   | 6.121  | 5.470 | 6.215 |
| $(0, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 6.418 | 6.525   | 6.366  | 5.568 | 6.447 |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 5.082 | 4.680   | 4.434  | 4.643 | 5.016 |
| $(1, 0, 0) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 6.132 | 6.180   | 6.225  | 5.285 | 6.149 |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 6.124 | 6.175   | 6.074  | 5.419 | 6.129 |
| $(1, 0, 0) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 6.396 | 6.523   | 6.405  | 5.556 | 6.427 |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 0)_{12}$ | 5.224 | 4.894   | 4.632  | 4.879 | 5.144 |
| $(1, 0, 1) \times (0, 1, 1)_{12}$ | 6.171 | 6.221   | 6.252  | 5.320 | 6.189 |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 0)_{12}$ | 6.139 | 6.178   | 6.078  | 5.545 | 6.155 |
| $(1, 0, 1) \times (1, 1, 1)_{12}$ | 6.386 | 6.502   | 6.384  | 5.614 | 6.423 |
| $(1, 0, 0) \times (2, 1, 0)_{12}$ | 6.314 | 6.411   | 6.286  | 5.572 | 6.303 |

11. STARIMA Estimasi Parameter Uniform

a. SLAG 0

| Model | Statistik | AR Parameter   |             |             | MA Parameter          |                 |               |
|-------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$ | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$         | $\Theta_{20}$   | $\Theta_{30}$ |
| 0,1,1 | Estimasi  |                |             |             | 0.4146                |                 |               |
|       | SE        |                |             |             | 0.0488                |                 |               |
|       | t-value   |                |             |             | 8.5                   |                 |               |
|       | p-value   |                |             |             | 0.0000000000000000024 |                 |               |
| 0,1,2 | Estimasi  |                |             |             | 0.4233                | 0.2529          |               |
|       | SE        |                |             |             |                       | 0.0567          | 0.0567        |
|       | t-value   |                |             |             | 7.46                  | 4.4             |               |
|       | p-value   |                |             |             | 0.0000000000000041    | 0.0000100433899 |               |

| Model | Statistik | AR Parameter        |             |             | MA Parameter  |               |               |
|-------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$      | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$ | $\Theta_{20}$ | $\Theta_{30}$ |
| 0,1,3 | Estimasi  |                     |             |             | 0.3264        | 0.1254        | 0.3128        |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0782        | 0.0773        | 0.0809        |
|       | t-value   |                     |             |             | 4.18          | 1.62          | 3.87          |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.000035      | 0.10545       | 0.00013       |
| 1,1,0 | Estimasi  | 0.4812              |             |             |               |               |               |
|       | SE        | 0.0435              |             |             |               |               |               |
|       | t-value   | 11.1                |             |             |               |               |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000002 |             |             |               |               |               |
| 1,1,1 | Estimasi  | 0.5747              |             |             | -0.1557       |               |               |
|       | SE        | 0.0685              |             |             | 0.0853        |               |               |
|       | t-value   | 8.39                |             |             | -1.83         |               |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000056 |             |             | 0.069         |               |               |
| 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760              |             |             | -0.2765       | -0.1313       |               |
|       | SE        | 0.088               |             |             | 0.1082        | 0.076         |               |
|       | t-value   | 7.62                |             |             | -2.56         | -1.71         |               |
|       | p-value   | 0.000000000000014   |             |             | 0.011         | 0.087         |               |
| 1,1,3 | Estimasi  | 0.7062              |             |             | -0.3879       | -0.1225       | 0.1323        |
|       | SE        | 0.0710              |             |             | 0.0916        | 0.0655        | 0.0643        |
|       | t-value   | 9.95                |             |             | -4.23         | -1.87         | 2.06          |
|       | p-value   | 0.00000000000000002 |             |             | 0.00028       | 0.062         | 0.040         |
| 2,1,0 | Estimasi  | 0.4263              | 0.1174      |             |               |               |               |
|       | SE        | 0.0541              | 0.0543      |             |               |               |               |
|       | t-value   | 7.88                | 2.16        |             |               |               |               |
|       | p-value   | 0.000000000000022   | 0.031       |             |               |               |               |
| 2,1,1 | Estimasi  | 0.7667              | -0.0833     |             | -0.4249       |               |               |
|       | SE        | 0.1323              | 0.0902      |             | 0.1496        |               |               |
|       | t-value   | 5.80                | -0.92       |             | -2.84         |               |               |
|       | p-value   | 0.000000012         | 0.3563      |             | 0.0047        |               |               |
| 2,1,2 | Estimasi  | 0.6827              | 0.0198      |             | -0.3489       | -0.0782       |               |
|       | SE        | 0.1972              | 0.1885      |             | 0.2213        | 0.1605        |               |
|       | t-value   | 3.46                | 0.11        |             | -1.58         | -0.49         |               |
|       | p-value   | 0.00058             | 0.91628     |             | 0.11560       | 0.62644       |               |
| 2,1,3 | Estimasi  | 0.7405              | -0.082      |             | -0.4099       | -0.0209       | 0.0613        |
|       | SE        | 0.2062              | 0.2061      |             | 0.2315        | 0.1660        | 0.0980        |
|       | t-value   | 3.59                | -0.33       |             | -1.77         | -0.13         | 0.63          |
|       | p-value   | 0.00036             | 0.74103     |             | 0.07728       | 0.89991       | 0.53188       |
| 3,1,0 | Estimasi  | 0.4068              | 0.0586      | 0.1400      |               |               |               |
|       | SE        | 0.0643              | 0.0687      | 0.0669      |               |               |               |
|       | t-value   | 6.33                | 0.85        | 2.09        |               |               |               |
|       | p-value   | 0.000000000057      | 0.394       | 0.037       |               |               |               |
| 3,1,1 | Estimasi  | 0.6487              | -0.0797     | 0.1132      | -0.3160       |               |               |
|       | SE        | 0.1401              | 0.0993      | 0.0690      | 0.1621        |               |               |
|       | t-value   | 4.63                | -0.80       | 1.64        | -1.95         |               |               |
|       | p-value   | 0.0000047           | 0.423       | 0.102       | 0.052         |               |               |
| 3,1,2 | Estimasi  | 0.7800              | -0.2580     | 0.1440      | -0.4770       | 0.7130        |               |
|       | SE        | 0.2500              | 0.3060      | 0.1470      | 0.2870        | 0.2760        |               |
|       | t-value   | 3.12                | -0.84       | 0.98        | -1.66         | 0.63          |               |
|       | p-value   | 0.0019              | 0.3999      | 0.3271      | 0.0976        | 0.5308        |               |
| 3,1,3 | Estimasi  | 0.6254              | -0.1727     | 0.2167      | -0.2859       | 0.1348        | -0.0926       |
|       | SE        | 0.2891              | 0.3642      | 0.2789      | 0.3324        | 0.3447        | 0.2353        |
|       | t-value   | 2.16                | -0.47       | 0.77        | -0.86         | 0.39          | -0.39         |
|       | p-value   | 0.031               | 0.636       | 0.439       | 0.390         | 0.696         | 0.694         |

## b. SLAG 1

| Model | Statistik | AR Parameter        |             |             | MA Parameter        |                 |               |
|-------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$      | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$       | $\Theta_{20}$   | $\Theta_{30}$ |
| 0,1,1 | Estimasi  |                     |             |             | 0.4228              |                 |               |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0496              |                 |               |
|       | t-value   |                     |             |             | 8.53                |                 |               |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.00000000000000002 |                 |               |
| 0,1,2 | Estimasi  |                     |             |             | 0.4526              | 0.2774          |               |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0631              | 0.0631          |               |
|       | t-value   |                     |             |             | 7.17                | 4.40            |               |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.000000000000029   | 0.0000134794595 |               |
| 0,1,3 | Estimasi  |                     |             |             | 0.3487              | 0.1179          | 0.2965        |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0939              | 0.0930          | 0.0972        |
|       | t-value   |                     |             |             | 3.71                | 1.27            | 3.05          |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.00023             | 0.20529         | 0.00242       |
| 1,1,0 | Estimasi  | 0.4890              |             |             |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0437              |             |             |                     |                 |               |
|       | t-value   | 11.2                |             |             |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000002 |             |             |                     |                 |               |
| 1,1,1 | Estimasi  | 0.5711              |             |             | -0.1392             |                 |               |
|       | SE        | 0.0681              |             |             | 0.0855              |                 |               |
|       | t-value   | 8.38                |             |             | -1.63               |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000058 |             |             | 0.1                 |                 |               |
| 1,1,2 | Estimasi  | 0.679               |             |             | -0.2783             | -0.125          |               |
|       | SE        | 0.114               |             |             | 0.143               | 0.102           |               |
|       | t-value   | 5.94                |             |             | -1.98               | -1.23           |               |
|       | p-value   | 0.0000000057        |             |             | 0.048               | 0.221           |               |

| Model | Statistik | AR Parameter      |             |             | MA Parameter  |               |               |
|-------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$    | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$ | $\Theta_{20}$ | $\Theta_{30}$ |
| 1,1,3 | Estimasi  | 0.6526            |             |             | -0.3225       | -0.0799       | 0.0969        |
|       | SE        | 0.0848            |             |             | 0.1127        | 0.0870        | 0.0879        |
|       | t-value   | 7.70              |             |             | -2.86         | -0.96         | 1.10          |
|       | p-value   | 0.000000000000008 |             |             | 0.0044        | 0.3586        | 0.2706        |
| 2,1,0 | Estimasi  | 0.4349            | 0.1142      |             |               |               |               |
|       | SE        | 0.0575            | 0.0575      |             |               |               |               |
|       | t-value   | 7.58              | 1.98        |             |               |               |               |
|       | p-value   | 0.000000000000018 | 0.048       |             |               |               |               |
| 2,1,1 | Estimasi  | 0.8340            | -0.0833     |             | -0.5239       |               |               |
|       | SE        | 0.1285            | 0.0834      |             | 0.1480        |               |               |
|       | t-value   | 6.49              | -1.00       |             | -3.54         |               |               |
|       | p-value   | 0.000000000022    | 0.31574     |             | 0.00044       |               |               |
| 2,1,2 | Estimasi  | 0.6223            | 0.0826      |             | -0.2744       | -0.1344       |               |
|       | SE        | 0.1708            | 0.1690      |             | 0.1955        | 0.1437        |               |
|       | t-value   | 3.46              | 0.51        |             | -1.40         | -0.94         |               |
|       | p-value   | 0.0003            | 0.6079      |             | 0.1610        | 0.3502        |               |
| 2,1,3 | Estimasi  | 0.7738            | -0.0275     |             | -0.4735       | -0.0429       | 0.0294        |
|       | SE        | 0.2181            | 0.2161      |             | 0.2499        | 0.2093        | 0.117         |
|       | t-value   | 3.55              | -0.13       |             | -1.89         | -0.21         | 0.26          |
|       | p-value   | 0.00043           | 0.89894     |             | 0.05877       | 0.83765       | 0.79262       |
| 3,1,0 | Estimasi  | 0.4151            | 0.052       | 0.1441      |               |               |               |
|       | SE        | 0.0752            | 0.0806      | 0.0783      |               |               |               |
|       | t-value   | 5.52              | 0.65        | 1.84        |               |               |               |
|       | p-value   | 0.0000000056      | 0.514       | 0.066       |               |               |               |
| 3,1,1 | Estimasi  | 0.6573            | -0.0793     | 0.1164      | -0.3276       |               |               |
|       | SE        | 0.1700            | 0.1201      | 0.0879      | 0.2007        |               |               |
|       | t-value   | 0.3087            | -0.66       | 1.32        | -1.63         |               |               |
|       | p-value   | 0.00013           | 0.50925     | 0.18588     | 0.0336        |               |               |
| 3,1,2 | Estimasi  | 0.744             | -0.194      | 0.126       | -0.439        | 0.123         |               |
|       | SE        | 0.314             | 0.369       | 0.195       | 0.369         | 0.354         |               |
|       | t-value   | 2.37              | -0.53       | 0.64        | -1.19         | 0.35          |               |
|       | p-value   | 0.018             | 0.5999      | 0.519       | 0.234         | 0.728         |               |
| 3,1,3 | Estimasi  | 0.674             | -0.230      | 0.243       | -0.350        | 0.187         | -0.130        |
|       | SE        | 0.408             | 0.526       | 0.401       | 0.487         | 0.521         | 0.358         |
|       | t-value   | 1.65              | -0.44       | 0.61        | -0.72         | 0.36          | -0.36         |
|       | p-value   | 0.10              | 0.66        | 0.54        | 0.47          | 0.72          | 0.72          |

## 12. STARIMA Estimasi Parameter Inverse

### a. SLAG 0

| Model | Statistik | AR Parameter       |             |             | MA Parameter       |                 |               |
|-------|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$     | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$      | $\Theta_{20}$   | $\Theta_{30}$ |
| 0,1,1 | Estimasi  |                    |             |             | 0.4146             |                 |               |
|       | SE        |                    |             |             | 0.0488             |                 |               |
|       | t-value   |                    |             |             | 8.5                |                 |               |
|       | p-value   |                    |             |             | 0.0000000000000024 |                 |               |
| 0,1,2 | Estimasi  |                    |             |             | 0.4233             | 0.2529          |               |
|       | SE        |                    |             |             | 0.0567             | 0.0567          |               |
|       | t-value   |                    |             |             | 7.46               | 4.46            |               |
|       | p-value   |                    |             |             | 0.0000000000000041 | 0.0000100433899 |               |
| 0,1,3 | Estimasi  |                    |             |             | 0.3264             | 0.1254          | 0.3128        |
|       | SE        |                    |             |             | 0.0782             | 0.0773          | 0.0809        |
|       | t-value   |                    |             |             | 4.18               | 1.62            | 3.87          |
|       | p-value   |                    |             |             | 0.000035           | 0.10545         | 0.00013       |
| 1,1,0 | Estimasi  | 0.4812             |             |             |                    |                 |               |
|       | SE        | 0.0435             |             |             |                    |                 |               |
|       | t-value   | 11.1               |             |             |                    |                 |               |
|       | p-value   | 0.0000000000000002 |             |             |                    |                 |               |
| 1,1,1 | Estimasi  | 0.5747             |             |             | -0.1557            |                 |               |
|       | SE        | 0.0685             |             |             | 0.0853             |                 |               |
|       | t-value   | 8.39               |             |             | -1.83              |                 |               |
|       | p-value   | 0.0000000000000056 |             |             | 0.069              |                 |               |
| 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760             |             |             | -0.2765            | -0.1313         |               |
|       | SE        | 0.088              |             |             | 0.1082             | 0.076           |               |
|       | t-value   | 7.62               |             |             | -2.56              | -1.71           |               |
|       | p-value   | 0.000000000000014  | 0.011       | 0.087       |                    |                 |               |
| 1,1,3 | Estimasi  | 0.7062             |             |             | -0.3879            | -0.1225         | 0.1323        |
|       | SE        | 0.0710             |             |             | 0.0916             | 0.0655          | 0.0643        |
|       | t-value   | 9.95               |             |             | -4.23              | -1.87           | 2.06          |
|       | p-value   | 0.0000000000000002 |             |             | 0.000028           | 0.062           | 0.040         |
| 2,1,0 | Estimasi  | 0.4263             | 0.1174      |             |                    |                 |               |
|       | SE        | 0.0541             | 0.0543      |             |                    |                 |               |
|       | t-value   | 7.88               | 2.16        |             |                    |                 |               |
|       | p-value   | 0.000000000000022  | 0.031       |             |                    |                 |               |
| 2,1,1 | Estimasi  | 0.7667             | -0.0833     |             | -0.4249            |                 |               |
|       | SE        | 0.1323             | 0.0902      |             | 0.1496             |                 |               |
|       | t-value   | 5.80               | -0.92       |             | -2.84              |                 |               |
|       | p-value   | 0.000000012        | 0.3563      |             | 0.0047             |                 |               |

| Model | Statistik | AR Parameter   |             |             | MA Parameter  |               |               |
|-------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$ | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$ | $\Theta_{20}$ | $\Theta_{30}$ |
| 2,1,2 | Estimasi  | 0.6827         | 0.0198      |             | -0.3489       | -0.0782       |               |
|       | SE        | 0.1972         | 0.1885      |             | 0.2213        | 0.1605        |               |
|       | t-value   | 3.46           | 0.11        |             | -1.58         | -0.49         |               |
|       | p-value   | 0.00058        | 0.91628     |             | 0.11560       | 0.62644       |               |
| 2,1,3 | Estimasi  | 0.7405         | -0.0682     |             | -0.4099       | -0.0209       | 0.0613        |
|       | SE        | 0.2062         | 0.2061      |             | 0.2315        | 0.1660        | 0.0980        |
|       | t-value   | 3.59           | -0.33       |             | -1.77         | -0.13         | 0.63          |
|       | p-value   | 0.00036        | 0.74103     |             | 0.07728       | 0.89991       | 0.53188       |
| 3,1,0 | Estimasi  | 0.4068         | 0.0586      | 0.1400      |               |               |               |
|       | SE        | 0.0643         | 0.0687      | 0.0669      |               |               |               |
|       | t-value   | 6.33           | 0.85        | 2.09        |               |               |               |
|       | p-value   | 0.000000000057 | 0.394       | 0.037       |               |               |               |
| 3,1,1 | Estimasi  | 0.6487         | -0.0797     | 0.1132      | -0.3160       |               |               |
|       | SE        | 0.1401         | 0.0993      | 0.0690      | 0.1621        |               |               |
|       | t-value   | 4.63           | -0.80       | 1.64        | -1.95         |               |               |
|       | p-value   | 0.0000047      | 0.423       | 0.102       | 0.052         |               |               |
| 3,1,2 | Estimasi  | 0.7800         | -0.2580     | 0.1440      | -0.4770       | 0.7130        |               |
|       | SE        | 0.2500         | 0.3060      | 0.1470      | 0.2870        | 0.2760        |               |
|       | t-value   | 3.12           | -0.84       | 0.98        | -1.66         | 0.63          |               |
|       | p-value   | 0.0019         | 0.3999      | 0.3271      | 0.0976        | 0.5308        |               |
| 3,1,3 | Estimasi  | 0.6254         | -0.1727     | 0.2167      | -0.2859       | 0.1348        | -0.0926       |
|       | SE        | 0.2891         | 0.3642      | 0.2789      | 0.3324        | 0.3447        | 0.2353        |
|       | t-value   | 2.16           | -0.47       | 0.77        | -0.86         | 0.39          | -0.39         |
|       | p-value   | 0.031          | 0.636       | 0.439       | 0.390         | 0.696         | 0.694         |

## b. SLAG 1

| Model | Statistik | AR Parameter        |             |             | MA Parameter        |                 |               |
|-------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$      | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$       | $\Theta_{20}$   | $\Theta_{30}$ |
| 0,1,1 | Estimasi  |                     |             |             | 0.4166              |                 |               |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0496              |                 |               |
|       | t-value   |                     |             |             | 8.4                 |                 |               |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.00000000000000052 |                 |               |
| 0,1,2 | Estimasi  |                     |             |             | 0.4506              | 0.2804          |               |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0624              | 0.0623          |               |
|       | t-value   |                     |             |             | 7.22                | 4.50            |               |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.000000000000021   | 0.0000086299958 |               |
| 0,1,3 | Estimasi  |                     |             |             | 0.3404              | 0.1139          | 0.2978        |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0922              | 0.0913          | 0.0954        |
|       | t-value   |                     |             |             | 3.69                | 1.25            | 3.12          |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.00025             | 0.21312         | 0.00190       |
| 1,1,0 | Estimasi  | 0.4849              |             |             |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0436              |             |             |                     |                 |               |
|       | t-value   | 11.1                |             |             |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000002 |             |             |                     |                 |               |
| 1,1,1 | Estimasi  | 0.5694              |             |             | -0.1423             |                 |               |
|       | SE        | 0.0682              |             |             | 0.0855              |                 |               |
|       | t-value   | 8.34                |             |             | -1.66               |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000078 |             |             | 0.097               |                 |               |
| 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760              |             |             | -0.2792             | -0.1297         |               |
|       | SE        | 0.1114              |             |             | 0.1385              | 0.0983          |               |
|       | t-value   | 6.07                |             |             | -2.02               | -1.32           |               |
|       | p-value   | 0.00000000026       |             |             | 0.044               | 0.187           |               |
| 1,1,3 | Estimasi  | 0.6547              |             |             | -0.3318             | -0.0820         | 0.1011        |
|       | SE        | 0.0831              |             |             | 0.1107              | 0.0847          | 0.0853        |
|       | t-value   | 7.88                |             |             | -3.00               | -0.97           | 1.18          |
|       | p-value   | 0.000000000000022   |             |             | 0.0029              | 0.3336          | 0.2367        |
| 2,1,0 | Estimasi  | 0.4300              | 0.1162      |             |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0579              | 0.0581      |             |                     |                 |               |
|       | t-value   | 7.42                | 2.00        |             |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.000000000000054   | 0.046       |             |                     |                 |               |
| 2,1,1 | Estimasi  | 0.7621              | -0.0700     |             | -0.4224             |                 |               |
|       | SE        | 0.1342              | 0.0899      |             | 0.1533              |                 |               |
|       | t-value   | 5.68                | -0.78       |             | -2.76               |                 |               |
|       | p-value   | 0.000000024         | 0.4365      |             | 0.0061              |                 |               |
| 2,1,2 | Estimasi  | 0.6274              | 0.0758      |             | -0.2866             | -0.1260         |               |
|       | SE        | 0.1633              | 0.1538      |             | 0.1871              | 0.1380          |               |
|       | t-value   | 3.84                | 0.49        |             | -1.53               | -0.91           |               |
|       | p-value   | 0.00014             | 0.62220     |             | 0.12602             | 0.36156         |               |
| 2,1,3 | Estimasi  | 0.7749              | -0.0347     |             | -0.4794             | -0.0329         | 0.0323        |
|       | SE        | 0.2187              | 0.2169      |             | 0.2505              | 0.2093          | 0.1114        |
|       | t-value   | 3.54                | -0.16       |             | -1.91               | -0.16           | 0.29          |
|       | p-value   | 0.00043             | 0.87282     |             | 0.05629             | 0.87529         | 0.77271       |
| 3,1,0 | Estimasi  | 0.4104              | 0.0560      | 0.1414      |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0771              | 0.0825      | 0.0801      |                     |                 |               |
|       | t-value   | 5.32                | 0.68        | 1.76        |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000016          | 0.498       | 0.078       |                     |                 |               |
| 3,1,1 | Estimasi  | 0.6554              | -0.0766     | 0.1144      | -0.3313             |                 |               |
|       | SE        | 0.1748              | 0.1231      | 0.0900      | 0.2065              |                 |               |
|       | t-value   | 3.75                | -0.62       | 1.27        | -1.60               |                 |               |
|       | p-value   | 0.0002              | 0.5339      | 0.2045      | 0.1093              |                 |               |

| Model | Statistik | AR Parameter   |             |             | MA Parameter  |               |               |
|-------|-----------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$ | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$ | $\Theta_{20}$ | $\Theta_{30}$ |
| 3,1,2 | Estimasi  | 0.7570         | -0.2050     | 0.1220      | -0.4610       | 0.1410        |               |
|       | SE        | 0.3060         | 0.3570      | 0.1860      | 0.3600        | 0.3440        |               |
|       | t-value   | 2.47           | -0.58       | 0.66        | -1.28         | 0.41          |               |
|       | p-value   | 0.014          | 0.565       | 0.512       | 0.201         | 0.683         |               |
| 3,1,3 | Estimasi  | 0.6920         | -0.2570     | 0.2510      | -0.3800       | 0.2200        | -0.0143       |
|       | SE        | 0.4140         | 0.5380      | 0.4080      | 0.4930        | 0.5360        | 0.3700        |
|       | t-value   | 1.67           | -0.48       | 0.62        | -0.77         | 0.41          | -0.39         |
|       | p-value   | 0.095          | 0.634       | 0.538       | 0.442         | 0.682         | 0.700         |

### 13. STARIMA Estimasi Parameter Korelasi Silang

#### a. SLAG 0

| Model | Statistik | AR Parameter         |             |             | MA Parameter        |                 |               |
|-------|-----------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$       | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$       | $\Theta_{20}$   | $\Theta_{30}$ |
| 0,1,1 | Estimasi  |                      |             |             | 0.4146              |                 |               |
|       | SE        |                      |             |             | 0.0488              |                 |               |
|       | t-value   |                      |             |             | 8.5                 |                 |               |
|       | p-value   |                      |             |             | 0.00000000000000024 |                 |               |
| 0,1,2 | Estimasi  |                      |             |             | 0.4233              | 0.2529          |               |
|       | SE        |                      |             |             | 0.0567              | 0.0567          |               |
|       | t-value   |                      |             |             | 7.46                | 4.4             |               |
|       | p-value   |                      |             |             | 0.00000000000041    | 0.0000100433899 |               |
| 0,1,3 | Estimasi  |                      |             |             | 0.3264              | 0.1254          | 0.3128        |
|       | SE        |                      |             |             | 0.0782              | 0.0773          | 0.0809        |
|       | t-value   |                      |             |             | 4.18                | 1.62            | 3.87          |
|       | p-value   |                      |             |             | 0.000035            | 0.10545         | 0.00013       |
| 1,1,0 | Estimasi  | 0.4812               |             |             |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0435               |             |             |                     |                 |               |
|       | t-value   | 11.1                 |             |             |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000002  |             |             |                     |                 |               |
| 1,1,1 | Estimasi  | 0.5747               |             |             | -0.1557             |                 |               |
|       | SE        | 0.0685               |             |             | 0.0853              |                 |               |
|       | t-value   | 8.39                 |             |             | -1.83               |                 |               |
|       | p-value   | 0.000000000000000056 |             |             | 0.069               |                 |               |
| 1,1,2 | Estimasi  | 0.6760               |             |             | -0.2765             | -0.1313         |               |
|       | SE        | 0.088                |             |             | 0.1082              | 0.076           |               |
|       | t-value   | 7.62                 |             |             | -2.56               | -1.71           |               |
|       | p-value   | 0.0000000000000014   |             |             | 0.011               | 0.087           |               |
| 1,1,3 | Estimasi  | 0.7062               |             |             | -0.3879             | -0.1225         | 0.1323        |
|       | SE        | 0.0710               |             |             | 0.0916              | 0.0655          | 0.0643        |
|       | t-value   | 9.95                 |             |             | -4.23               | -1.87           | 2.06          |
|       | p-value   | 0.00000000000000002  |             |             | 0.00028             | 0.062           | 0.040         |
| 2,1,0 | Estimasi  | 0.4263               | 0.1174      |             |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0541               | 0.0543      |             |                     |                 |               |
|       | t-value   | 7.88                 | 2.16        |             |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.0000000000000022   | 0.031       |             |                     |                 |               |
| 2,1,1 | Estimasi  | 0.7667               | -0.0833     |             | -0.4249             |                 |               |
|       | SE        | 0.1323               | 0.0902      |             | 0.1496              |                 |               |
|       | t-value   | 5.80                 | -0.92       |             | -2.84               |                 |               |
|       | p-value   | 0.0000000012         | 0.3563      |             | 0.0047              |                 |               |
| 2,1,2 | Estimasi  | 0.6827               | 0.0198      |             | -0.3489             | -0.0782         |               |
|       | SE        | 0.1972               | 0.1885      |             | 0.2213              | 0.1605          |               |
|       | t-value   | 3.46                 | 0.11        |             | -1.58               | -0.49           |               |
|       | p-value   | 0.00058              | 0.9162      |             | 0.11560             | 0.62644         |               |
| 2,1,3 | Estimasi  | 0.7405               | -0.0820     |             | -0.4099             | -0.0209         | 0.0613        |
|       | SE        | 0.2062               | 0.2061      |             | 0.2315              | 0.1600          | 0.0980        |
|       | t-value   | 3.59                 | -0.33       |             | -1.77               | -0.13           | 0.63          |
|       | p-value   | 0.0003               | 0.74103     |             | 0.07728             | 0.89991         | 0.53188       |
| 3,1,0 | Estimasi  | 0.4068               | 0.0586      | 0.1400      |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0643               | 0.067       | 0.0696      |                     |                 |               |
|       | t-value   | 6.33                 | 0.85        | 2.09        |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000057     | 0.394       | 0.037       |                     |                 |               |
| 3,1,1 | Estimasi  | 0.6487               | -0.079      | 0.1132      | -0.3160             |                 |               |
|       | SE        | 0.1401               | 0.0993      | 0.0696      | 0.1621              |                 |               |
|       | t-value   | 4.63                 | -0.80       | 1.64        | -1.95               |                 |               |
|       | p-value   | 0.0000047            | 0.423       | 0.102       | 0.052               |                 |               |
| 3,1,2 | Estimasi  | 0.780                | -0.258      | 0.144       | -0.477              | 0.713           |               |
|       | SE        | 0.250                | 0.306       | 0.147       | 0.287               | 0.276           |               |
|       | t-value   | 3.12                 | -0.84       | 0.98        | -1.66               | 0.63            |               |
|       | p-value   | 0.0019               | 0.3999      | 0.3271      | 0.0976              | 0.5308          |               |
| 3,1,3 | Estimasi  | 0.6254               | -0.1727     | 0.2167      | -0.2859             | 0.1348          | -0.0926       |
|       | SE        | 0.2819               | 0.342       | 0.2789      | 0.3324              | 0.3447          | 0.2353        |
|       | t-value   | 2.16                 | -0.47       | 0.77        | -0.86               | 0.39            | -0.39         |
|       | p-value   | 0.031                | 0.636       | 0.439       | 0.390               | 0.696           | 0.694         |

#### b. SLAG 1

| Model | Statistik | AR Parameter        |             |             | MA Parameter        |                 |               |
|-------|-----------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------|
|       |           | $\varphi_{10}$      | $\Phi_{20}$ | $\Phi_{30}$ | $\theta_{10}$       | $\Theta_{20}$   | $\Theta_{30}$ |
| 0,1,1 | Estimasi  |                     |             |             | 0.4226              |                 |               |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0496              |                 |               |
|       | t-value   |                     |             |             | 8.52                |                 |               |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.00000000000000053 |                 |               |
| 0,1,2 | Estimasi  |                     |             |             | 0.4528              | 0.2777          |               |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0632              | 0.0631          |               |
|       | t-value   |                     |             |             | 7.17                | 4.40            |               |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.000000000000029   | 0.0000132701631 |               |
| 0,1,3 | Estimasi  |                     |             |             | 0.3489              | 0.1182          | 0.2963        |
|       | SE        |                     |             |             | 0.0939              | 0.0930          | 0.0972        |
|       | t-value   |                     |             |             | 3.71                | 1.27            | 3.05          |
|       | p-value   |                     |             |             | 0.00023             | 0.20438         | 0.00243       |
| 1,1,0 | Estimasi  | 0.4890              |             |             |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0437              |             |             |                     |                 |               |
|       | t-value   | 11.2                |             |             |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000002 |             |             |                     |                 |               |
| 1,1,1 | Estimasi  | 0.5712              |             |             | -0.1392             |                 |               |
|       | SE        | 0.0681              |             |             | 0.0855              |                 |               |
|       | t-value   | 8.39                |             |             | -1.63               |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000000057 |             |             | 0.1                 |                 |               |
| 1,1,2 | Estimasi  | 0.679               |             |             | -0.283              | -0.125          |               |
|       | SE        | 0.1115              |             |             | 0.144               | 0.102           |               |
|       | t-value   | 5.90                |             |             | -1.97               | -1.22           |               |
|       | p-value   | 0.000000007         |             |             | 0.05                | 0.22            |               |
| 1,1,3 | Estimasi  | 0.6527              |             |             | -0.3227             | -0.0800         | 0.0970        |
|       | SE        | 0.0848              |             |             | 0.1128              | 0.0871          | 0.0879        |
|       | t-value   | 7.69                |             |             | -2.86               | -0.92           | 1.10          |
|       | p-value   | 0.000000000000083   |             |             | 0.0044              | 0.3590          | 0.2708        |
| 2,1,0 | Estimasi  | 0.4349              | 0.1142      |             |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0574              | 0.0575      |             |                     |                 |               |
|       | t-value   | 7.58                | 1.99        |             |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000000000018    | 0.048       |             |                     |                 |               |
| 2,1,1 | Estimasi  | 0.8346              | -0.0840     |             | -0.5247             |                 |               |
|       | SE        | 0.1290              | 0.0837      |             | 0.1485              |                 |               |
|       | t-value   | 6.47                | -1.00       |             | -3.53               |                 |               |
|       | p-value   | 0.000000024         | 0.31633     |             | 0.00045             |                 |               |
| 2,1,2 | Estimasi  | 0.6222              | 0.0827      |             | -0.2744             | -0.1344         |               |
|       | SE        | 0.1714              | 0.1615      |             | 0.1962              | 0.1442          |               |
|       | t-value   | 3.63                | 0.51        |             | -1.40               | -0.93           |               |
|       | p-value   | 0.00031             | 0.60899     |             | 0.16258             | 0.35167         |               |
| 2,1,3 | Estimasi  | 0.7741              | -0.0283     |             | -0.4738             | -0.0423         | 0.0300        |
|       | SE        | 0.2182              | 0.2169      |             | 0.2500              | 0.2092          | 0.1118        |
|       | t-value   | 3.55                | -0.13       |             | -1.90               | -0.20           | 0.27          |
|       | p-value   | 0.00043             | 0.89589     |             | 0.05870             | 0.84002         | 0.78826       |
| 3,1,0 | Estimasi  | 0.4104              | 0.0560      | 0.1414      |                     |                 |               |
|       | SE        | 0.0771              | 0.0825      | 0.0801      |                     |                 |               |
|       | t-value   | 5.32                | 0.68        | 1.76        |                     |                 |               |
|       | p-value   | 0.00000016          | 0.498       | 0.078       |                     |                 |               |
| 3,1,1 | Estimasi  | 0.6554              | -0.0766     | 0.1144      | -0.3313             |                 |               |
|       | SE        | 0.1748              | 0.1231      | 0.0900      | 0.2065              |                 |               |
|       | t-value   | 3.75                | -0.62       | 1.27        | -1.60               |                 |               |
|       | p-value   | 0.0002              | 0.5339      | 0.2045      | 0.1093              |                 |               |
| 3,1,2 | Estimasi  | 0.7570              | -0.2050     | 0.1220      | -0.4610             | 0.1410          |               |
|       | SE        | 0.3060              | 0.3570      | 0.1860      | 0.3600              | 0.3440          |               |
|       | t-value   | 2.47                | -0.58       | 0.66        | -1.28               | 0.41            |               |
|       | p-value   | 0.014               | 0.565       | 0.512       | 0.201               | 0.683           |               |
| 3,1,3 | Estimasi  | 0.6920              | -0.2570     | 0.2510      | -0.3800             | 0.2200          | -0.0143       |
|       | SE        | 0.4140              | 0.5380      | 0.4080      | 0.4930              | 0.5360          | 0.3700        |
|       | t-value   | 1.67                | -0.48       | 0.62        | -0.77               | 0.41            | -0.39         |
|       | p-value   | 0.095               | 0.634       | 0.538       | 0.442               | 0.682           | 0.700         |

#### 14. Hasil Evaluasi RMSE Uniform

##### a. SLAG 0

| Model | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 0,1,1 | 1.970 | 2.342   | 2.269  | 1.613 | 1.985 |
| 0,1,2 | 1.947 | 2.262   | 2.275  | 1.585 | 2.024 |
| 0,1,3 | 1.957 | 2.254   | 2.289  | 1.597 | 2.016 |
| 1,1,0 | 1.689 | 2.019   | 2.065  | 1.423 | 1.699 |
| 1,1,1 | 1.652 | 2.003   | 2.125  | 1.408 | 1.681 |
| 1,1,2 | 1.640 | 2.120   | 2.252  | 1.405 | 1.697 |
| 1,1,3 | 1.647 | 2.164   | 2.328  | 1.418 | 1.727 |
| 2,1,0 | 1.806 | 2.122   | 2.161  | 1.564 | 1.815 |
| 2,1,1 | 1.757 | 2.414   | 2.702  | 1.546 | 1.961 |
| 2,1,2 | 1.639 | 2.114   | 2.245  | 1.417 | 1.689 |
| 2,1,3 | 1.727 | 2.375   | 2.594  | 1.482 | 1.879 |
| 3,1,0 | 1.770 | 2.074   | 2.113  | 1.507 | 1.777 |
| 3,1,1 | 1.681 | 2.146   | 2.362  | 1.454 | 1.782 |
| 3,1,2 | 2.200 | 3.222   | 3.621  | 2.001 | 2.521 |
| 3,1,3 | 1.792 | 2.394   | 2.555  | 1.561 | 1.899 |

b. SLAG 1

| Model | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 0,1,1 | 1.969 | 2.343   | 2.269  | 1.613 | 1.985 |
| 0,1,2 | 1.944 | 2.262   | 2.273  | 1.581 | 2.027 |
| 0,1,3 | 1.955 | 2.250   | 2.291  | 1.594 | 2.018 |
| 1,1,0 | 1.685 | 2.018   | 2.066  | 1.420 | 1.696 |
| 1,1,1 | 1.653 | 2.005   | 2.119  | 1.407 | 1.680 |
| 1,1,2 | 1.640 | 2.124   | 2.258  | 1.406 | 1.699 |
| 1,1,3 | 1.647 | 2.105   | 2.226  | 1.416 | 1.691 |
| 2,1,0 | 1.796 | 2.112   | 2.152  | 1.554 | 1.804 |
| 2,1,1 | 1.839 | 2.633   | 2.976  | 1.634 | 2.133 |
| 2,1,2 | 1.660 | 2.041   | 2.127  | 1.458 | 1.658 |
| 2,1,3 | 1.699 | 2.349   | 2.588  | 1.461 | 1.860 |
| 3,1,0 | 1.760 | 2.065   | 2.105  | 1.497 | 1.766 |
| 3,1,1 | 1.684 | 2.159   | 2.381  | 1.458 | 1.790 |
| 3,1,2 | 1.966 | 2.802   | 3.108  | 1.741 | 2.203 |
| 3,1,3 | 1.945 | 2.704   | 2.947  | 1.740 | 2.122 |

## 15. Hasil Evaluasi RMSE Inverse

a. SLAG 0

| Model | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 0,1,1 | 1.968 | 2.341   | 2.269  | 1.612 | 1.981 |
| 0,1,2 | 1.945 | 2.261   | 2.275  | 1.584 | 2.022 |
| 0,1,3 | 1.955 | 2.253   | 2.289  | 1.596 | 2.014 |
| 1,1,0 | 1.688 | 2.020   | 2.067  | 1.420 | 1.698 |
| 1,1,1 | 1.652 | 2.005   | 2.127  | 1.407 | 1.681 |
| 1,1,2 | 1.641 | 2.122   | 2.253  | 1.404 | 1.701 |
| 1,1,3 | 1.648 | 2.167   | 2.329  | 1.418 | 1.732 |
| 2,1,0 | 1.804 | 2.123   | 2.163  | 1.561 | 1.810 |
| 2,1,1 | 1.760 | 2.415   | 2.700  | 1.553 | 1.974 |
| 2,1,2 | 1.639 | 2.117   | 2.246  | 1.415 | 1.692 |
| 2,1,3 | 1.730 | 2.378   | 2.592  | 1.486 | 1.889 |
| 3,1,0 | 1.769 | 2.075   | 2.115  | 1.504 | 1.773 |
| 3,1,1 | 1.683 | 2.148   | 2.363  | 1.456 | 1.789 |
| 3,1,2 | 2.206 | 3.222   | 3.614  | 2.015 | 2.541 |
| 3,1,3 | 1.794 | 2.396   | 2.553  | 1.566 | 1.908 |

b. SLAG 1

| Model | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 0,1,1 | 1.968 | 2.341   | 2.269  | 1.612 | 1.981 |
| 0,1,2 | 1.943 | 2.262   | 2.272  | 1.580 | 2.024 |
| 0,1,3 | 1.954 | 2.249   | 2.291  | 1.594 | 2.015 |
| 1,1,0 | 1.686 | 2.020   | 2.067  | 1.419 | 1.696 |
| 1,1,1 | 1.653 | 2.005   | 2.121  | 1.407 | 1.681 |
| 1,1,2 | 1.641 | 2.122   | 2.253  | 1.404 | 1.701 |
| 1,1,3 | 1.648 | 2.110   | 2.232  | 1.416 | 1.696 |
| 2,1,0 | 1.800 | 2.118   | 2.159  | 1.557 | 1.806 |
| 2,1,1 | 1.736 | 2.361   | 2.642  | 1.525 | 1.935 |
| 2,1,2 | 1.655 | 2.046   | 2.135  | 1.448 | 1.656 |
| 2,1,3 | 1.713 | 2.373   | 2.614  | 1.472 | 1.888 |
| 3,1,0 | 1.764 | 2.071   | 2.111  | 1.499 | 1.769 |
| 3,1,1 | 1.683 | 2.151   | 2.373  | 1.457 | 1.792 |
| 3,1,2 | 2.019 | 2.892   | 3.219  | 1.802 | 2.289 |
| 3,1,3 | 2.039 | 2.867   | 3.147  | 1.854 | 2.259 |

16. Hasil Evaluasi RMSE Korelasi Silang

a. SLAG 0



| Model | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 0,1,1 | 1.970 | 2.342   | 2.269  | 1.613 | 1.985 |
| 0,1,2 | 1.947 | 2.262   | 2.275  | 1.585 | 2.024 |
| 0,1,3 | 1.957 | 2.254   | 2.289  | 1.597 | 2.016 |
| 1,1,0 | 1.689 | 2.019   | 2.065  | 1.423 | 1.699 |
| 1,1,1 | 1.652 | 2.003   | 2.125  | 1.408 | 1.681 |
| 1,1,2 | 1.640 | 2.120   | 2.252  | 1.405 | 1.697 |
| 1,1,3 | 1.647 | 2.164   | 2.328  | 1.418 | 1.727 |
| 2,1,0 | 1.806 | 2.122   | 2.161  | 1.564 | 1.815 |
| 2,1,1 | 1.757 | 2.414   | 2.702  | 1.546 | 1.961 |
| 2,1,2 | 1.639 | 2.114   | 2.245  | 1.417 | 1.689 |
| 2,1,3 | 1.727 | 2.376   | 2.594  | 1.482 | 1.879 |
| 3,1,0 | 1.770 | 2.074   | 2.113  | 1.507 | 1.777 |
| 3,1,1 | 1.682 | 2.147   | 2.362  | 1.453 | 1.782 |
| 3,1,2 | 2.201 | 3.223   | 3.623  | 2.001 | 2.521 |
| 3,1,3 | 1.792 | 2.395   | 2.555  | 1.561 | 1.900 |

b. SLAG 1

| Model | Barat | Selatan | Tengah | Timur | Utara |
|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| 0,1,1 | 1.969 | 2.343   | 2.269  | 1.613 | 1.985 |
| 0,1,2 | 1.944 | 2.262   | 2.273  | 1.581 | 2.027 |
| 0,1,3 | 1.955 | 2.250   | 2.290  | 1.594 | 2.018 |
| 1,1,0 | 1.685 | 2.018   | 2.066  | 1.420 | 1.696 |
| 1,1,1 | 1.653 | 2.005   | 2.120  | 1.407 | 1.680 |
| 1,1,2 | 1.640 | 2.124   | 2.258  | 1.406 | 1.699 |
| 1,1,3 | 1.647 | 2.105   | 2.226  | 1.416 | 1.692 |
| 2,1,0 | 1.796 | 2.112   | 2.152  | 1.555 | 1.804 |
| 2,1,1 | 1.840 | 2.636   | 2.980  | 1.635 | 2.136 |
| 2,1,2 | 1.660 | 2.041   | 2.127  | 1.458 | 1.658 |
| 2,1,3 | 1.701 | 2.352   | 2.592  | 1.462 | 1.863 |
| 3,1,0 | 1.760 | 2.065   | 2.104  | 1.497 | 1.766 |
| 3,1,1 | 1.684 | 2.159   | 2.381  | 1.458 | 1.790 |
| 3,1,2 | 1.967 | 2.804   | 3.111  | 1.742 | 2.204 |
| 3,1,3 | 1.946 | 2.705   | 2.949  | 1.741 | 2.124 |