

《概率统计 A》 参考答案

一、填空题（每空 3 分，共 30 分）

1、 $1-a+b$

2、 3

3、 $C_{n-1}^{r-1}(1-p)^{n-r} p^r$

4、 0.8

5、 $\frac{11}{27}$

6、 $\frac{1}{2}$

7、 43.75

8、 $F(1,1)$

9、 $\frac{1}{2}$

10、 (10 ± 0.2132)

二、计算题（每小题 10 分，共 40 分）

1、解：由 X 在 $(0, 2\pi)$ 内服从均匀分布得密度函数

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & 0 < x < 2\pi \\ 0 & \text{其他.} \end{cases}$$

由于随机变量 $Y = \cos X$ ，有 $y = \cos x$ ，在 $(0, 2\pi)$ 内为非单调函数，在 $(0, \pi)$

和 $(\pi, 2\pi)$ 内分别单调，其反函数分别为

$$x_1 = \arccos y, \quad x_1' = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, \quad x_1 \in (0, \pi);$$

$$x_2 = 2\pi - \arccos y, \quad x_2' = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}, \quad x_2 \in (\pi, 2\pi).$$

故

$$\begin{aligned} \varphi_Y(y) &= \varphi(\arccos y) |x_1'| + \varphi(2\pi - \arccos y) |x_2'| \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & y \in (-1, 1), \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$

2、解:

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{Cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)}\sqrt{D(Z_2)}},$$

$$\text{cov}(Z_1, Z_2) = E(Z_1 Z_2) - E(Z_1)E(Z_2)$$

$$E(Z_1 Z_2) = E\{(X - Y)(X + Y)\} = E\{X^2 - Y^2\} = E(X^2) - E(Y^2) = 0,$$

$$E(Z_1)E(Z_2) = \{E(X) - E(Y)\}\{E(X) + E(Y)\} = 0.$$

所以, 协方差 $\text{cov}(Z_1, Z_2) = E(Z_1 Z_2) - E(Z_1)E(Z_2) = 0$, 从而 $Z_1 = X - Y$ 和 $Z_2 = X + Y$

的相关系数 $\rho_{Z_1 Z_2} = 0$.

3、解: (1) 似然函数 $L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = \frac{1}{(2\theta)^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n |x_i|}{\theta}},$

$$\ln L = -n \ln(2\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |x_i|$$

令 $\frac{\partial \ln L}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n |x_i| = 0$ 得 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i|$, 从而 θ 的

极大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$.

(1) 由于

$$E(|X|) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x| f(x) dx = \frac{1}{2\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta,$$

$$E(\hat{\theta}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(|X_i|) = E(|X|) = \theta$$

$$E(|X|^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^2 f(x) dx = \frac{1}{2\theta} \int_{-\infty}^{+\infty} |x|^2 e^{-\frac{|x|}{\theta}} dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x}{\theta}} dx = 2\theta^2.$$

从而 $D(\hat{\theta}) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(|X_i|) = \frac{1}{n} D(|X|) = \frac{1}{n} \{E(|X|^2) - (E|X|)^2\} = \frac{\theta^2}{n}.$

由于 $\ln f(X, \theta) = -\ln(2\theta) - \frac{|X|}{\theta},$

所以

$$E\left[\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right]^2 = E\left[-\frac{1}{\theta} + \frac{|X|}{\theta^2}\right]^2 = E\left[\frac{1}{\theta^2} - \frac{2|X|}{\theta^3} + \frac{|X|^2}{\theta^4}\right] = \frac{1}{\theta^2} - \frac{2E(|X|)}{\theta^3} + \frac{E(|X|^2)}{\theta^4} = \frac{1}{\theta^2},$$

从而, $D_0(\theta) = \frac{1}{n E\left[\frac{\partial \ln f(X, \theta)}{\partial \theta}\right]^2} = \frac{\theta^2}{n} = D(\hat{\theta})$, 故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的优效估计.

4、解: 1) 由 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 的均匀分布可知密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它.} \end{cases}$$

边缘分布密度函数

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi} dy, & -1 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, & -1 \leq x \leq 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx, & -1 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} = \begin{cases} \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, & -1 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

显然

$$f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y).$$

故 X 与 Y 不独立.

2) 微分方程所对应的特征方程为: $\lambda^2 + X\lambda + Y = 0$,

若 $\Delta = X^2 - 4Y \geq 0$, 即 $Y \leq \frac{X^2}{4}$ 时, 仅当实特征根 $\lambda_i < 0$ ($i=1, 2$) 时才能有任意解

$x(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$, 此时对应 $\lambda_1 + \lambda_2 = -X < 0$, $\lambda_1 \lambda_2 = Y > 0$, 即

$X > 0$ 且 $0 < Y \leq \frac{X^2}{4}$ 满足要求.

若 $\Delta = X^2 - 4Y < 0$, 即 $Y > \frac{X^2}{4}$ 时, 仅当复特征根的实部 $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$ ($i=1, 2$) 时才能

有任意解 $x(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$, 此时对应 $\operatorname{Re}(\lambda_i) = -\frac{X}{2}$, $\lambda_1 \lambda_2 = Y > 0$, 即

$X > 0$ 且 $Y > \frac{X^2}{4}$ 满足要求.

综合所得, 仅当 $X > 0$ 且 $Y > 0$ 时, 微分方程的任意解 $x(t)$ 满足 $\lim_{t \rightarrow +\infty} x(t) = 0$, 故

$$\text{对应的概率 } P = \iint_{x>0, y>0} f(x, y) dy dx = \frac{1}{4}.$$

三、应用题 (30 分)

1、解: 设事件 A 表示“先取出的零件是一等品”, 事件 C 表示“第二次取出的零件是一等品”, 事件 B_i 表示“取第 i 箱”, $i = 1, 2$. 则

$$P(B_i) = \frac{1}{2}, P(A|B_1) = \frac{1}{5}, P(A|B_2) = \frac{18}{30} = \frac{3}{5},$$

$$P(AC|B_1) = \frac{C_{10}^2}{C_{50}^2} = \frac{9}{245}, P(AC|B_2) = \frac{C_{18}^2}{C_{30}^2} = \frac{51}{145}.$$

(1) 先取出的零件是一等品的概率

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{2}{5}.$$

(2) 在先取出的零件是一等品的条件下, 第二次取出的零件仍是一等品的概率

$$P(C|A) = \frac{P(AC)}{P(A)} = \frac{P(AC|B_1)P(B_1) + P(AC|B_2)P(B_2)}{P(A)}$$

$$= \frac{\frac{9}{245} \times \frac{1}{2} + \frac{51}{145} \times \frac{1}{2}}{\frac{2}{5}} = \frac{690}{1421} \approx 0.4856.$$

2、解: 以 X 表示任意时刻正在运行的机器台数, 则由题意知:

$X \sim B(400, 0.75)$, 所以

$$E(X) = np = 400 \times 0.75 = 300, D(X) = npq = 400 \times 0.75 \times 0.25 = 75.$$

假设应供应 T 千瓦功率的电力才能满足要求, 则

$$P\left\{0 \leq X \leq \frac{T}{10}\right\} \geq 0.99.$$

由棣莫弗-拉普拉斯定理得

$$P\left\{0 \leq X \leq \frac{T}{10}\right\} = P\left\{\frac{0-300}{\sqrt{75}} \leq \frac{X-np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{\frac{T}{10}-300}{\sqrt{75}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{\frac{T}{10}-300}{5\sqrt{3}}\right) - \Phi(-20\sqrt{3})$$

$$\approx \Phi\left(\frac{\frac{T}{10}-300}{5\sqrt{3}}\right) \geq 0.99.$$

查表得 $\frac{\frac{T}{10}-300}{5\sqrt{3}} \geq 2.33$,

所以 $T \geq 3000 + 5 \times 1.732 \times 23.3 = 3201.78$. 故只要供应 3201.78 千瓦的电力, 就可 99% 的可能保证有足够的电能供应而不至于影响生产.

3. 解: 原假设 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$. 备择假设 $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

当 H_0 为真时, 统计量

$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1) = F(9, 8).$$

从而

$$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.05}(9, 8) = 3.39, \quad F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) = F_{0.95}(9, 8) = \frac{1}{F_{0.05}(8, 9)} = \frac{1}{3.23},$$

拒绝域

$$W: F > 3.39, \text{ 或者 } F < \frac{1}{3.23}.$$

由于 $s_1^2 = 236.8$, $s_2^2 = 63.86$, 于是 $F_0 = \frac{S_1^2}{S_2^2} = \frac{236.8}{63.86} \approx 3.7 > 3.39$.

故拒绝 H_0 , 即认为两总体方差有显著差异.