

الجدول رقم 11. 1. 1

الإصابات الناتجة عن الاسمنت (اليمنيو - سيليكات الكالسيوم)

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
تقرحات وتقيحات أدمت الجلد.	30 يوما	صناعة وثقبت وسحق الاسمنت وتعبئته في أكياس ونقلها على الظهر.
التهاب الجلد الاكزيماي الشكل المتكرر في حالة تعرض جديد للخطر أو المثبت باختبار .	15 يوما	صناعة المواد المكتلة والمقولة بواسطة الاسمنت.
التهاب حافة الجفن.	30 يوما	استعمال الاسمنت في أوراش البناء والأشغال العمومية.
التهاب الملتحمة.	30 يوما	

جدول رقم 12 . 1 . 1

الإصابات المهنية الناتجة عن استنشاق الغبار المعدني المحتوي على السليس البلوري (كوارتز، كريستوباليت، تريديميت) أو السيليكات البلورية (الصلصال، الطالك) أو الغرافيت أو الفحم الحجري.

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
- أ -	- أ -	- أ -
الإصابات الناتجة عن استنشاق أغبرة السليس البلورية:		الأعمال المعرضة لاستنشاق غبار يحتوي على سليس مستقل خاصة :
أ 1 - السحار السليسي الحاد: تليف رئوي يتميز بإصابات سنخية خلالية ثنائية يكشف عنها بواسطة اختبارات الصور الإشعاعية أو الصور المقطعية التكثيفية ، أو كلما أمكن بمعاينات تشريحية مرضية ، هذه العلامات أو المعاينات تكون	أ 1 - 6 أشهر (بشرط التعرض للخطر لمدة لا تقل عن 6 أشهر)	أعمال الحفر والكسر واستخراج ونقل الخامات أو الصخور المحتوية على السليس البلوري بالأوراش والمنشآت؛ الأعمال في أوراش حفر الأنفاق وعرز الآبار أو المهاوي في المناجم؛