

## جدول رقم 1 . 2 . 20

الإصابات المتولدة عن المذيبات العضوية السائلة ذات الاستعمال المهني :

الهيدروكاربونات السائلة الأليفاتية والأليسكلية والايثيروسكلية والعطرية وأخلاطها (وايت سبيريت، البنزينات الخاصة) والمشتقات النترية من الهيدروكاربونات الأليفاتية والاسيتونتريل والكحول والإلديهيدات والسيكونات والاستيرات و الإيتيرات بما فيها رابع الهيدروفوران والجليكولات وأثيراتها وثنائي ميتيل الفورماميد وثنائي ميتيل السلفوكسيد

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
أ	أ	أ
متلازمة انشمال أو تخدر يمكن أن تؤدي إلى الغيبوبة.  التهابات جلدية، التهابات الملحمة التهججية.  إصابات إكزيمية الشكل متكررة في حالة التعرض من جديد للخطر أو مثبتة باختبار جلدي سطحي.	7 أيام  7 أيام  15 يوما	تحضير واستعمال ومناولة المذيبات.
ب	ب	ب
اعتلالات دماغية تتميز باختلالات في الوظائف المعرفية، وتتألف من ثلاثة على الأقل من التشوهات الستة التالية:  * تخلف نفسي حركي؛  * اضطرابات في المهارة و في الذاكرة و في التنظيم البصري المكاني و في الوظائف التنفيذية و في اليقظة و التي لا تتفاقم بعد التوقف عن التعرض للخطر.  يتم تشخيص الاعتلال الدماغي السام بعد استبعاد الاضطرابات المعرفية المرتبطة بمرض الكحول بواسطة اختبارات المقاييس النفسية و يثبت بإعادة هذه الاختبارات على الأقل بعد 6 أشهر و على الأقل بعد ستة أشهر تلي التوقف	سنة واحدة (بشرط التعرض للخطر لمدة لا تقل عن 10 سنوات)	معالجة الراتنجات الطبيعية أو الاصطناعية . استعمال البرنيز والصبغات والطلاء والعجين والغراء والك . إنتاج المطاط الطبيعي والاصطناعي.  استعمال المذيبات كعناصر استخراج وتشريب وتكتيل وتنظيف وكمقشرات ومذوبات ومخففات .  استعمال المذيبات كمفاعلات مخبرية في الإنشاءات العضوية وفي الصيدلة وفي مواد التجميل.

عن التعرض للخطر.		
------------------	--	--

## الجدول رقم 1 . 21.2

### الإصابات الناتجة عن الفينيلهيدرازين

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
إصابات إكزيمية الشكل متكررة في حالة التعرض من جديد للخطر أو مثبتة باختبار جلدي سطحي.	15 يوما	تحضير واستعمال ومناولة الفينيلهيدرازين.
فقر الدم من النوع الانحلالي.	30 يوما	
التهاب الأنف المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار .	7 أيام	
الربو المشخص موضوعيا باستقصاءات وظيفية تنفسية و المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.	7 أيام	

## الجدول رقم 1 . 2 . 22

الإصابات الجلدية أو إصابات الغشاء المخاطي الناتجة عن قطران الفحم الحجري وزيوته (المحتوية على أجزاء تقطير تسمى :فينولية و نفتالينية واسينفتينية وانتراسينية وكريسينية) زفت الفحم الحجري...

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
الالتهابات الجلدية الإكزيمية الشكل المتكررة بعد التعرض من جديد للخطر.	7 أيام	تحضير واستعمال ومناولة قطران وزيت وزفت الفحم الحجري والمواد التي تحتوي عليها خاصة في : - مصانع فحم الكوك؛
الالتهابات الجلدية المستثارة		