جدول رقم 1.1.5 الأمراض المهنية الناتجة عن البرليوم ومركباته

La et light for the first of the second control of	>	* 4 . £ \$4 A
القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
هذه الأمراض		
الأعمال المعرضة للبيريليوم ومركباته		أ- المظاهر الموضعية:
خاصة:		
·	10 أيام	التهابات حادة أو متكررة
سحق ومعالجة خامات البيريليوم (البيريل) ؟	(10	بالملتحمة.
إنتاج وتصنيع البيريليوم وأمزجته وتركيباته؛		التهابات جلدية حادة تهيجية أو
الماع وتستيع البيرييوم والمرجد وترتيب	30 أيام	الكزيمية الشكل متكررة بعد
صناعة واستعمال المساحيق المتكونة أساسا	ر∌، عن	
		التعرض من جديد للخطر.
من أملاح البيريليوم والمخصصة لطلي		or 1 to 1 to 10
الغشاء الداخلي للأنابيب المتفلورة.		ب- المظاهر العامة:
	1	الاعتلال القصبي الرئوي الحاد
	60 يوما	أو شبه الحاد المنتشر مع ظهور
		متأخر لعلامات مشخصة إشعاعيا
		تكون غالبا خفيفة ِ
	25 سنة	تايف رئوي منتشر مع وجود
		ي علامات مشخصة إشعاعيا
		واضطرابات وظيفية وعلامات
		عامة (نحول ووهن) بما في ذلك
		المضاعفات القلبية (عجز البطين
		الأيمن) والمضاعفات الجنبوية
		الرئوية الثانوية (استرواح الصدر
		العفوى) مثبت بأختبارات وظيفية
		تنفسية
		• *