

### جدول رقم 17.1.1

الإصابات الناتجة عن استنشاق غبار معدني أو أدخنة تحتوي على جزيئات الحديد أو أكسيد الحديد

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
<p>السحار الحديدي : اعتلال رئوي خلالي مزمن يتميز بانتشار كثيف لجزيئات الحديد أو أكسيد الحديد يكشف عنها بتواجد ظلال كثيفة نقطية الشكل منتشرة تظهر في الصور الإشعاعية أو الصور المقطعية التكتيفية ، أو كلما أمكن بمعاينات تشريحية مرضية .</p> <p>هذه العلامات أو المعاينات تكون مصحوبة أو غير مصحوبة باضطرابات وظيفية تنفسية.</p> <p>المظهر المرضي المرتبط:</p> <p>انتفاخ الرئة</p>	<p>35 سنة (بشرط التعرض للخطر لمدة 10 سنوات)</p>	<p>الأعمال المعرضة لاستنشاق أغبرة معدنية أو أدخنة تحتوي على جزيئات الحديد أو أكسيد الحديد، خاصة:</p> <p>- استخراج وطحن وتفتيت ومعالجة خامات الحديد والمغرة ،</p> <p>- الصقل بمواد كاشطة متكونة أساسا من أكسيدات الحديد،</p> <p>- لحام الفولاذ الناعم.</p>

### جدول رقم 17.1.1 مكرر

الإصابات الناتجة عن العمل في باطن مناجم الحديد

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
<p>سرطان بدائي بالقصبات الرئوية .</p> <p>انتفاخ الرئة المثبت بعلامات تظهر في الصور المقطعية التكتيفية و باختلالات وظيفية من النوع الإنسدادى ، أو بمعاينات تشريحية مرضية عند وجودها.</p>	<p>40 سنة (بشرط التعرض للخطر لمدة 10 سنوات)</p> <p>15 سنة (بشرط التعرض للخطر لمدة 10 سنوات)</p>	<p>الأعمال المنجزة في باطن مناجم الحديد.</p>