الجدول رقم 21.2.1 الإصابات الناتجة عن الفينيلهيدرازين

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
تحضير واستعمال ومناولة الفينيلهيدرازين.	15 يوما	إصابات إكزيمية الشكل متكررة في حالة التعرض من جديد للخطر أو مثبتة باختبار جلدي سطحي.
	30 يوما	فقر الدم من النوع الانحلالي.
	7 أيام	التهاب الأنف المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار .
	7 أيام	الربو المشخص موضوعيا باستقصاءات وظيفية تنفسية و المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.

الجدول رقم 1 . 2 . 22

الإصابات الجلدية أو إصابات الغشاء المخاطي الناتجة عن قطران الفحم الحجري وزيوته (المحتوية على أجزاء تقطير تسمى: فينولية ونفتالينية واسينفتينية وانتراسينية وكريسينية) زفت الفحم الحجري...

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
تحضير واستعمال ومناولة قطران وزيوت	7 أيام	الالتهابات الجلدية الإكزيمية الشكل المتكررة بعد التعرض من جديد
وزفت الفحم الحجري والمواد التي تحتوي		المتكررة بعد التعرض من جديد
عليها خاصة في :		للخطر.
- مصانع فحم الكوك؛		الالتهابات الجلدية المستثارة