

جدول رقم 1 . 1 . 4 مكرر

الاصابات التنفسية بسبب غبار الكريبيدات المعدنية الملبدة أو المنصهرة التي تحتوي على الكوبالت

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
متلازمة تنفسية تهيجية على شكل سعال و ضيق التنفس متكررة بعد التعرض من جديد للخطر.	15 يوما	صناعة و تحويل الكريبيدات المعدنية الملبدة.
إلتهاب قصبي حاد أو شبه حاد مرفوق بعلامات عامة.	30 يوما	شحن الأدوات و القطع المصنوعة من الكريبيدات المعدنية الملبدة .
تليف رئوي منتشر مع تواجد علامات مشخصة إشعاعيا و اضطرابات وظيفية، مثبتا باستقصاء وظيفي تنفسي، و مضاعفاته هي:	20 سنة	صناعة و تحويل الأمزجة المعدنية الفائقة المحتوية أساسا على الكوبالت.
- تعفن رئوي		إعادة شحن وشحن الأدوات و القطع المصنوعة من الأمزجة المعدنية الفائقة المحتوية أساسا على الكوبالت.
- عجز البطين الأيمن		تقنية اللحام و الاستعدادان باستخدام الأمزجة المعدنية الفائقة المحتوية أساسا على الكوبالت.

جدول رقم 1 . 1 . 4 مكرر مرتين

الاصابات السرطانية البدائية بالقصبات الرئوية الناجمة عن استنشاق أغبرة الكوبالت المرتبطة بكربيد التلبيد قبل التلبيد

بيان الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض
سرطان قصبي رئوي بدائي.	35 سنة (بشرط التعرض للخطر لمدة لا تقل عن خمس سنوات)	الأعمال التي تعرض لإستنشاق مزدوج لأغبرة الكوبالت و كاريبيدات التلبيد في صناعة الكاريبيدات المعدنية في مرحلة ما قبل التلبيد(خليط المساحيق، انضغاط، تعديل و صنع المواد قبل التلبيد).