جدول رقم 1.2.8 الإصابات الناتجة عن الفور مالدييد ومكاثيره

القائمة البيانية لأهم الأعمال التي قد تسبب	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
هذه الأمراض		
تحضير واستعمال ومناولة الفورمالدييد	7 أيام	التهابات جلدية تهيجية
ومحاليله (الفورمول) ومكاثيره خاصة :		
	15 يوما	إصابات إكزيمية الشكل متكررة
صناعة المواد الكيماوية انطلاقا من		في حالة التعرض من جديد
الفور مالدييد؛		المخطرأو مثبتة باختبار جلدي
		سطحي.
صناعة المواد البلاستيكية انطلاقا من		<u>.</u>
الفور مول؛		التهاب الأنف المتكرر في حالة
	7 أيام	التعرض من جديد للخطر أو
أعمال اللصق المنجزة بواسطة مواد بلاستيكية		المثبت باختبار.
تحتوي على كمية زائدة من الفور مول ؟		
•		الربو المشخص موضوعيا
عمليات الطهير؟	7 أيام	باستقصاءات وظيفية تنفسية
تجهيز الجلود أو الأقمشة.		و المتكرر في حالة التعرض من
		و المتكرر في حالة التعرض من جديد للخطر أو المثبت باختبار.

جدول رقم 1 . 2. 8 مكرر الإصابات السرطانية الناتجة عن الفور مالدييد

القائمة الحصرية لأهم الأعمال التي قد تسبب هذه الأمراض	أجل التكفل بالعلاج	بيان الأمراض
تحضير الفور مالدييد ومحاليله (الفور مول) الستثناء الأعمال التي تقام في النظام المغلق.	40 سنة (بشرط التعرض للخطر	سرطان البلعوم الأنفي
استعمال الفورمالدييد في مختبرات تحليل	لمدة لا تقل عن 5 سنوات)	
الأنسجة و التشريح و حفظ الموتى باستثناء الأعمال المنجزة في الأنظمة المغلقة .		
معالجة الجلود بالفور مالدييد باستثناء الأعمال المنجزة في الأنظمة المغلقة .		
صناعة راتنجات أوريا فورمول و ميلانين فورمول و فينول فيزمول باستثناء الأعمال المنجزة في		