Microglia TE-copy RNA: scaled expression before and after RUVr
Four mice per condition; circles female, triangles male; descriptive comparison

WT_6mo
Remove all-zero TE copies | 4,911 copies

WT_21mo
Remove all-zero TE copies | 5,008 copies

5xFAD_3mo
Remove all-zero TE copies | 3,394 copies

APOE4_TREM2_3mo
Remove all-zero TE copies | 3,233 copies

WT_6mo
Nonzero + protected RUVr k=1 | 4,911 copies

WT_21mo
Nonzero + protected RUVr k=1 | 5,008 copies

5xFAD_3mo
Nonzero + protected RUVr k=1 | 3,394 copies

APOE4_TREM2_3mo
Nonzero + protected RUVr k=1 | 3,233 copies

WT_6mo
Nonzero + protected RUVr k=2 (sensitivity) | 4,911 copies

WT_21mo
Nonzero + protected RUVr k=2 (sensitivity) | 5,008 copies

5xFAD_3mo
Nonzero + protected RUVr k=2 (sensitivity) | 3,394 copies

APOE4_TREM2_3mo
Nonzero + protected RUVr k=2 (sensitivity) | 3,233 copies

Z-score of mouse mean normalized TE expression
(same eight mice)

WT_3mo
WT_6mo
WT_21mo
5xFAD_3mo
APOE4_TREM2_3mo