blood pressure · Continuous · Standardized mean difference · Comparison: Intervention / Control

Study	Intervention Mean	Intervention SD	Intervention Total	Control Mean	Control SD	Control Total	Weight	Standardized mean difference IV, Random, 95% CI
Carroll 1997	94.000	22.000	60	92.000	20.000	60	15.8%	0.095 [-0.264, 0.453]
Grant 1981	98.000	21.000	65	92.000	22.000	65	16.3%	0.277 [-0.068, 0.623]
Peck 1987	98.000	28.000	40	88.000	26.000	40	12.6%	0.367 [-0.075, 0.808]
Donat 2003	94.000	19.000	200	82.000	17.000	200	23.3%	0.664 [0.463, 0.866]
Stewart 1990	98.000	21.000	50	88.000	22.000	45	13.8%	0.462 [0.054, 0.87]
Young 1995	96.000	21.000	85	92.000	22.000	85	18.3%	0.185 [-0.116, 0.486]
Random-effects model (DerSimonian–Laird)			**500**			**495**	**100.0%**	**0.358 [0.152, 0.565]**

Heterogeneity: $\tau^2 = 0.037$; $Q = 11.914$, $df = 5$ ($P = 0.036$); $I^2 = 58.0\%$

Test for overall effect: $Z = 3.4$ ($P < 0.001$)

95% prediction interval: [-0.072, 0.789]