

BAŞLIK: AYKIRI DEĞERLER (OUTLIERS): TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (12.1 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Aykırı değerlerin doğrusal regresyon gibi modeller üzerindeki etkisi neden ağaç tabanlı modellere göre daha büyüktür?

- A) Ağaç modelleri hiç veri kullanmaz.
- B) Doğrusal modeller tüm veri noktalarının etkisini matematiksel formüle dahil eder, ağaç modelleri ise bölünmelerde medyan/eşik tabanlı çalıştığı için daha az etkilenir.
- C) Doğrusal modeller aykırı değerleri otomatik siler.
- D) Ağaç modelleri sadece kategorik verilerle çalışır.

2. IQR (Interquartile Range) yöntemiyle üst aykırı değer eşiği nasıl hesaplanır?

- A) $Q3 + 1.5 * IQR$
- B) $Medyan * 1.5$
- C) $Ortalama + 2 * Standart Sapma$
- D) $Q1 - 1.5 * IQR$

3. IQR yönteminin ortalama tabanlı yöntemlere (standart sapma yaklaşımı) göre avantajı nedir?

- A) Hiçbir avantajı yoktur.
- B) Sadece kategorik verilerde çalışması.
- C) Daha hızlı hesaplanması.
- D) Çeyreklik değerlere (medyan tabanlı) dayandığı için aykırı değerlerin kendisinden daha az etkilenmesi.

4. Z-Skoru yaklaşımında bir değer aykırı kabul edilmesi için genel kabul gören aralık nedir?

- A) -2.5 ile +2.5 arası dışı
- B) 0 ile 10 arası dışı
- C) -1 ile +1 arası dışı
- D) Sadece pozitif değerler

5. Çok değişkenli (multivariate) aykırı değer tespiti için hangi yöntem tercih edilir?

- A) Sadece ortalama alma
- B) Sadece IQR yöntemi
- C) LOF (Local Outlier Factor)
- D) Label Encoding

CEVAP ANAHTARI

1-B 2-A 3-D 4-A 5-C