

TRABAJO FIN DE GRADO



GRADO EN ESTADÍSTICA

---

# Teoría de Juegos Aplicaciones con R

---

AUTORA: ALICIA XIAO CASAUX VAZQUEZ

TUTOR: JOSE LUIS PINO MEJIAS

Sevilla, Mayo de 2026



# Índice general

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Resumen . . . . .                                            | III       |
| Abstract . . . . .                                           | IV        |
| Índice de Figuras . . . . .                                  | V         |
| Índice de Tablas . . . . .                                   | VII       |
| <b>1. Introducción</b>                                       | <b>1</b>  |
| <b>2. Fundamentos de la Teoría de Juegos</b>                 | <b>3</b>  |
| 2.1. Conceptos básicos . . . . .                             | 3         |
| 2.2. Clasificación de juegos . . . . .                       | 4         |
| 2.2.1. Juegos según el número de jugadores . . . . .         | 4         |
| 2.2.2. Juegos finitos e infinitos . . . . .                  | 4         |
| 2.2.3. Juegos cooperativos y no cooperativos . . . . .       | 5         |
| 2.2.4. Juegos de suma nula . . . . .                         | 5         |
| 2.2.5. Juegos estáticos y dinámicos . . . . .                | 6         |
| 2.2.6. Juegos de información completa e incompleta . . . . . | 6         |
| 2.2.7. Juegos de información perfecta e imperfecta . . . . . | 7         |
| 2.3. Representaciones de los juegos . . . . .                | 7         |
| 2.3.1. Forma normal . . . . .                                | 7         |
| 2.3.2. Forma extensiva . . . . .                             | 7         |
| <b>3. Concepto de solución</b>                               | <b>9</b>  |
| 3.1. Estrategias dominantes . . . . .                        | 9         |
| 3.2. Equilibrio de Nash . . . . .                            | 9         |
| <b>4. Implementación en R</b>                                | <b>11</b> |
| 4.1. Introducción a R como herramienta de análisis . . . . . | 11        |
| 4.2. Representación de juegos en R . . . . .                 | 11        |
| 4.3. Paquetes de R . . . . .                                 | 11        |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 5. Aplicaciones prácticas | 13 |
| Bibliografía              | 15 |

# Resumen

Resumen. . .

# Abstract

Abstract...

# Índice de figuras

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| 2.1. Árbol del juego dinámico . . . . . | 8 |
|-----------------------------------------|---|





# Índice de tablas

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 2.1. Forma normal del juego Piedra, Papel o Tijera . . . . . | 7 |
|--------------------------------------------------------------|---|



# Capítulo 1

## Introducción

La teoría de juegos es la rama del conocimiento matemático que estudia situaciones de toma de decisiones estratégicas en las que intervienen más de un agente decisor y en las que las decisiones de un jugador influyen en los resultados obtenidos por los demás. Este tipo de situaciones aparece de forma natural en numerosos contextos reales. Por ejemplo, en economía es habitual encontrar escenarios que se pueden modelizar en forma de un juego, ya que las decisiones de una empresa, como la fijación de un determinado producto, están claramente condicionadas por las decisiones adoptadas por otra compañía de la competencia.

La teoría de juegos suele situarse en el año 1944, con la publicación del libro *“Theory of Games and Economic Behavior”* escrito por el matemático John von Neumann y el economista Oskar Morgenstern.

Un avance fundamental en el desarrollo de esta disciplina fue la introducción del **equilibrio de Nash**, propuesto por John Nash a principios de la década de 1950. Nash demostró que en todo juego en donde los participantes pueden escoger entre un número finito de estrategias (que pueden ser puras o mixtas) siempre existirá al menos un equilibrio de Nash. Este concepto describe situaciones donde los jugadores eligen su mejor estrategia posible, asumiendo las decisiones de los demás, y ninguno tiene incentivos para cambiar unilateralmente, ya que hacerlo no mejoraría su beneficio. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia bajo el supuesto de que los demás individuos no cambian la suya.

El objetivo de este trabajo es explorar los aspectos teóricos fundamentales de la teoría de juegos y aplicar dichos conceptos mediante el uso del programa informático R. Para ello, se estudiarán los principales tipos de juegos y conceptos de solución. Además, se analizarán distintos ejemplos a través de su implementación práctica.



# Capítulo 2

## Fundamentos de la Teoría de Juegos

### 2.1. Conceptos básicos

La teoría de juegos es un conjunto de herramientas analíticas diseñadas para ayudarnos a comprender los fenómenos que observamos cuando los agentes decisores interactúan. Los supuestos básicos que subyacen a la teoría son que los decisores persiguen objetivos exógenos bien definidos (son racionales) y tienen en cuenta su conocimiento o expectativas sobre el comportamiento de los demás decisores (razonan estratégicamente). Los modelos de la teoría de juegos son representaciones altamente abstractas de clases de situaciones de la vida real. Su carácter abstracto permite que sean utilizados para estudiar una amplia gama de fenómenos.

En un juego podemos destacar los siguientes elementos fundamentales:

#### 1. Jugadores

En todos los modelos de la teoría de juegos, la entidad básica es el jugador. Un jugador puede interpretarse como un individuo (empresas, instituciones, etc) o como un grupo de individuos que toma una decisión.

Los jugadores intentan maximizar su utilidad mediante las acciones que realizan. Suelen tomar decisiones en condiciones de incertidumbre ya que pueden:

- desconocer los parámetros objetivos del entorno
- contar con información imperfecta sobre los sucesos que ocurren durante el juego
- no saber con certeza cuáles serán las acciones de los demás jugadores
- tener incertidumbre acerca del razonamiento de los otros jugadores

Denotaremos por  $N$  al conjunto de jugadores  $N = 1, 2, \dots, n$

#### 2. Estrategia

La estrategia es la planificación que sigue un jugador para elegir entre sus posibles alternativas, a partir de un conjunto de información (información que posee el jugador cuando va a realizar una jugada). Es una regla predeterminada que especifica por completo cómo se intenta responder a cada posible circunstancia en cada etapa del juego.

A diferencia de la acción (diversas elecciones que posee el jugador en cada jugada), la estrategia es mental, no observable por los demás jugadores.

Podemos encontrar dos tipos de estrategias:

- **Estrategias puras:** las elecciones son libres del jugador, es decir, el jugador elige una acción concreta de forma determinista, sin recurrir al azar
- **Estrategias mixtas:** cuando la probabilidad influye

Denotamos por  $\Delta(A_i)$  el conjunto de distribuciones de probabilidad sobre  $A_i$  y nos referimos a un elemento de  $\Delta(A_i)$  como una **estrategia mixta** del jugador  $i$ , suponemos que las estrategias mixtas de los jugadores son aleatorizaciones independientes. Para mayor claridad, a veces nos referimos a un elemento de  $A_i$  como una **estrategia pura**.

Para cualquier conjunto finito  $X$  y cualquier  $\delta \in \Delta(X)$ , denotamos por  $\delta(x)$  la probabilidad que  $\delta$  asigna a  $x \in X$  y definimos el soporte de  $\delta$  como el conjunto de elementos  $x \in X$  tales que  $\delta(x) > 0$ .

### 3. Función de pago

Cada jugador posee una **función de pago**, que notaremos por  $\Pi_i(s_1, \dots, s_n)$  y que refleja la utilidad obtenida por el jugador  $i$ -ésimo cuando cada jugador ha elegido su estrategia, o también se puede considerar como utilidad esperada utilizando el mismo nombre indistintamente, dependiendo de si interviene el azar o no.

Esta función permite comparar distintos perfiles de estrategias y constituye la base para definir conceptos de solución como el equilibrio de Nash.

## 2.2. Clasificación de juegos

Un objetivo primordial de la teoría de juegos es desarrollar criterios racionales para seleccionar una estrategia, los cuales implican dos supuestos importantes:

1. Ambos jugadores son racionales
2. Ambos jugadores eligen sus estrategias solo para promover su propio bienestar

Los juegos se pueden clasificar de diversas maneras y atendiendo a varios criterios.

### 2.2.1. Juegos según el número de jugadores

Atendiendo al número de jugadores se distinguen juegos **bipersnales**, si participan dos jugadores, y juegos **n-personales**, cuando participan más de dos.

### 2.2.2. Juegos finitos e infinitos

Atendiendo al número de alternativas que posee cada jugador, señalaremos los juegos finitos, cuando éstas son un numero finito e infinitos, en otro caso.

### 2.2.3. Juegos cooperativos y no cooperativos

Los **juegos cooperativos** permiten la formación en grupos entre jugadores, conocidos como coaliciones, para que no compitan entre ellos sino que colaboren para conseguir el mismo objetivo coordinando sus decisiones y repartiendo los beneficios obtenidos, por tanto ganan o pierden en conjunto.

En cambio, en los **juegos no cooperativos** los jugadores actúan de forma individual compitiendo entre sí. Cada jugador decide su estrategia de manera autónoma, teniendo en cuenta el comportamiento esperado de los demás participantes. En esta teoría, las oportunidades estratégicas de los jugadores se exploran en detalle y se hacen predicciones sobre su comportamiento empleando la idea del equilibrio de Nash.

**Ejemplo (cooperativo)** Dos empresas acuerdan fijar precios conjuntamente para maximizar beneficios. Pueden repartirse los beneficios como deseen y coordinan sus estrategias.

**Ejemplo (no cooperativo)** El Dilema del Prisionero: dos sospechosos deciden confesar o callar sin posibilidad de acuerdos. Cada uno busca maximizar su propio beneficio de forma individual.

### 2.2.4. Juegos de suma nula

En los juegos de **suma nula**, la suma de los pagos de todos los jugadores es constante. En el caso particular de dos jugadores, la ganancia de uno coincide exactamente con la pérdida del otro.

Desde un punto más general, un juego estratégico  $\langle \{1, 2\}, (A_i), (\succeq_i)_i \rangle$  es estrictamente competitivo si para cualquier  $a \in A$  y  $b \in A$  se cumple que  $a \succeq_1 b$  si y solo si  $b \succeq_2 a$ .

Por tanto, un juego estrictamente competitivo a veces se denomina juego de suma cero, porque si la relación de preferencia  $\succeq_1$  del jugador 1 está representada por la función de pagos  $u_1$ , entonces la relación de preferencia del jugador 2 está representada por  $u_2$ . Luego, se tiene que cumplir  $u_1 + u_2 = 0$ .

En este caso, decimos que el jugador  $i$  aplica el criterio de maximin si elige una acción que es la mejor para él bajo el supuesto de que, haga lo que haga, el jugador  $j$  elegirá su acción para perjudicarlo lo máximo posible.

El estudio sistemático de este tipo de juegos fue iniciado por John von Neumann, quien en 1928 demostró el teorema minimax, que garantiza que en juegos finitos de suma cero con dos jugadores existe un valor del juego y un equilibrio en estrategias mixtas. Esta propiedad explica por qué los juegos de suma cero constituyen una de las pocas clases de juegos para las cuales puede obtenerse una solución única bien definida.

Sin embargo, la mayoría de ejemplos reales son juegos de **suma no nula**, puesto que la ganancia de un jugador no necesariamente se corresponde con la pérdida de otro.

**Ejemplo (suma nula)** Un partido de tenis. Si un jugador gana el partido, el otro lo pierde. La victoria de uno es exactamente la derrota del otro.

**Ejemplo (suma no nula)** Dos empresas deciden si colaborar en un proyecto. Si ambas colaboran, las dos obtienen beneficios. No necesariamente lo que gana una lo pierde la otra.

### 2.2.5. Juegos estáticos y dinámicos

Los juegos **estáticos** o **simultáneos** consisten en que los jugadores eligen sus estrategias simultáneamente sin conocer las decisiones de los demás, y a continuación reciben sus ganancias, que dependen de la combinación de acciones que acaban de elegir.

En cambio, los juegos **dinámicos** o **secuenciales** son aquellos en los que los jugadores toman decisiones en distintos momentos del tiempo. En este caso, las acciones de los jugadores pueden depender de las decisiones observadas previamente, por lo que la información disponible es relevante.

**Ejemplo (estático)**

Competencia de precios entre dos empresas: ambas fijan sus precios al mismo tiempo sin conocer la elección de la otra.

**Ejemplo (dinámico)**

Ajedrez o damas: los jugadores mueven alternadamente, conociendo el estado completo del tablero antes de cada turno.

### 2.2.6. Juegos de información completa e incompleta

En los juegos de **información completa** todos los jugadores tienen la misma información sobre el juego, conocen el conjunto de jugadores, las recompensas, las funciones de pagos y las estrategias disponibles para todos los participantes, y saben que los demás también disponen de esta información.

En los juegos de **información incompleta** también denominados como juegos bayesianos, al menos un jugador desconoce alguna característica del juego, por lo tanto puede causar incertidumbre entre los jugadores.

En los juegos de información completa las ganancias de los jugadores son de dominio público mientras que en los de información incompleta al menos un jugador no está seguro de la función de ganancia de otro jugador.

**Ejemplo (información completa)** Ajedrez: cada jugador conoce todas las reglas, los movimientos posibles y el estado completo del tablero. No hay información oculta; ambos saben la posición de todas las piezas en todo momento.

**Ejemplo (información incompleta)** Poker: cada jugador conoce solo sus propias cartas y no las de los rivales. Las decisiones se basan en probabilidades y comportamiento de los demás jugadores.



### 2.2.7. Juegos de información perfecta e imperfecta

Un juego es de **información perfecta** si, en el turno de cada jugador, este conoce todas las acciones que se han realizado previamente antes de tomar su decisión. Asimismo, se dice que un juego es de **información imperfecta** si un jugador no sabe exactamente qué acciones tomaron otros jugadores hasta ese momento.

Estos conceptos se aplican a juegos dinámicos.

#### Ejemplo (información perfecta)

Tres en raya: cada jugador conoce todas las jugadas previas antes de decidir su siguiente movimiento.

#### Ejemplo (información imperfecta)

Hundir la flota: cada jugador desconoce la ubicación de los barcos del rival y toma decisiones sin observar completamente el estado del juego.

## 2.3. Representaciones de los juegos

### 2.3.1. Forma normal

Los juegos estáticos se representan en **forma normal**, es decir, un juego con  $n$  jugadores especifica los espacios de estrategias de los jugadores  $S_1, \dots, S_n$  y sus funciones de ganancia  $u_1, \dots, u_n$ . Denotamos este juego con  $G = \{S_1, \dots, S_n; u_1, \dots, u_n\}$ .

#### Ejemplo

Piedra, papel o tijera. Dos jugadores eligen simultáneamente una de las tres acciones posibles. Cada uno decide sin conocer la elección del otro y los pagos se determinan según la acción elegida.

|        | Piedra | Papel  | Tijera |
|--------|--------|--------|--------|
| Piedra | (0,0)  | (-1,1) | (1,-1) |
| Papel  | (1,-1) | (0,0)  | (-1,1) |
| Tijera | (-1,1) | (1,-1) | (0,0)  |

Tabla 2.1: Forma normal del juego Piedra, Papel o Tijera

### 2.3.2. Forma extensiva

Los juegos dinámicos se representan en **forma extensiva** que especifica:

1. Los jugadores del juego
- 2a. Cuando cada jugador tiene el turno de mover

- 2b. Que puede hacer cada jugador en cada una de sus oportunidades de movimiento.
- 2c. Que sabe cada jugador en cada una de sus oportunidades de movimiento
3. El pago que recibe cada jugador para cada combinación de acciones que puedan elegir los jugadores.

### Ejemplo

1. El jugador 1 elige una acción  $a_1$  del conjunto factible  $A_1 = \{L, R\}$
2. El jugador 2 observa  $a_1$  y luego elige su acción  $a_2$  del conjunto  $A_2 = \{L', R'\}$
3. Los pagos son  $u_1(a_1, a_2)$  y  $u_2(a_1, a_2)$  como se muestra en el siguiente árbol de juego




Figura 2.1: Árbol del juego dinámico

# Capítulo 3

## Concepto de solución

3.1. Estrategias dominantes

3.2. Equilibrio de Nash



# Capítulo 4

## Implementación en R

- 4.1. Introducción a R como herramienta de análisis
- 4.2. Representación de juegos en R
- 4.3. Paquetes de R



# Capítulo 5

## Aplicaciones prácticas





# Bibliografía

- [1] BINMORE, KEN (2007). *La teoría de juegos: Una breve introducción*. McGraw-Hill, Madrid, España, primera edición.<sup>a</sup> edición. ISBN 9788448177097.
- [2] GIBBONS, ROBERT (1992). *A Primer in Game Theory*. Harvester Wheatsheaf / Prentice Hall, New York, NY, USA.
- [3] OSBORNE, MARTIN J. y RUBINSTEIN, ARIEL (1994). *A Course in Game Theory*. MIT Press. ISBN 9780262650403.
- [4] PINO MEJÍAS, JOSÉ LUIS (2024). «Apuntes de clase». Asignatura: Ampliación de Investigación Operativa.
- [5] ROLDÁN, PABLO N. (2024). «¿Qué es el equilibrio de Nash? Ejemplos y cómo aplicarlo». <https://economipedia.com/definiciones/equilibrio-de-nash.html>.