

# Введение в численные методы. Точные методы решения СЛАУ

Баев А.Ж.

Казахстанский филиал МГУ

11 февраля 2020

# План на семестр

1. СЛАУ (точные методы)
2. СЛАУ (итерационные методы)
3. решение нелинейных уравнений
4. интерполяция
5. аппроксимация
6. интегрирование
7. дифференцирование

# Линейная алгебра

Решение системы линейных алгебраических уравнений:

$$Ax = f$$

где  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $x \in \mathbb{R}^n$ ,  $f \in \mathbb{R}^n$ .

Дано  $A$ ,  $f$ . Найти  $x$ .

# Метод прогонки

Метод прогонки (англ. tridiagonal matrix algorithm)

Алгоритм Томаса (англ. Thomas algorithm)

Дана квадратная трехдиагональная матрица  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ .

Решить СЛАУ  $Ax = f$ .

$$\begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & c_3 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_4 & b_4 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & b_{n-2} & c_{n-2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_n & b_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \\ f_4 \\ \vdots \\ f_{n-2} \\ f_{n-1} \\ f_n \end{pmatrix}$$

# Метод прогонки

В виде строчных соотношений:

$$\begin{cases} b_1x_1 + c_1x_2 & = f_1 \\ a_ix_{i-1} + b_ix_i + c_ix_{i+1} & = f_i, i = 2, \dots, n-1 \\ a_nx_{n-1} + b_nx_n & = f_n \end{cases}$$

# Метод прогонки

1) Добавим фиктивные элементы:  $a_1 = c_n = 0$ .

Добавим фиктивные решения:  $x_0 = x_{n+1} = 0$ .

$$a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = f_i, i = 1, \dots, n \quad (1)$$

## Метод прогонки

2) Допустим  $x_i$  выражаются линейно друг через друга :

$$x_{i-1} = \alpha_i x_i + \beta_i, i = 1, \dots, n+1 \quad (2)$$

Подставим (2) в соотношение (1) при  $i = 1, \dots, n$ :

$$a_i(\alpha_i x_i + \beta_i) + b_i x_i + c_i x_{i+1} = f_i$$

$$(a_i \alpha_i + b_i) x_i + c_i x_{i+1} = f_i - a_i \beta_i$$

$$x_i = \frac{-c_i}{a_i \alpha_i + b_i} x_{i+1} + \frac{f_i - a_i \beta_i}{a_i \alpha_i + b_i}$$

## Метод прогонки

3) Из предположения, что  $x_i = \alpha_{i+1}x_{i+1} + \beta_{i+1}$ ,  $i = 0, \dots, n$ :

$$\begin{cases} \alpha_{i+1} = \frac{-c_i}{a_i \alpha_i + b_i} \\ \beta_{i+1} = \frac{f_i - a_i \beta_i}{a_i \alpha_i + b_i} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n$$

С учетом того, что  $x_0 = 0$  получаем  $\alpha_1 = \beta_1 = 0$ .




# Метод прогонки

Прямой ход прогонки:

$$\begin{cases} \alpha_1 = 0, \beta_1 = 0, \\ \alpha_{i+1} = \frac{-c_i}{a_i \alpha_i + b_i} \\ \beta_{i+1} = \frac{f_i - a_i \beta_i}{a_i \alpha_i + b_i} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n \quad (3)$$

Схема вычисления:




# Метод прогонки

Обратный ход прогонки:

$$\begin{cases} x_{n+1} = 0 \\ x_i = \alpha_{i+1}x_{i+1} + \beta_{i+1}, i = \overline{n, 1} \end{cases} \quad (4)$$

Схема вычисления:



## Метод прогонки (пример)

$$\begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \\ 8 \end{pmatrix}$$

Запишем вектора  $a$ ,  $b$ ,  $c$  и  $f$ :

$$a = (0, 1, 1)$$

$$b = (4, 3, 2)$$

$$c = (3, 1, 0)$$

$$f = (10, 10, 8)$$

## Метод прогонки (пример)

1) Вычислим коэффициенты  $\alpha$  и  $\beta$  прямым ходом прогонки (3):

$$\alpha_1 = 0$$

$$\beta_1 = 0$$

$$\alpha_2 = \frac{-c_1}{a_1\alpha_1 + b_1} = \frac{-3}{0 \cdot 0 + 4} = -\frac{3}{4}$$

$$\beta_2 = \frac{f_1 - a_1\beta_1}{a_1\alpha_1 + b_1} = \frac{10 - 0 \cdot 0}{0 \cdot 0 + 4} = \frac{5}{2}$$

$$\alpha_3 = \frac{-c_2}{a_2\alpha_2 + b_2} = \frac{-1}{1 \cdot (-\frac{3}{4}) + 3} = -\frac{4}{9}$$

$$\beta_3 = \frac{f_2 - a_2\beta_2}{a_2\alpha_2 + b_2} = \frac{10 - 1 \cdot \frac{5}{2}}{1 \cdot (-\frac{3}{4}) + 3} = \frac{10}{3}$$

$$\alpha_4 = \frac{-c_3}{a_3\alpha_3 + b_3} = \frac{0}{1 \cdot (-\frac{4}{9}) + 2} = 0$$

$$\beta_4 = \frac{f_3 - a_3\beta_3}{a_3\alpha_3 + b_3} = \frac{8 - 1 \cdot \frac{10}{3}}{1 \cdot (-\frac{4}{9}) + 2} = 3$$

2) Вычислим решение  $x$  обратным ходом прогонки (4):

$$x_4 = 0$$

$$x_3 = \alpha_4 x_4 + \beta_4 = 0 \cdot 0 + 3 = 3$$

$$x_2 = \alpha_3 x_3 + \beta_3 = -\frac{4}{9} \cdot 3 + \frac{10}{3} = 2$$

$$x_1 = \alpha_2 x_2 + \beta_2 = -\frac{3}{4} \cdot 2 + \frac{5}{2} = 1$$

Ответ:  $x = (1, 2, 3)$ .

## Метод прогонки (реализация)

```
1  sweep(a[1:n], b[1:n], c[1:n], f[1:n]) -> x[1:n]
2      alpha[1:n+1]
3      beta[1:n+1]
4
5      a[1] := 0
6      c[n] := 0
7      alpha[1] := 0
8      beta[1] := 0
9      for i := 1 .. n
10         d := a[i] * alpha[i] + b[i]
11         alpha[i+1] := - c[i] / d
12         beta[i+1] := (f[i] - a[i] * beta[i]) / d
13
14     x[n+1] := 0
15     for i := n .. 1
16         x[i] := alpha[i+1] * x[i+1] + beta[i+1]
17
18     return x[1:n]
```

## Метод прогонки (реализация)

```
1  sweep(a[1:n], b[1:n], c[1:n], f[1:n]) -> x[1:n]
2      alpha[1:n+1]
3      beta[1:n+1]
4
5      a[1] := 0
6      c[n] := 0
7      alpha[1] := 0
8      beta[1] := 0
9      for i := 1 .. n
10         d := a[i] * alpha[i] + b[i]
11         alpha[i+1] := - c[i] / d
12         beta[i+1] := (f[i] - a[i] * beta[i]) / d
13
14     x[n] := beta[n+1]
15     for i := n-1 .. 1
16         x[i] := alpha[i+1] * x[i+1] + beta[i+1]
17
18     return x
```

# Метод прогонки (алгоритмическая сложность)

1. Прямой ход —  $f(n) = 4n$ ;
2. Обратный ход —  $f(n) = n$ ;
3. Итог —  $f(n) = 5n$ .

Асимптотика прямого и обратного хода:  $\Theta(n)$ .

# Метод прогонки (существование решения)

Будем говорить, что матрица имеет **диагональное преобладание**, если

$$|a_{ii}| > \sum_{i \neq j} |a_{ij}|$$

Для матриц с диагональным преобладанием справедливо утверждение, что все главные миноры отличны от нуля и система уравнений имеет единственное решение.



## Метод прогонки (устойчивость решения)

Если матрица обладает диагональным преобладанием, то

$$|\alpha_i| < 1$$

Доказательство:

$$|\alpha_{i+1}| = \left| \frac{c_i}{a_i \alpha_i + b_i} \right| \leq \frac{|c_i|}{|b_i| - |a_i|} < 1$$

Это означает, что ошибка  $x_{i+1} = \alpha_i x_i + \beta_i$  не превышает ошибки в  $x_i$ .

# Метод Холецкого

Пусть  $A = A^T$  и  $A > 0$ . Тогда

$$A = S^T S$$

где  $S$  — верхнетреугольная матрица.

Решение  $Ax = f$  сводится к решению  $S^T y = f$  и  $Sx = y$ .

## Метод Холецкого

$$a_{ij} = \sum_{k=1}^i s_{ki} s_{kj}, j \geq i$$

Получаем:

$$s_{ii} = \sqrt{a_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} s_{ki}^2}, j = i + 1 \dots n$$

$$s_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} s_{ki} s_{kj}}{s_{ii}}, j = i + 1 \dots n$$

Зачем?

# Обусловленность систем (норма вектора)

Введем норму вектора  $\|x\|$ :

1.  $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ .
2.  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$
3.  $\alpha \in \mathbb{R} \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ .

Например:

1.  $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ .
2.  $\|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ .
3.  $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$ .

# Обусловленность систем (норма матрицы)

Матричная норма  $\|A\|$  согласуется нормой вектора  $\|x\|$ :

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

Например:

1.  $\|A\|_1 = \max_i \left( \sum_j |a_{ij}| \right).$
2.  $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i|.$
3.  $\|A\|_\infty = \max_j \left( \sum_i |a_{ij}| \right).$

# Обусловленность систем (основное неравенство)

$$\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$$

# Обусловленность систем

Решаем  $Ax = f$ .

Как сильно может измениться решение  $x$  в результате изменения правой части  $f$ ?

## Обусловленность систем

$$\delta x = x - \tilde{x}$$

$$\delta f = f - \tilde{f}$$

Получаем

$$A(\delta x) = \delta f$$

Выпишем два неравенства

$$\|\delta x\| = \|A^{-1}(\delta f)\| \leq \|A^{-1}\| \cdot \|\delta f\|$$

$$\|f\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Перемножим

$$\|\delta x\| \cdot \|f\| \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \|\delta f\| \cdot \|x\|$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|\delta f\|}{\|f\|}$$



# Обусловленность систем

Чем меньше число обусловленности, тем лучше:

$$\mu = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

Пример матрицы с хорошим число обусловленности

$$\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}$$

Пример матрицы с плохим числом обусловленности

$$\begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 11 \end{pmatrix}$$

## Обусловленность систем

```
1 import numpy as np
2
3 a = np.array([[10, 10], [10, 11]])
4 b = np.linalg.inv(a)
5
6 mu = np.linalg.norm(a) * np.linalg.norm(b)
7 print(mu)
```

Вывод: 42.1000

## Обусловленность систем

```
1 import numpy as np
2
3 a = np.array([[10, 10], [10, 11]])
4
5 mu = np.linalg.cond(a)
6 print(mu)
```

Вывод: 42.0762

## Метод прогонки

```
1 import scipy.linalg as sl
2
3 A = [ [0, 3, 1],
4       [4, 3, 2],
5       [1, 1, 0] ]
6 f = [10, 10, 8]
7 x = np.linalg.solve_banded((1, 1), A, f)
8 print(x)
```

Вывод: [1, 2, 3]

## Разложение Холецкого


```
1 import numpy as np
2
3 L = np.array([ [1, 0, 0],
4               [2, 1, 0],
5               [3, 2, 1] ])
6 A = L.dot(np.transpose(L))
7 print(A)
8
9 L = np.linalg.cholesky(A, lower=True)
10 print(L)
```

# Упражнения

1. Описать как связаны коэффициенты  $\alpha_i$  и  $\beta_i$  с матрицами в  $LU$ —разложении.
2. Докажите, что у матрицы с диагональным преобладанием все угловые миноры ненулевые.
3. Описать метод прогонки для блочно трёхдиагональная матрицы, в которой вместо элементов  $a_i$ ,  $b_i$ ,  $c_i$  находятся подматрицы размера  $k \times k$ , а вместо  $f_i$  — вектор столбец размера  $k$ . Основная идея:  
 $x_{i-1} = \alpha_i x_i + \beta_i$ , где  $\alpha_i \in \mathbb{R}^{k \times k}$ ,  $\beta_i \in \mathbb{R}^k$ .

# Графики

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2 y = [1, 5, 2, 4, 3]
3 plt.plot(y)
4 plt.show()
```



## Домашнее задание №1

1. Сравнить решение СЛАУ методом Гаусса библиотечной функцией `np.linalg.solve` со своей реализацией на случайной матрицей с диагональным преобладанием размером  $100 \times 100$ ,  $200 \times 200$  и т.д. Провести несколько экспериментов, пока время счёта меньше 1 сек. Построить графики зависимостей.
2. Сравнить решение СЛАУ методом Холецкого библиотечной функцией `np.linalg.cholesky` со своей реализацией на случайной положительно определённой матрицей с диагональным преобладанием размером  $100 \times 100$ ,  $200 \times 200$  и т.д. Провести несколько экспериментов, пока время счёта меньше 1 сек. Построить графики зависимостей.
3. Сравнить решение СЛАУ методом прогонки библиотечной функцией `np.linalg.solve_banded` со своей реализацией на случайной трехдиагональной матрице с диагональным преобладанием размером  $1000 \times 1000$ ,  $2000 \times 2000$  и т.д. Провести несколько экспериментов, пока время счёта меньше 1 сек. Построить графики зависимостей.