

XI Республиканская студенческая предметная олимпиада по направлению «Математика»  
18 апреля 2019

1. (Баев А.Ж.)

Умножим числитель и знаменатель отдельного элемента ряда на  $2^{n-1}$ :

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^n} \cdot \frac{n+1}{n(n-1)} &= \frac{2^{n-1}(n+1)}{2^n n \cdot 2^{n-1}(n-1)} = \frac{2^n n - 2^{n-1}(n-1)}{2^n n \cdot 2^{n-1}(n-1)} = \\ &= \frac{1}{2^{n-1}(n-1)} - \frac{1}{2^n n}.\end{aligned}$$

Обозначив  $b_n = \frac{1}{2^n n}$ , перепишем наш ряд в виде

$$\sum_{n=2}^{\infty} (b_{n-1} - b_n) = b_1 = \frac{1}{2}.$$

Ответ:  $\frac{1}{2}$ .

2. (Васильев А.Н.)

Допустим,  $x = \frac{p}{q}$  и  $y = \frac{m}{n}$  — несократимые дроби. Тогда

$$\left(\frac{p}{q}\right)^{\frac{m}{n}} = \frac{p}{q} + \frac{m}{n}$$

Чтобы значение левой части равенства было рациональным, необходимо  $p = a^n$ ,  $q = b^n$  для некоторых натуральных  $a$  и  $b$ .

$$\frac{a^m}{b^m} = \frac{a^n}{b^n} + \frac{m}{n} \iff \frac{a^m b^n - a^n b^m}{b^{n+m}} = \frac{m}{n}$$

Приведём дробь в левой части к несократимому виду. При  $n > m$

$$\frac{a^m(b^{n-m} - a^{n-m})}{b^n} = \frac{m}{n}$$

и при  $n < m$

$$\frac{a^n(a^{m-n} - b^{m-n})}{b^m} = \frac{m}{n},$$

а случай  $m = n$ , очевидно, не возможен. Получаем, что  $n = b^{\max(m,n)}$  и в любом случае  $n \geq b^n$ , или  $b \leq n^{\frac{1}{n}}$ . Но  $n^{\frac{1}{n}} < 2$  при любом  $n$ , и поэтому решение возможно только при  $b = 1$  и  $n = 1$ .

Так, задача свелась к решению в целых числах. Обязательно должно выполняться  $x \geq 2$  и  $y \geq 2$ , поскольку варианты  $x = 1$  и  $y = 1$  не возможны. Пусть  $y > 2$ , тогда

$$x(x^{y-1} - 1) \geq 2(2^{y-1} - 1) > y.$$

Следовательно,  $y = 2$ , а  $x$  можно найти, решив уравнение  $x^2 = x + 2$ .

Ответ:  $(2, 2)$ .

3. (Васильев А.Н.)

Обозначим  $g(\lambda) = \int_0^1 |f(x) - \lambda| dx$ . Функция  $f(x)$  интегрируема на данном отрезке интегрирования, а значит,  $g(\lambda)$  непрерывна на  $\mathbb{R}$ .

а) Функция  $f(x)$  интегрируема на  $[0, 1]$ , а значит, ограничена на нём. Пусть  $m = \inf_{x \in [0, 1]} f(x)$ ,  $M = \sup_{x \in [0, 1]} f(x)$ . Очевидно, что функция  $g(\lambda)$  убывает на  $(-\infty, m)$  и возрастает на  $(M, +\infty)$ .

А так как  $g(\lambda)$  непрерывна на сегменте  $[m, M]$ , то она достигает на нём своего минимума, который при этом является глобальным. Следовательно, множество  $\mathcal{M}(f)$  не пустое.

б) Для  $f(x) = \operatorname{sgn}(2x - 1)$  функция  $g(\lambda)$  будет постоянной на отрезке  $[-1, 1]$ , что даёт  $\mathcal{M}(f) = [-1, 1]$ .

в) Без ограничения общности можно считать, что  $f(x)$  нестрого возрастающая. Пусть  $f(c-0) \leq \lambda \leq f(c+0)$  для некоторого  $c \in [0, \frac{1}{2}]$  (случай  $c \in [\frac{1}{2}, 1]$  рассматривается аналогично). Тогда

$$g(\lambda) = \int_0^c (\lambda - f(x)) dx + \int_c^1 (f(x) - \lambda) dx =$$

$$= \lambda(2c - 1) + \int_0^1 f(x) dx - 2 \int_0^c f(x) dx,$$

$$g\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \int_0^1 f(x) dx - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx,$$

$$g(\lambda) - g\left(f\left(\frac{1}{2}\right)\right) = \lambda(2c - 1) + 2 \int_c^{\frac{1}{2}} f(x) dx \geq \lambda(2c - 1) + 2 \int_c^{\frac{1}{2}} \lambda dx = 0.$$


Следовательно,  $f\left(\frac{1}{2}\right) \in \mathcal{M}(f)$ .

г) Примером такой функции может служить  $f(x) = |2x - 1|$ . Здесь  $g(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + \frac{1}{2}$  на  $[0, 1]$ , и  $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \notin \mathcal{M}(f) = \{\frac{1}{2}\}$ .

4. (Абдикалыков А.К.)

Пусть  $\lambda_1, \lambda_2$  — собственные значения матрицы  $A$ , тогда  $\mu_1 = \lambda_1^2 + \lambda_1 + 2019$  и  $\mu_2 = \lambda_2^2 + \lambda_2 + 2019$  будут собственными значениями матрицы  $A^2 + A + 2019E$ . Но тогда по условию  $(\lambda_1^2 + \lambda_1 + 2019)(\lambda_2^2 + \lambda_2 + 2019) = 0$ , и один из множителей должен быть равным нулю. Без ограничения общности будем считать, что  $\lambda_1^2 + \lambda_1 + 2019 = 0$ . В таком случае  $\lambda_1 = \frac{1}{2}(-1 \pm i\sqrt{4075})$  — комплексное число, а так как  $A$  — вещественная матрица, то  $\lambda_2 = \overline{\lambda_1} \neq \lambda_1$  и  $A$  имеет два линейно независимых собственных вектора  $x_1$  и  $x_2$ . Те же векторы будут собственными и для  $A^2 + A + 2019E$ , но уже для собственных чисел  $\mu_1 = \lambda_1^2 + \lambda_1 + 2019 = 0$  и  $\mu_2 = \lambda_2^2 + \lambda_2 + 2019 = \overline{\lambda_1^2 + \lambda_1 + 2019} = 0$ . Следовательно,  $A^2 + A + 2019E = O$ .

5. (Баев А.Ж.)



В решении задачи никак не используется эллипс. Достаточно заметить, что  $CA = CA_1 = CA_2 = a$ ,  $CB = CB_1 = CB_2 = b$  в силу симметрии. Также верно, что  $\angle ACD = \angle A_1CD$  и  $\angle ACE = \angle A_2CE$ . Значит,

$$\angle DCE = \angle ACD + \angle ACE = \frac{1}{2}\angle ACA_1 + \frac{1}{2}\angle ACA_2 = \frac{1}{2}\angle A_1CA_2$$

Таким образом угол  $\angle A_1CA_2 = 2\alpha$ ; аналогично  $\angle B_1CB_2 = 2\alpha$ . Осталось выразить все неизвестные через  $a$ ,  $b$ ,  $\alpha$  по теореме косинусов:

$$\frac{A_1A_2^2 + B_1B_2^2}{CA^2 + CB^2} = \frac{2a^2 - 2a^2 \cos 2\alpha + 2b^2 - 2b^2 \cos 2\alpha}{a^2 + b^2} = 2(1 - \cos 2\alpha) = 4 \sin^2 \alpha$$

Ответ: а) 2; б) 4.

6. (Клячко А.А.)

Очевидно, что если целочисленная система линейных уравнений разрешима, то она разрешима и по любому модулю. Предположим теперь, что у нас есть система с  $n$  неизвестными  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , разрешимая по любому модулю. Элементарными преобразованиями эту систему можно привести к трапецевидной форме  $Ax = b$  (также с целыми коэффициентами). Так как по предположению система разрешима по любому модулю, то в этой форме не будет строк, где ненулевым будет только свободный коэффициент. Пусть  $M = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k > 0$ , где  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$  — ведущие элементы строк матрицы  $A$ , которые без ограничения общности можно считать положительными. По условию  $\exists x', c \in \mathbb{Z}^k : Ax' = b + Mc$ . Найдём такой вектор  $\Delta x \in \mathbb{Z}^n$ , что  $A\Delta x = -Mc$ . Это можно сделать обратным ходом метода Гаусса, предполагая нулевыми все компоненты  $\Delta x$ , не соответствующие ведущим коэффициентам рассматриваемой на данном шаге строки. Тогда  $x = x' + \Delta x$  будет решением исходной системы.