



5-10 ملی گرام ڈائی زییم نس، منہ یا ریکٹم (مقعد) کے ذریعے اس وقت تک دیں جب تک کہ مریض ٹیم بے ہوشی کی حالت میں آجا ہے۔ اگر نفسیاتی علامات ڈائی زییم سے بہتر نہیں ہوتیں، تو اپنٹی سائیکوئک جیسے ہیلو پیریڈول 1-2.5 ملی گرام انجکشن(منہ یا پٹھوں) کے ذریعے دیں۔ اگر نفسیاتی علامات برقرار رہیں تو سائیکوسس کی تشخیص کیلئے سائیکا ٹرسٹ یا ماہر نفسیات کو

شخص نے پھیلے کچھ دنوں میں stimulants استعمال کیا ہے: پھیلی ہوئی پتلیاں، پرجوش ردیہ، تیز خیالات، بے ترتیب سوچ، عجیب ردیہ، نشے کا حال ہی میں استعمال، نبض اور ہلڈ پریشر میں اضافہ،

stimulants میں نوجن کے نشنے کا شبہ (Hallucinogens Intoxication

🗡 ڈائی ذی یام ۱۰-۵ ملی گرام سانس یا مقصد (rectum)کے ذریعے اس وقت تک دیں . جب تک

\\ اگر نفسیاتی علامات ڈائی دی پام سے بہتر نہیں ہوتی تو اینٹی سائیکوئک جیے ہلوپیریڈول ۱ سے ۵ ملی

ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کیے جانے والے اقدامات کے بعد، ضرورت کے

مطابق SUB1 تشخیص اور SUB2 مینجمنٹ پروٹوکول 1 سے 6 پر جائیں۔

غصیله، بے ترتیب، یا پر تشدد رویہ

مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں آ جائے.

🔏 اگر نفسیاتی علامات برقرار رہیں تو psychiatrist کو ریفر کریں۔

گرام منہ یا پھٹوں کے ذریعے دیں.