FluidoDinamica e Biofluidodinamica

CONTENTS

1	Idrostatica	. 3
	1.1 Pressione idrostatica	3
	1.2 Forza complessiva su parete piana	3
	1.3 Calcolo del centro di Pressione	3
	1.3.1 Momento d'inerzia	4
2	Title 1	
	11115 1	. 4
	2.1 Title 2	4
	2.1 Title 2	4
	2.1 Title 2	4

Document made with typst: Link to typst documentation

IDROSTATICA

1.1 Pressione idrostatica

1.

2.

$$p = \rho g h$$

• h: profondità $\rightarrow m$

• ρ : densità $\rightarrow \frac{\text{kg}}{m^3}$

1.2 Forza complessiva su parete piana

$$F = \int_{A} p(y) \cdot dA =$$

$$= \int_{A} \rho gy \sin(\alpha) dA =$$

$$= \rho g \sin(\alpha) \cdot \int_{A} y dA$$

$$\rho g \sin(\alpha) \cdot y_{G} A$$

oppure

 $\rho g h_G A$

 $\begin{array}{l} \bullet \ p_g = \rho g h_g \\ \bullet \ h_g = y_G \cdot \sin(\alpha) \end{array}$

• $h_g = y_G \cdot \sin(\alpha)$

• $h_g \rightarrow$ Profondità del centro di massa.

• $h_q^{\sigma} o$ Profondità del centro di massa.

1.3 Calcolo del centro di Pressione

Calcolo del centro di pressione di una superficie:

 $\bullet L : Lunghezza$

ullet b : Estensione

 $\bullet A : Area = L \cdot b$

 $\bullet \alpha$: Inclinazione del piano

La formula di partenza è il bilancio dei momenti agenti sulla superficie immersa:

$$F \cdot c_p = \int_A p(y) \cdot y \, \mathrm{d}A$$

Per F vale la equazione 2:

5.

$$F = \rho g h_G A =$$

$$= \rho g y_G \sin(\alpha) L b$$

 y_G : Profondità nella direzione dell'inclinazione

Mentre per la parte di destra della equazione 4:

$$\begin{split} \int_A p(y) \cdot y \, \mathrm{d}A &= \rho g \sin(\alpha) \int_A y^2 \, \mathrm{d}A \\ \text{Poichè: } I_x &= \int_A y^2 \, \mathrm{d}A \\ \Rightarrow \rho g \sin(\alpha) I_x \end{split}$$

Sostituendo:

6.

$$\begin{split} \varrho g \sin(\alpha) y_G A \cdot c_p &= \varrho g \sin(\alpha) I_x \\ y_G A \cdot c_p &= I_x \end{split}$$

Applicando il teorema degli assi paralleli:

 $I_x = I_{x,G} + y_G A$

Possiamo scrivere:

 $y_G \cdot A \cdot c_p = I_{x,G} + y_G^2 A$ 9. $c_p = \frac{I_{x,G}}{y_G \cdot A} + \frac{y_G^2 A}{y_G \cdot A}$

 $\Rightarrow c_p = \frac{I_{x,G}}{y_G \cdot A} + y_G$

1.3.1 Momento d'inerzia

Di seguito le formule per i momenti di inerzia $I_{G,x}$ per diverse forme:

Rettangolo:

11. $I_{G,x} = \frac{bL^3}{12}$

Nota.

La lunghezza L è perpendicolare all'asse neutro, per capirci la linea che si manifesta nel piegare esageratamente la superficie con i momenti agenti.

Cerchio $I_{G,x} = \frac{\pi R^4}{64}$

2 TITLE 1

2.1 Title 2

2.1.1 Title 3

2.1.1.1 Title 4

2.1.1.1.1 Title 5