

Appunti di Algebra Lineare

Contents

1 Sistemi Lineari	2
2 VETTORI E MATRICI	2
2.1 DEFINIZIONI	2
2.2 MATRICI	5

1 Sistemi Lineari

Definizione Teorema Fondamentale dell'algebra

Considerando un polinomio di grado n , a coefficienti complessi:

$$\bullet P(z) = a_n z^n + \dots + a_1 z + Q_0 \quad \text{Dove } a_i \in \mathbb{C}, z_n \neq 0$$

Si dice che $z_0 \in \mathbb{C}$ è una radice di P se:

$$P(z_0) = 0$$

2 VETTORI E MATRICI

2.1 DEFINIZIONI

Definizione Spazio vettoriale

Uno spazio vettoriale \mathbb{V} su un campo \mathbb{F} è un insieme dotato di un'addizione e di una moltiplicazione per scalare che soddisfano le proprietà assiali (chiusura, associatività, elemento neutro, inverso additivo, distributività, compatibilità con scalari, moltiplicazione per 1).

Esempio:

$$\mathbb{R}^n$$

Definizione Linearmente Indipendenti/dipendenti

I vettori $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ si dicono **linearmente indipendenti** se vale l'implicazione:

$$\lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k = \underline{0} \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_k = 0$$

In caso contrario si dice che v_1, \dots, v_k sono **linearmente dipendenti**.

Nota:

- Proprietà attribuibile ad una collezione di vettori, riga o colonna che siano.
- Le matrici sono una lista di vettori riga o vettori colonna, quindi si può stabilire la dipendenza lineare di righe e di colonne, vedere la definizione di **Rango**.

Esempio:

Confronto tra 1,2,3 vettori:

	lin. Ind.	lin. Dip.
$v_1 \in \mathbb{R}^n$	Se v_1 non nullo	nullo
$v_1, v_2 \in \mathbb{R}^n$	Se non sono paralleli tra loro	paralleli
$v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^n$	Se non complanari	Complanari

Definizione Base

Una base di un spazio vettoriale è una collezione di vettori linearmente indipendenti che genera lo spazio.

Esempio:

$$e = \begin{pmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Definizione Span

È lo spazio vettoriale generato dalla combinazione lineare di un insieme di vettori

2.2 MATRICI

Definizione Rango (o caratteristica)

Sia $A \in \text{Mat}(m, n)$, si può dimostrare che il massimo numero di righe linearmente indipendenti coincide con il massimo numero di colonne linearmente indipendenti.

Esempio:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$(1 \ 0 \ 2)$ e $(-1 \ 1 \ 0)$ sono linearmente indipendenti (perchè non sono paralleli), per cui il numero massimo di colonne linearmente indipendenti sarà 2.