

# Задачник по эконометрике-1

(с шахматами и поэтэссами)

Дмитрий Борзых, Борис Демешев

19 сентября 2012 г.

1. Регрессионная модель задана в матричном виде при помощи уравнения  $y = X\beta + \varepsilon$ , где  $\beta =$ . Известно, что  $\mathbb{E}(\varepsilon) = 0$  и  $\text{Var}(\varepsilon) = \sigma^2 \cdot I$ . Известно также, что  $y =$ ,  $X =$ . Для удобства расчетов ниже приведены матрицы  $X'X =$  и  $(X'X)^{-1} =$ .
  - (a) Укажите число наблюдений.
  - (b) Укажите число регрессоров с учетом свободного члена.
  - (c) Рассчитайте  $TSS = \sum(y_i - \bar{y})^2$ ,  $RSS = \sum(y_i - \hat{y}_i)^2$  и  $ESS = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$ .
  - (d) Рассчитайте при помощи метода наименьших квадратов  $\hat{\beta}$ , оценку для вектора неизвестных коэффициентов.
  - (e) Чему равен  $\hat{\varepsilon}_5$ , МНК-остаток регрессии, соответствующий 5-ому наблюдению?
  - (f) Чему равен  $R^2$  в модели? Прокомментируйте полученное значение с точки зрения качества оцененного уравнения регрессии.
  - (g) Используя приведенные выше данные, рассчитайте несмещенную оценку для неизвестного параметра  $\sigma^2$  регрессионной модели.
  - (h) Рассчитайте  $\widehat{\text{Cov}}(\hat{\beta})$ , оценку для ковариационной матрицы вектора МНК-коэффициентов  $\hat{\beta}$ .
  - (i) Найдите  $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1)$ , несмещенную оценку дисперсии МНК-коэффициента  $\hat{\beta}_1$ .
  - (j) Найдите  $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_2)$ , несмещенную оценку дисперсии МНК-коэффициента  $\hat{\beta}_2$ .
  - (k) Найдите  $\widehat{\text{Cov}}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$ , несмещенную оценку ковариации МНК-коэффициентов  $\hat{\beta}_1$  и  $\hat{\beta}_2$ .
  - (l) Найдите  $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2)$ ,  $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)$ ,  $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 + \hat{\beta}_3)$ ,  $\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 - 2\hat{\beta}_3)$
  - (m) Найдите  $\text{Corr}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)$ , оценку коэффициента корреляции МНК-коэффициентов  $\hat{\beta}_1$  и  $\hat{\beta}_2$ .
  - (n) Найдите  $s_{\hat{\beta}_1}$ , стандартную ошибку МНК-коэффициента  $\hat{\beta}_1$ .
2. Априори известно, что парная регрессия должна проходить через точку  $(x_0, y_0)$ .
  - (a) Выведите формулы МНК оценок;
  - (b) В предположениях теоремы Гаусса-Маркова найдите дисперсии и средние оценок

Вроде бы равносильно переносу начала координат и применению результата для регрессии без свободного члена. Должна остаться несмещенность.
3. Слитки-вариант. Перед нами два золотых слитка и весы, производящие взвешивания с ошибками. Взвесив первый слиток, мы получили результат 300 грамм, взвесив второй слиток — 200 грамм, взвесив оба слитка — 400 грамм. Предположим, что ошибки взвешивания — независимые одинаково распределенные случайные величины с нулевым средним.
  - (a) Найдите несмещенную оценку веса первого шара, обладающую наименьшей дисперсией.

- (b) Как можно проинтерпретировать нулевое математическое ожидание ошибки взвешивания?

Как отсутствие систематической ошибки.

## 1 МНК без матриц и вероятностей

1. Даны  $n$  пар чисел:  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ . Мы прогнозируем  $y_i$  по формуле  $\hat{y}_i = \hat{\beta}x_i$ . Найдите  $\hat{\beta}$  методом наименьших квадратов.  $\hat{\beta} = \sum x_i y_i / \sum x_i^2$
2. Даны  $n$  чисел:  $y_1, \dots, y_n$ . Мы прогнозируем  $y_i$  по формуле  $\hat{y}_i = \hat{\beta}$ . Найдите  $\hat{\beta}$  методом наименьших квадратов.  $\hat{\beta} = \bar{y}$
3. Даны  $n$  пар чисел:  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ . Мы прогнозируем  $y_i$  по формуле  $\hat{y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x_i$ . Найдите  $\hat{\beta}_1$  и  $\hat{\beta}_2$  методом наименьших квадратов.  $\hat{\beta}_2 = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sum (x_i - \bar{x})^2$ ,  $\hat{\beta}_1 = \bar{y} - \hat{\beta}_2 \bar{x}$
4. Даны  $n$  пар чисел:  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ . Мы прогнозируем  $y_i$  по формуле  $\hat{y}_i = 1 + \hat{\beta}x_i$ . Найдите  $\hat{\beta}$  методом наименьших квадратов.  $\hat{\beta} = \sum x_i (y_i - 1) / \sum x_i^2$
5. Перед нами два золотых слитка и весы, производящие взвешивания с ошибками. Взвесив первый слиток, мы получили результат 300 грамм, взвесив второй слиток — 200 грамм, взвесив оба слитка — 400 грамм. Оцените вес каждого слитка методом наименьших квадратов.  $(300 - \hat{\beta}_1)^2 + (200 - \hat{\beta}_2)^2 + (400 - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2)^2 \rightarrow \min$
6. Регрессия на дамми-переменную...
7. Функция  $f(x)$  дифференцируема на отрезке  $[0; 1]$ . Найдите аналог МНК-оценок в непрерывном случае, т.е. найдите минимум по  $\hat{\beta}_1$  и  $\hat{\beta}_2$  для функции

$$Q(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) = \int_0^1 (f(x) - (\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 x))^2 dx \quad (1)$$

## 2 Голая линейная алгебра

Здесь будет собран минимум задач по линейной алгебре.

1. Приведите пример таких  $A$  и  $B$ , что  $\det(AB) \neq \det(BA)$ . Например,  $A = (1, 2, 3)$ ,  $B = (1, 0, 1)'$