


# 课程信息

- 作业提交时间：3月11日（周四）23:59，线上提交
- 第一章作业：
  1. 阅读黄昆《固体物理学》第一章1-1至1-7小节，并总结其主要知识结构或知识点（不超过半页A4纸）
  2. 画出体心立方、面心立方、六角密排与金刚石晶格结构；
  3. 书后习题1.3，1.7；

## 4. (2019年期末考试题)


甲基胺碘化铅是近年来发现的一种新型卤化物钙钛矿半导体材料，其晶格结构属于立方晶系，如下图所示。其中，甲基胺离子 ( $\text{CH}_3\text{NH}_3^+$ ) 位于立方体的顶角，碘离子 ( $\text{I}^-$ ) 位于立方体的面心，铅离子 ( $\text{Pb}^{2+}$ ) 位于立方体的体心。



- 1) 在如图所示的甲基胺碘化铅晶胞中，分别包含几个甲基胺离子、碘离子和铅离子？由此写出甲基胺碘化铅的化学式
- 2) 为满足理想的立方晶格结构，甲基胺离子、碘离子和铅离子的半径需要满足怎样的关系？
- 3) 试写出此晶格的布拉伐格子数学表达式。

## 5. (2020年期末考试题)

石墨烯可由机械剥离石墨制备，是一种由碳原子组成的二维材料，厚度仅为一个原子层。石墨烯的晶体结构如下图所示，其原子成六角蜂窝状排布，相邻原子间距为 $a$ 。



- 1) 画出石墨烯的一个**原胞**，并写出其对应的基矢表达式。注意：一个石墨烯的原胞中包含几个原子？
- 2) 试找出石墨烯**晶体**的所有对称操作。


# 第一章

## 晶体结构（二）



## 晶面的标志

晶体的晶面 —— 在布拉伐格子中作一簇平行的平面，这些相互平行、等间距的平面可以将所有的格点包括无遗

—— 这些相互平行的平面称为晶体的晶面



同一个格子，两组不同的晶面族




取某一原子为原点 $O$ ，原胞的三个基矢  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$

为坐标系的三个轴，不一定相互正交

—— 晶格中一族的晶面  
不仅平行，并且等距

—— 一族晶面必包含了  
所有格点而无遗漏





设  $\bar{a}_1, \bar{a}_2, \bar{a}_3$  末端上的格点分别落在离原点的距离


$h_1d, h_2d, h_3d$  的晶面上

$h_1, h_2, h_3$  —— 整数

$d$  —— 晶面间距

—— 最靠近原点的晶面  
在坐标轴上的截距

$$\frac{a_1}{h_1}, \frac{a_2}{h_2}, \frac{a_3}{h_3}$$






—— 同族中其它晶面的截距是  $\frac{a_1}{h_1}, \frac{a_2}{h_2}, \frac{a_3}{h_3}$  的整数倍







密勒指数 ——  $(h_1 h_2 h_3)$

标记这个晶面系

—— 以单胞的基矢为参考，  
所得出的晶列指数和晶面的  
密勒指数，有着重要的意义



# 立方晶格的几种主要晶面标记






晶面密勒指数和晶面法线的晶向指数完全相同

(100) 面等效的晶面数分别为：3个 表示为  $\{100\}$

(110) 面等效的晶面数分别为：6个 表示为  $\{110\}$

(111) 面等效的晶面数分别为：4个 表示为  $\{111\}$



—— 符号相反的晶面指数只是在区别晶体的外表面时才有意义, 在晶体内部这些面都是等效的

## § 1.4 晶体的对称性


对称操作 —— 一个物体在某一个正交变换下保持不变  
—— 物体的对称操作越多，其对称性越高

### 1. 立方体的对称操作


1) 绕三个立方轴转动

$$\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$$

—— 9个对称操作



2) 绕6条面对角线轴转动  $\pi$  —— 共有6个对称操作




3) 绕4个立方体对角线

轴转动  $\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$

—— 8个对称操作

4) 不变操作


—— 1个对称操作





5) 以上24个对称操作加中心反演仍是对称操作

—— 立方体的对称操作共有48个



取中心为原点，将晶体中任一点  $(x_1, x_2, x_3)$  变成  $(-x_1, -x_2, -x_3)$



## 2 正六面柱的对称操作

1) 绕中心轴线转动  $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$  —— 5个


2) 绕对棱中点连线转动  $\pi$  —— 3个

3) 绕相对面中心连线转动  $\pi$   
—— 3个

4) 不变操作 —— 1个

5) 以上12个对称操作加中心  
反演仍是对称操作

—— 正六面柱的对称操作有24个



### 3 对称素

“对称素”——简洁明了地概括一个物体的对称性

对称素——一个物体的旋转轴、旋转—反演轴

一个物体绕某一个转轴转动  $2\pi / n$ ，以及其倍数不变时  
——该轴为物体 **n重旋转轴**，计为  $n$

一个物体绕某一个转轴转动  $2\pi / n$  加上中心反演的联合操作，以及其联合操作的倍数不变时  
——该轴为物体 **n重旋转—反演轴**，计为  $\bar{n}$

# 立方体

立方轴  $(\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2})$  为4重轴，计为4




同时也是4重旋转—反演轴，计为  $\bar{4}$

面对角线  $(\pi)$  为2重轴，计为2

同时也是2重旋转—反演轴，计为  $\bar{2}$

体对角线轴  $(\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3})$  为3重轴，计为3

同时也是2重旋转—反演轴，计为  $\bar{3}$




## 对称素 $\bar{2}$ 的含义

—— 先绕轴转动，再作中心反演

A''点实际上是A点在通过中心垂直于转轴的平面M的镜像，  
表明对称素  $\bar{2}$  存在一个对称面M

—— 对称素为镜面

一个物体的全部对称操作  
构成一个对称操作群



## 4 群的概念

—— 群代表一组“元素”的集合， $G \equiv \{E, A, B, C, D, \dots\}$   
这些“元素”被赋予一定的“乘法法则”，满足下列性质：

- 1) 集合 $G$ 中任意两个元素的“乘积”仍为集合内的元素  
—— 若  $A, B \in G$ , 则  $AB = C \in G$ . 叫作群的封闭性
- 2) 存在单位元素 $E$ , 使得所有元素满足:  $AE = A$
- 3) 对于任意元素 $A$ , 存在逆元素 $A^{-1}$ , 有:  $AA^{-1} = E$
- 4) 元素间的“乘法运算”满足结合律:  $A(BC) = (AB)C$


单位元素 —— 不动操作

任意元素的逆元素 —— 绕转轴角度 $\theta$ ，其逆操作为绕转轴角度 $-\theta$ ；中心反演的逆操作仍是中心反演；

连续进行A和B操作  
—— 相当于C操作

A 操作 —— 绕OA轴转动 $\pi/2$   
—— S点转到T'点

B 操作 —— 绕OC轴转动 $\pi/2$   
—— T'点转到S点



上述操作中S和O没动，而T点转动到T'点  
—— 相当于一个操作C：绕OS轴转动 $2\pi/3$


表示为  $C = BA$

—— 群的封闭性

可以证明

$$A(BC) = (AB)C$$

—— 满足结合律





## 晶体中存在多少个多重轴？

设想有一个对称轴垂直于平面，平面内晶面的格点可以用  $l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2$  来描述

—— 绕通过A的转轴的任意对称操作，转过角度 $\theta$

B点转到B'点 —— B'点必有一个格点




A和B两点等价——以通过B点的轴顺时针转过 $\theta$

A点转到A'点

—— A'点必有一个格点

且有  $\overline{B'A'} = n\overline{AB}$  ——  $n$ 为整数



$$\overline{B'A'} = n \overline{AB}$$

$$\overline{B'A'} = \overline{AB}(1 - 2\cos\theta)$$


$$1 - 2\cos\theta = n$$

$$\cos\theta: -1 \sim +1$$

$$n = -1, 0, 1, 2, 3$$

$$\theta = 0^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 180^\circ$$

——任何晶体的宏观对称性只能有以下十种对称素



$$1, 2, 3, 4, 6$$


$$\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{6}$$

点群 —— 以10种对称素为基础组成的对称操作群

十种对称素      1, 2, 3, 4, 6  
                      $\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$

—— 长方形、正三角形、正方形和正六方形可以在平面内周期性重复排列

—— 正五边形及其它正n边形则不能作周期性重复排列



理论证明由10种对称素只能组成32种不同的点群

—— 晶体的宏观对称只有32个不同类型

$C_1$

—— 不动操作，只含一个元素，表示没有任何对称性的晶体

回转群  $C_n$


只包含一个旋转轴的点群  $C_2, C_3, C_4, C_6$  —— 4个

—— 下标表示是几重旋转轴


双面群  $D_n$

包含一个n重旋转轴和n个与之对应的二重轴的点群

$D_2, D_3, D_4, D_6$  —— 4个



群 —— 立方点群, 含有**48**个对称操作



群 —— 正四面体点群, 含有**24**个对称操作



群 —— 立方点群  $O_h$  的**24**个纯转动操作



群 —— 正四面体点群  $T_d$  的**12**个纯转动操作



群  $T$  群加上中心反演

点对称操作加上平移操作构成空间群。全部晶体构有  
**230**种空间群, 即有**230**种对称类型。

## § 1.7 晶格的对称性


—— 32种点群描述的晶体对称性

—— 对应的只有14种布拉伐格子

—— 分为7个晶系

—— 单胞的三个基矢  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$ ,  $\vec{c}$  沿晶体的对称轴或对称面的法向, 在一般情况下, 它们构成斜坐标系

三个晶轴之间的夹角


$$\begin{aligned}\angle(\vec{b}, \vec{c}) &= \alpha \\ \angle(\vec{c}, \vec{a}) &= \beta \\ \angle(\vec{a}, \vec{b}) &= \gamma\end{aligned}$$

1.三斜晶系:  $a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma$  简单三斜(1)

---

2.单斜晶系:  $a \neq b \neq c$   
 $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$  简单单斜(2) 底心单斜(3)

---

3.三角晶系:  $a = b = c$   
 $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ < 120^\circ$  三角(4)

---

4.正交晶系:  $a \neq b \neq c$   
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$  简单正交(5), 底心正交(6)  
体心正交(7), 面心正交(8)

---

5.四角系:  
(正方晶系)  $a = b \neq c$   
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$  简单四角(9), 体心四角(10)


---

6.六角晶系:  $a = b \neq c$   
 $\alpha = \beta = 90^\circ \quad \gamma = 120^\circ$  六角(11)


---

7.立方晶系:  $a = b = c$   
 $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$  简立方(12), 体心立方(13),  
面心立方(14)







简单三斜  
(1)




简单单斜  
(2)




底心单斜  
(3)




三角  
(4)




简单正交  
(5)




底心正交  
(6)




体心正交  
(7)




面心正交  
(8)




简单四角  
(9)




体心四角  
(10)




六角  
(11)



简立方  
(12)




体心立方  
(13)



面心立方  
(14)

1) 简单三斜

$$a_1 \neq a_2 \neq a_3 \quad \alpha \neq \beta \neq \gamma$$




$$C_1, C_s$$

2) 简单单斜  $a_2 \perp a_1, a_3$


3) 底心单斜  $a_1 \neq a_2 \neq a_3$

$C_2, C_s, C_{2h}$

Simple Monoclinic



Centered Monoclinic



4) 简单正交

5) 底心正交

6) 体心正交


7) 面心正交

$$a_1 \neq a_2 \neq a_3$$


$$a_1 \perp a_2 \perp a_3$$

$$D_2, C_{2v}, D_{2h}$$


Simple Orthorhombic




Centered Orthorhombic



Body Center Orthorhombic



Face Center Orthorhombic




## 8) 三角

$$a_1 = a_2 = a_3$$

$$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ < 120^\circ$$

$$C_3, S_6, D_3, C_{3v}, D_{3d}$$





9) 简单四方 (四角)


$$a_1 = a_2 \neq a_3$$

10) 体心四方 (四角)


$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$

$$C_4, C_{4h}, D_4, C_{4v}, D_{4h}, S_4, D_{2d}$$

Simple Tetragonal



Body Center Tetragonal



## 11) 六角


$$a_1 = a_2 \neq a_3$$

$$a_3 \perp a_1, a_2$$

$$\angle a_1 a_2 = 120^\circ$$

$$C_6, C_{6h}, D_6, C_{3v}$$

$$D_{6h}, C_{3h}, D_{2h}$$





12) 简立方

$$a_1 = a_2 = a_3$$


13) 体心立方

$$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$$


14) 面心立方

$$T, T_h, T_d, O, O_h$$


Simple Cubic




Body Center Cubic



Face Center Cubic




# 7大晶系的形成和转化





## 配位数(CN)---注意是针对原子而不是格点而言

- 最近邻：离某一原子最近的原子，称为该原子的最近邻
- 配位数：晶体中一个原子的最近邻原子数
- 体心立方：配位数是 8




- 面心立方：配位数是 12






配位数是 4



配位数是 6


二维体系最大的  
堆积方式






bcc

**CN=8**




fcc

**CN=12**



hcp

**CN=12**



Diamond

**CN=4**

- 最大配位数：12(密堆积)

- \* 每个原子与同层六个原子相切；

- 上下两层各与三个原子相切

- 不可能的配位数：11、10、9、7、5(因对称)

- \* 因此，可能的配位数是12、8、6、4、3、2

配位数为8：体心，氯化铯型结构

配位数为6：氯化钠型结构

配位数为4：四面体结构

配位数为3：层状结构

配位数为2：链状结构

## § 1.5 晶体的X射线衍射与倒格子

- ◆ X射线衍射是研究晶体结构最有效的手段。
- ◆ 除了X射线衍射外，还有电子衍射（适合薄膜）、中子衍射（研究氢、碳在晶体中的位置）等。
- ◆ 共同特点：波长和晶格常数是同量级（零点几个纳米）



**X射线是由被高电压 $U$ 加速了的电子，打击在“靶极”物质上而产生的一种电磁波。**

$$h\gamma_{\max} = eU \quad h\frac{c}{\lambda_{\min}} = eU$$


$$\lambda_{\min} = \frac{hc}{eU} \approx \frac{1.2 \times 10^3}{U} \text{ (nm)}$$

$$h \approx 6.62 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \quad e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$U = 10^4 \text{ V}, \quad \lambda \sim 0.1 \text{ nm}$$

在晶体衍射中，常取 $U$ --40千伏，所以 $\lambda$ --0.03nm 。

## 电磁波的能量和波长




$$E = h\nu = \hbar \frac{c}{\lambda} \cong \frac{1240}{\lambda} \text{ eV } (\lambda \text{ in unit of nm})$$

◆ X射线？通过光栅观察衍射现象？ ❌


◆ X射线的波长太短，只有一埃（ $1\text{\AA}$ ）

◆ 光栅 $d=3\times 10^4\text{\AA}$ （每mm333条刻痕），无法分辨的

◆ 晶体有规范的原子排列，且原子间距也在埃的数量级，是天然的三维光栅




1912年德国物理学家劳厄想到了这一点，索末菲的助教W.弗里德里奇和伦琴的博士研究生P.克尼平做出了X射线的衍射实验。




劳厄斑证明了X射线的波动性



1913年英国布拉格父子建立了一个公式:布拉格公式-----不但能解释劳厄斑点,而且能用于对晶体结构的研究



劳厄斑正是散射的电磁波的叠加



衍射加强的条件：

$$2d_{h_1h_2h_3} \sin\theta = n\lambda$$


—— 布拉格反射公式



$n$ 为整数，称为衍射级数。

由上式可以看出：

$$\lambda \leq \frac{2d}{n} \quad \lambda \leq 2d$$

不能用可见光进行晶体衍射。





B掺杂金刚石的X射线衍射图

◆ 引入一个新的概念:倒格子

◆ 引入设想: 如果晶格的基矢未知, 只有一些周期性分布的点, 这些点与晶格中的每族晶面对应, 通过对应关系求出未知晶格的基矢, 那么这些点组成的格子就是倒格子

◆ 倒格子并非物理上的格子, 只是一种数学处理方法, 它在分析与晶体周期性有关的各种问题中起着重要作用



假设晶格的原胞基为  $\vec{a}_1$ 、 $\vec{a}_2$ 、 $\vec{a}_3$

原胞体积为  $\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$

建立一个空间，  
其基矢为：

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

由这组基矢构成的格子称为对应于以  $\vec{a}_1$ 、 $\vec{a}_2$ 、 $\vec{a}_3$  为基矢的正格子的倒易格子（简称倒格子）， $\vec{b}_1$ 、 $\vec{b}_2$ 、 $\vec{b}_3$  称为倒格子基矢。

## 例1：简立方格子的倒格子

简立方的基矢： $\bar{a}_1 = a\vec{i}$ ,  $\bar{a}_2 = a\vec{j}$ ,  $\bar{a}_3 = a\vec{k}$

简立方倒格子的基矢： $\bar{b}_1 = \frac{2\pi}{a}\vec{i}$ ,  $\bar{b}_2 = \frac{2\pi}{a}\vec{j}$ ,  $\bar{b}_3 = \frac{2\pi}{a}\vec{k}$

## 例2：二维四方格子，

其基矢为： $\bar{a}_1 = a\vec{i}$      $\bar{a}_2 = 2a\vec{j}$

此时可假设一个垂直于平面的单位矢量 $\bar{a}_3 = \vec{k}$

再计算： $\bar{b}_1$      $\bar{b}_2$

## 1、正格子基矢和倒格子基矢的关系：

$$a_i \cdot b_j = 2\pi \delta_{ij} \quad \left\{ \begin{array}{l} = 2\pi \quad (i=j) \\ = 0 \quad (i \neq j) \end{array} \right.$$

证明如下： $a_1 \cdot b_1 = 2\pi a_1 \cdot (a_2 \times a_3) / a_1 \cdot (a_2 \times a_3) = 2\pi$

因为倒格子基矢与不同下脚标的正格子基矢垂直，有：

$$a_2 \cdot b_1 = 0 \quad a_3 \cdot b_1 = 0$$

## 2、倒格子原胞体积是正格子原胞体积倒数的 $(2\pi)^3$ 倍

$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \quad (\Omega^* = \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) \text{ 为倒格子原胞体积})$$

证明：

$$\Omega^* = \vec{b}_1 \cdot [\vec{b}_2 \times \vec{b}_3] = \frac{(2\pi)^3}{\Omega^3} [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3] \cdot [\vec{a}_3 \times \vec{a}_1] \times [\vec{a}_1 \times \vec{a}_2]$$

利用：  $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = (\vec{A} \cdot \vec{C})\vec{B} - (\vec{A} \cdot \vec{B})\vec{C}$

$$[\vec{a}_3 \times \vec{a}_1] \times [\vec{a}_1 \times \vec{a}_2] = \{[\vec{a}_3 \times \vec{a}_1] \cdot \vec{a}_2\} \vec{a}_1 - \{[\vec{a}_3 \times \vec{a}_1] \cdot \vec{a}_1\} \vec{a}_2 = \Omega \vec{a}_1$$

所以：


$$\Omega^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega^2} [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3] \cdot \Omega \vec{a}_1 = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} [\vec{a}_2 \times \vec{a}_3] \cdot \vec{a}_1 = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$$

### 3、倒格矢 $\vec{K}_h$ 是晶面指数为 $(h_1, h_2, h_3)$ 所对应的晶面族的法线

证明：晶面族  $(h_1, h_2, h_3)$  最靠近原点  $O$  的晶面  $ABC$  在基矢  $a_1, a_2, a_3$  上的截距： $a_1/h_1, a_2/h_2, a_3/h_3$

矢量：

$$\vec{AC} = \vec{OC} - \vec{OA} = \frac{\vec{a}_3}{h_3} - \frac{\vec{a}_1}{h_1}$$
$$\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA} = \frac{\vec{a}_2}{h_2} - \frac{\vec{a}_1}{h_1}$$



$$\vec{K}_h \cdot \vec{AC} = (h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3) \cdot \left( \frac{\vec{a}_3}{h_3} - \frac{\vec{a}_1}{h_1} \right) = 2\pi - 2\pi = 0$$

同理：  $\vec{K}_h \cdot \vec{AB} = 0$


得证！

4、倒格矢  $\vec{K}_h$  与晶面间距  $d_{h_1h_2h_3}$  关系为  $d_{h_1h_2h_3} = \frac{2\pi}{|\vec{K}_h|}$

证明：

因为  $K_h$  垂直于  $ABC$  面，所以面间距：

$$d = \overrightarrow{OA} \frac{\vec{K}_h}{|\vec{K}_h|} = \frac{\vec{a}_1}{h_1} \cdot \frac{h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3}{|\vec{K}_h|} = \frac{2\pi}{|\vec{K}_h|}$$





5、正格矢  $\vec{R}_l$  与倒格矢  $\vec{K}_h$  的关  $\vec{R}_l \cdot \vec{K}_h = 2\pi \cdot \mu$  ( $\mu$ 为整数)

证明:

晶面族  $(h_1 h_2 h_3)$  中离原点距离为  $\mu d_h$  的晶面方程:

$$\vec{x} \cdot \frac{\vec{K}_h}{|\vec{K}_h|} = \mu d_h$$

$X$ 是晶面上任意点的位矢, 对于格点其位移矢为:

$$\vec{R}_l = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3$$

$$\vec{R}_l \cdot \vec{K}_h = 2\pi\mu \quad (\mu \text{为整数})$$



## 推论：

- 1、如果有一矢量与正格矢点乘后等于 $2\pi$ 的整数倍，这个矢量一定是倒格矢。
- 2、如果有一矢量与正格矢点乘后为一个没有量纲的数，这个矢量一定能在倒空间中表示出来。

◆  $\vec{K}_{hkl}$  是密勒指数为  $(h, k, l)$  所对应的晶面族的法线

◆ 
$$|\vec{K}_{hkl}| = \frac{2\pi}{d_{hkl}}$$

◆ 
$$\vec{R}_l \cdot \vec{K}_{hkl} = 2\pi \cdot \mu$$

其中 
$$\vec{R}_l = m\vec{a} + n\vec{b} + l\vec{c}$$

所以倒格矢  $\vec{K}_{hkl}$  可以代表  $(h, k, l)$  晶面

# 晶体结构

## 正格

1.  $\vec{R}_n = n_1 \vec{a}_1 + n_2 \vec{a}_2 + n_3 \vec{a}_3$
2. 与晶体中原子位置相对应；
3. 是真实空间中点的周期性排列；
4. 线度量纲为[长度]

## 倒格

1.  $\vec{K}_n = h'_1 \vec{b}_1 + h'_2 \vec{b}_2 + h'_3 \vec{b}_3$
2. 与晶体中一族晶面对应；
3. 是与真实空间相联系的傅里叶空间中点的周期性排列；
4. 线度量纲为[长度]<sup>-1</sup>