

T D :

Exercice 1. *Vrai ou faux ?*

- a) *Toute partie majorée de \mathbb{R} possède une borne supérieure.*
- b) *Si une partie A de \mathbb{R} possède une borne supérieure M , tout réel inférieur à M appartient à A .*
- c) *La somme de deux irrationnels est un irrationnel.*
- d) *La somme d'un rationnel et d'un irrationnel est un irrationnel.*
- e) *Soit A une partie non vide majorée de \mathbb{R} . A admet un plus grand élément que l'on appelle sa borne supérieure.*
- f) $(a; b; c) \in \mathbb{R}^3$. $|b - a| + |b - c| + |a - c| = 2[\max\{a; b; c\} - \min\{a; b; c\}]$
- g) *Soient I et J deux intervalles de \mathbb{R} . $I \cup J$ est un intervalle.*
- h) *Tout réel possède des approximations rationnelles à 10^{-p} près, quel que soit l'entier p .*

Exercice 2. *Soient x et y deux nombres réels. Démontrer les inégalités suivantes.*

1. $|x| + |y| \leq |x + y| + |x - y|$.
2. $1 + |xy - 1| \leq (1 + |x - 1|)(1 + |y - 1|)$.
3. $\frac{|x + y|}{1 + |x + y|} \leq \frac{|x|}{1 + |x|} + \frac{|y|}{1 + |y|}$.

Exercice 3. *Montrer que :*

1. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \sqrt{a + b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$. *Etudier dans quel cas on a l'égalité.*
2. $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \left| \sqrt{|a|} - \sqrt{|b|} \right| \leq \sqrt{|a - b|}$

Exercice 4.

1. *Les ensembles suivants sont-ils majorés ? minorés ? Si oui, déterminer leur borne inférieure, leur borne supérieure.*

$$A = \{x \in \mathbb{R}; x^2 < 2\} \quad B = \left\{ \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}^* \right\} \quad C = \left\{ \frac{1}{n} - \frac{1}{p}; (p, n) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \right\}$$

2. *On considère la partie de \mathbb{R} suivante :*

$$D = \left\{ \frac{x^2 + 2}{x^2 + 1} \mid x \in \mathbb{R} \right\}$$

Déterminer, s'ils existent, $\sup D$, $\inf D$, $\min D$, $\max D$.

Exercice 5.

Montrer que $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$

Exercice 6. Soit x un nombre réel. On note $E(x)$ la partie entière de x .

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{Z}, \quad E(x) + E(-x) = 0.$
2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}, \quad E(x) + E(-x) = -1$
3. Prouvez que $\forall x, y \in \mathbb{R}$

$$E(x) + E(y) \leq E(x + y) \leq E(x) + E(y) + 1.$$

4. Démontrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$E\left[\frac{E(nx)}{n}\right] = E(x).$$

Exercice 7.

1. Soit la suite de terme général $u_n = \frac{n^3 + 1}{n^3 + n^2 + 2}$
 - a. Trouver un entier N , tel que, si $n \geq N$, on ait $|u_n - 1| < 10^{-2}$.
 - b. Plus généralement, ε étant un nombre réel strictement positif, déterminer un entier N , tel que, si $n \geq N$, on ait $|u_n - 1| < \varepsilon$. Qu'a-t-on démontré pour la suite (u_n) ?
2. En utilisant les définitions, montrer que
 - a. La suite de terme général $u_n = (-1)^n$ est divergente.
 - b. La suite de terme général $v_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$ converge vers 1.
 - c. La suite de terme général $w_n = \frac{n}{n^3 + 1}$ converge vers 0.

Exercice 8. On considère une suite (U_n) définie sur par : \mathbb{N}

$$U_0 = 4 \quad \text{et} \quad U_{n+1} = 2U_n - 3.$$

Soit la suite (V_n) définie sur \mathbb{N} par :

$$V_n = U_n - 3.$$

1. Quelle est la nature de la suite (U_n) ?
2. Montrer que la suite (V_n) est géométrique.
3. Donner l'expression de (V_n) en fonction de n .
4. En déduire l'expression de (U_n) . en fonction de n .
5. Calculer la somme des 11 premiers termes de (U_n) .

Exercice 9. Donner l'expression du terme général des suites récurrentes (u_n) suivantes

1. $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \quad u_0 = 3 \quad u_1 = 5;$

2. $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n \quad u_0 = 1 \quad u_1 = 0;$
3. $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n \quad u_0 = 1 \quad u_1 = 2.$

Exercice 10. Trois suites, u , v , et w sont définies de la manière suivante sur \mathbb{N}^* .

$$u \begin{cases} u_1 = 1 \\ n > 1 : u_{n+1} = \frac{1}{3}(u_n + 2v_n) \end{cases} \quad v \begin{cases} v_1 = 12 \\ n > 1 : v_{n+1} = \frac{1}{4}(u_n + 3v_n) \end{cases}$$

$$w : \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad w_n = u_n - v_n.$$

1. Démontrer que w est une suite géométrique convergente à termes négatifs;
2. Démontrer que u et v sont adjacentes ;
3. On considère la suite t définie, pour tout n par

$$t_n = 3u_n + 8v_n.$$

Démontrer que t est constante. Est elle convergente ?

4. Démontrer que u et v ont la même limite. Trouver cette limite.

Exercice 11. Dans chacun des cas ci-dessous, trouver une suite simple équivalente à la suite (a_n) dont on donne le terme général. En déduire si elle possède une limite.

$$a) \frac{2n^2 - n - 10}{n^3 + n + 2} \quad b) \sqrt{n^3 + 5n^2} - \sqrt{n^3 + n} \quad c) \frac{n! + n^n}{n^{n+2} + 3^n}$$

Exercice 12.

1. En utilisant la définition, montrer que :
 - (a) $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0.$
 - (b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(x-1)^4} = +\infty.$
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^{-x}}{\sin 5x}$ en utilisant la règle de l'Hospital.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x) - \sin(3x)}{\ln(1+x)}.$
4. Montrez que la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ n'est pas uniformément continue sur $]0, +\infty[.$
5. Montrez que la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2$ est uniformément continue sur $]0, 1[.$

Exercice 13.

1. Enoncer le théorème de Rolle et le théorème l'inégalité des accroissements finis.
2. En utilisant le théorème de Rolle, montrer qu'entre deux solutions réelles de $e^x \sin(x) = 1$, il existe au moins une solution réelle de $e^x \cos(x) = -1.$
3. Montrer pour tout $x > 0$ que $\frac{1}{2\sqrt{x+1}} \leq \sqrt{x+1} - \sqrt{x} \leq \frac{1}{2\sqrt{x}}.$

4. Montrer que $x_0 = -\frac{7}{2}$ est un minimum local de la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = x^2 + 7x + 3$.

Exercice 14.

- Donner l'ensemble de définition et la fonction dérivée de la fonction \arctan .
- Soit f une application définie sur \mathbb{R}^+ à valeurs dans \mathbb{R} et dérivable sur \mathbb{R}^+ . On suppose que f' est strictement décroissante sur \mathbb{R}^+ , et que

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, \quad f'(x) \geq 0.$$

- Démontrer que $\forall x \in [1; +\infty[, f(x+1) - f(x) < f'(x)$.
(On pourra appliquer l'inégalité des accroissements finis sur $[x, x+1]$)
 - Démontrer que $\forall x \in [1; +\infty[, f'(x) < f(x) - f(x-1)$.
3. Soit (s_n) la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad s_n = \sum_{k=1}^n f'(k).$$

- Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(n+1) - f(1) < s_n < f(n) - f(0)$.
 - En déduire que la suite (s_n) converge si et seulement si il existe un réel l tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x) = l$.
4. Application : Etudier la convergence de la suite (u_n) définie par

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k^2}.$$

Exercice 15.

1. Déterminer les réels a, b et c tels que la fonction f définie ci-dessous soit de classe C^2 sur \mathbb{R} .

$$f(x) = \begin{cases} e^x & \text{si } x \leq 0 \\ ax^2 + bx + c & \text{si } x > 0. \end{cases}$$

2. Soient a et b deux réels tels que $a < b$. Soient f et g deux fonctions définies sur $[a, b]$, dérivables sur $]a, b[$. On suppose que g' ne s'annule pas sur $]a, b[$.
- (a) Montrer que le théorème de Rolle s'applique à la fonction

$$x \mapsto (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x).$$

- (b) En déduire qu'il existe un point $c \in]a, b[$ tel que :

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

3. On prend 100 comme valeur approchée de $\sqrt{10001}$. À l'aide du théorème des accroissements finis, majorer l'erreur commise.

Exercice 16.

1. Montrer que $\forall x \in [-1; 1], \arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$. (on pourra étudier les variations de la fonction $f : x \mapsto \arcsin(x) + \arccos(x)$).
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{2} + \arctan(x) - \arcsin(x)}{\frac{x^3}{2} + x(\cos(x) - 1)}$

Exercice 17.

Soit f la fonction d'une variable réelle définie par :

$$f(u) = \frac{3 + 4 \operatorname{sh}(u)}{\operatorname{ch}(u)}.$$

1. Préciser son ensemble de définition.
2. Préciser ses limites quand u tend vers $+\infty$ et $-\infty$.
3. Étudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.
4. Tracer le graphe de f .

Exercice 18.

Étudier la convexité des fonctions suivantes :

1. $f : x \mapsto x(x - 1)(x - 4)$.
2. *cosinus*.