

Processamento digital de imagens

Agostinho Brito

Departamento de Engenharia da Computação e Automação
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

28 de abril de 2016

Análise de componentes principais

- A análise de componentes principais, ou transformada de Karhunen-Loève, ou transformada de Hotelling, realiza uma transformação ortogonal em um conjunto de variáveis correlacionadas (interdependentes) em um outro conjunto de variáveis linearmente descorrelacionadas.
- Dá-se o nome de “componentes principais” porque no espaço transformado, as primeiras componentes concentram a maior parte da informação presente nos dados originais.

- Seja $\bar{x} = [x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]^T$ um vetor representante de uma população de dados com n-dimensional.
- Define-se o vetor de média e a matriz de covariância dessa população como

$$\bar{m}_x = Ex \quad C_x = E(x - \bar{m}_x)(x - \bar{m}_x)^T$$

- Para uma amostra de M elementos, a média e covariância da população podem ser aproximadas por

$$\bar{m}_x = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \bar{x}_k \quad C_x = \frac{1}{M} \sum_{k=1}^M (\bar{x}_k \bar{x}_k^T) - \bar{m}_x \bar{m}_x^T$$

- Ex: $\bar{x}_1 = (0, 0, 0)^T$, $\bar{x}_2 = (1, 0, 0)^T$, $\bar{x}_3 = (1, 1, 0)^T$ e $\bar{x}_4 = (1, 0, 1)^T$.

$$\bar{m}_x = [3 \ 1 \ 1]^T \quad C_x = \frac{1}{16} \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

- A matriz C_x é real e simétrica. Logo, possui autovalores reais e distintos $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, n$, com seus respectivos autovetores \bar{e}_i associados.
- Assuma que estes autovalores são arranjados na ordem decrescente de valor, tais que $\lambda_j \geq \lambda_{j+1}$ para $j = 1, 2, \dots, n - 1$.
- Construa uma matriz A , onde cada linha contenha autovetores unitários associados com os autovalores da matriz C_x . A primeira linha de C_x deve conter o autovetor associado com o maior autovalor, restando na última linha o autovetor associado com o menor autovalor.
- A transformação

$$\bar{y} = A(\bar{x} - \bar{m})$$

é denominada de transformada de Hotelling. A população de vetores transformados possui média igual a zero. Sua matriz de covariância é diagonal, preenchida pelos autovalores da matriz C_x na ordem decrescente de seus valores.