

作业二

姓名胡毅翔 学号 PB18000290 日期 2021年5月29日

第一题 本题考虑使用Richardson外推技术提高向前差商求给定函数导数的精度。

- (a) (5分) 使用向前差分计算 $f(x) = \sin(x)$ 在 $x = 1.2$ 处的导数并使用loglog图展示其精度随离散区间大小 h 的变化。 h 取 $10^0, 10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}, \dots, 10^{-15}$ 。

解：

本题的MATLAB程序显示如下：

```
1 clear,clc
2
3 syms x;
4 F = @(x) sin(x);
5 result = [0:15];
6 h_l = result;
7 tmp = cos(1.2);
8 f = F(1.2);
9
10 for i = 0:15
11     h = 10^(-i);
12     h_l(i + 1) = h;
13     result(i + 1) = abs((F(1.2 + h) - f) / h - tmp);
14 end
15
```

```
16 | loglog(h_l, result);
```

程序运行输出结果为：




图 1: 向前差分精度随离散区间大小h的变化情况

- (b) (10分) 推导出使用Richardson外推技术的向前差商的计算公式并用伪代码给出算法。

解：

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + \frac{h^2}{2!}f''(x_0) + \frac{h^3}{3!}f'''(x_0) + \frac{h^4}{4!}f^{(4)}(x_0) + O(h^5) \quad ((2)-(1))/2$$

得

$$f'(x_0) = \frac{1}{h} [f(x_0 + h) - f(x_0)] + \frac{h}{2}f^{(2)}(x_0) + O(h^3)$$

记

$$N_1(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

$$f'(x_0) = N_1(h) + \frac{h}{2}f^{(2)}(x_0) + O(h^2)$$

$$f'(x_0) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{h}{2}\right)f^{(2)}(x_0) + O(h^2)$$

$$f'(x_0) = \frac{1}{2-1} \left(2N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h) \right) + O(h^2) \approx N_2(h)$$

$$N_2(h) = N_1\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_1\left(\frac{h}{2}\right) - N_1(h)}{2-1}$$

继续外推下去, 得到

$$N_j(h) = N_{j-1}\left(\frac{h}{2}\right) + \frac{N_{j-1}\left(\frac{h}{2}\right) - N_{j-1}(h)}{2^{j-1} - 1}, \quad j = 2, 3, \dots$$

伪代码如下：

Algorithm 1 Forward Difference Quotient with Richardson Extrapolation

Input: h : initial value of h ;

$maxrept$: the maximum number of iterations;

ε : error size;

Output: $f'(x_0)$: the estimated value which is closest to $f'(x_0)$;

$errormessage$: if the input cannot be resolved by algorithm;

```
1:  $A.length \leftarrow 2$ ;
2:  $A[1] \leftarrow N_1(h)$ ;
3:  $A[2] \leftarrow N_1(\frac{h}{2})$ ;
4:  $tmp \leftarrow 2A[2] - A[1]$ ;
5: while  $|tmp - A[1]| \geq \varepsilon$  and  $A.length \leq maxrept$  do
6:    $A[1] \leftarrow tmp$ ;
7:    $A.length \leftarrow A.length + 1$ ;
8:    $A[A.length] \leftarrow N_1(\frac{h}{2^{A.length-1}})$ ;
9:   for  $i = 1$  to  $A.length - 2$  do
10:     $A[A.length - i] \leftarrow A[A.length - i + 1] + \frac{A[A.length - i + 1] - A[A.length - i]}{2^i - 1}$ ;
11:   end for
12:    $tmp \leftarrow A[2] + \frac{A[2] - A[1]}{2^{A.length-1} - 1}$ ;
13: end while
14: if  $A.length > maxrept$  then
15:   error message;
16: else
17:   return  $tmp$ ;
18: end if
```

- (c) (5分) 使用你的算法计算 $f(x) = \sin(x)$ 在 $x = 1.2$ 处的导数并使用semilogy图展示其精度随外推次数变化的情况。请自己选取 h 初始值，使得用外推方法能够算出的最精确的导数尽量精确。你的回答需要说明你使用外推方法算出的导数值是多少、误差又是多少、 h 的初始值是多少、外推了多少次。

解：

本题的MATLAB程序显示如下：

```
1 clear,clc,close all
2
3 syms x;
4 F = @(x)sin(x);
```

```

5 maxrept = 50;
6 a = cos(1.2);
7
8 for i = 0:15
9     h = 10^(-i);
10
11     for k = -15:-5
12         epslion = 10^(k);
13         A(1) = N(h);
14         A(2) = N(h / 2);
15         tmp = 2 * A(2) - A(1);
16
17         if i == 0
18             B(1) = abs(N(h) - a);
19             B(2) = abs(tmp - a);
20         end
21
22         while abs(tmp - A(1)) >= epslion && length(A)
23             <= maxrept
24
25                 A(1) = tmp;
26                 A(length(A) + 1) = N(h / (2^(length(A) -
27                     1)));
28
29                 for j = 1:length(A) - 2
30                     A(length(A) - j) = A(length(A) - j +
31                         1) + (A(length(A) - j + 1) - A(
32                             length(A) - j)) / (2^j - 1);
33                 end
34
35                 tmp = A(2) + (A(2) - A(1)) / (2^(length(A)
36                     ) - 1) - 1);
37
38                 if i == 0
39                     B(length(A)) = abs(tmp - a);

```

```

35         end
36
37     end
38
39     if length(A) <= maxrept && abs(tmp) > epslion
40         X = sprintf('h:10^%d tmp:%.15f epslion
                     :10^%d n:%d delta:%.15f', -i, tmp, k,
                     length(A), abs(tmp - a));
41         disp(X)
42         break;
43     end
44
45     if i == 0
46         B = [];
47     end
48
49     A = [];
50 end
51
52 end
53
54 semilogy(1:length(B), B);
55
56 function result = N(h)
57     syms y;
58     F = @(y)sin(y);
59     result = (F(1.2 + h) - F(1.2)) / h;
60 end

```

程序运行的输出结果为：

```

1 h:10^0 tmp:0.362357754476664 epslion:10^-13 n:12
  delta:0.0000000000000010
2 h:10^-1 tmp:0.362357754478041 epslion:10^-11 n:11
  delta:0.0000000000001367
3 h:10^-2 tmp:0.362357754474414 epslion:10^-11 n:11
  delta:0.0000000000002260

```

4	h:10 ⁻³ tmp:0.362357754498787 epslion:10 ⁻¹⁰ n:10 delta:0.000000000022113
5	h:10 ⁻⁴ tmp:0.370652071522364 epslion:10 ⁻¹¹ n:34 delta:0.008294317045690
6	h:10 ⁻⁵ tmp:0.362357755880015 epslion:10 ⁻⁸ n:8 delta :0.000000001403341
7	h:10 ⁻⁶ tmp:0.362357759856709 epslion:10 ⁻⁸ n:7 delta :0.000000005380035
8	h:10 ⁻⁷ tmp:0.362357752692333 epslion:10 ⁻⁷ n:2 delta :0.000000001784341
9	h:10 ⁻⁸ tmp:0.362357777117239 epslion:10 ⁻⁷ n:2 delta :0.000000022640566
10	h:10 ⁻⁹ tmp:0.362358032468535 epslion:10 ⁻⁶ n:2 delta :0.000000277991861
11	h:10 ⁻¹⁰ tmp:0.362359031782951 epslion:10 ⁻⁸ n:6 delta:0.000001277306278
12	h:10 ⁻¹¹ tmp:0.362376795219604 epslion:10 ⁻⁸ n:7 delta:0.000019040742931
13	h:10 ⁻¹² tmp:0.362376783868240 epslion:10 ⁻⁶ n:6 delta:0.000019029391566
14	h:10 ⁻¹⁵ tmp:0.444089209850063 epslion:10 ⁻¹⁵ n:2 delta:0.081731455373389

其中 h 为初始值， tmp 为算出的导数值， $epslion$ 为设置的误差限， n 为外推次数， $delta$ 为计算的结果与MATLAB计算的在 $x = 1.2$ 处的导数值 $\cos(1.2)$ 的差值。

故选取 h 初始值为 10^0 ，算出的导数值为0.362357754476664，误差为0.0000000000000010，外推了12次，得到的semilogy图为：




图 2: 精度随外推次数变化情况 ($h=0$)

第二题 本题讨论使用复化梯形公式求周期函数的积分。

(a) (10分) 证明当 r 不是 m 的整倍数的情况下, 使用 m 个子区间的复化梯形公式可以精确积分

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(rx) dx \text{ 和 } \int_{-\pi}^{\pi} \sin(rx) dx$$

注意: 这一结论类似于课堂上我们定义的代数精度。同时说明如果 r 为 m 的整倍数时复化梯形公式对于上面两个积分会给出怎样的结果。

解:

记 $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$, 则

$$|E_n(f)| \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2 = O\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

对于任给的误差控制小量 $\varepsilon > 0$,

$$\frac{(b-a)^3}{12n^2} M_2 < \varepsilon \quad \text{或} \quad n \geq \left\lceil \sqrt{\frac{(b-a)^3 M_2}{12\varepsilon}} \right\rceil + 1$$

又因

$$\cos''(rx) = -r^2 \cos(rx)$$

$$\sin''(rx) = -r^2 \sin(rx)$$

故有 $M_2 = r^2$, 则 r 为 m 的整数倍 ($r = km$) 时,

$$\frac{(2\pi)^3}{12m^2} k^2 m^2 = \frac{(2\pi)^3}{12} k^2 > \varepsilon$$

若 r 不是 m 的整数倍，则存在 m ，使得

$$m \geq \left\lceil \sqrt{\frac{(2\pi)^3 r^2}{12\varepsilon}} \right\rceil + 1$$

就有 $|E_n(f)| < \varepsilon$ ，便可使用 m 个子区间的复化梯形公式精确积分。

- (b) (10分) 由于任意的以 2π 为周期的周期函数都可以表示为由正弦与余弦函数的线性组合，所以上一问中所证明的定理实际上告诉我们求解一个周期函数的积分的有效方法正是复化梯形公式。现使用复化梯形公式和不同数量的子区间个数来求 $f(x) = e^{\cos(x)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的积分，并用这个函数的真实积分值作为参照使用semilogy图画出随着子区间数量 m 变化所得到的积分精度的变化。

题后语：复化梯形公式之于周期函数的积分如同Gauss积分公式之于非周期函数的基于多项式的积分。因此复化梯形公式是最有效的求解周期函数积分的方法。

解：

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{\cos(x)} dx = 2\pi I_0(1) \approx 7.95492652101284527451$$

本题的MATLAB程序显示如下：

```
1  clc, clear, close all
2  syms x;
3  F = @(x) exp(cos(x));
4  maxrept = 50;
5  r = 7.95492652101284527451;
6
7  for i = 2:maxrept
8      h = 2 * pi / i;
9      S = F(-pi) / 2 + F(pi) / 2;
10
11     for j = 1:i - 1
12         S = S + F(-pi + j * h);
13     end
14
15     S = S * h;
16     T(i - 1) = abs(S - r);
17 end
18
```



```
19 semilogy([2:maxrept], T);
```

程序运行的输出结果为：




图 3: 积分精度随子区间数 m 变化情况

其中未显示的点，表示在机器精度限制下差值为0。

第三题 (a) (10分) 推导出如下格式的多步法公式:

$$y_{n+1} = y_{n-1} + \alpha f_{n+1} + \beta f_n + \gamma f_{n-1} \quad (1)$$

(b) (10分) 推导此格式的局部截断误差，并由此指明此格式的阶数。

(c) (10分) 选取合适的步长值，用此格式在 $[0, 2]$ 上解如下的初值问题:

$$y' = xe^{-4x} - 4y, \quad y(0) = 0 \quad (2)$$

使用你刚刚推导出的格式??，并利用二阶Runge-Kutta方法(即课本公式(7.15))起步。画出解函数。

(d) (10分) 推导出 ??的精确解。对比该精确解在 $x = 2$ 这一点的值，用log-log图展示所用方法的阶数，并给出解释。