

Analiza błędów

Reprezentacja liczb

$x = smB^c$ ,  $s$  - znak,  $1 \leq m < B$  - mantysa,  $c$  - cecha  
**Def.**  $t$  - długość mantysy,  $u = 2^{-t-1}$  - precyzja arytmetyki  
Błąd zaokrąglenia w górę:  $|rd(x) - x| \leq 2^{-t-1}2^c$ ,  
 $\frac{|rd(x) - x|}{|x|} \leq \frac{u}{1+u} < u$   
Zbiór reprezentacji arytmetyki:  $X_{fl} = rd(X) = \{rd(x) : x \in X\}$

**Tw.** Jeśli  $|\alpha_i| \leq u, |\rho_i| = 1, nu < 1$ , to  $\prod_{i=1}^n (1+\alpha_i)^{\rho_i} = 1+\theta_n$ , gdzie  $|\theta_n| \leq \frac{nu}{1-nu}$ .

**Tw.** Jeśli  $|\alpha_i| \leq u, nu < 0.01$ , to  $\prod_{i=1}^n (1+\alpha_i) = 1+\theta_n$ , gdzie  $|\theta_n| \leq 1.01nu$ .

**Def.** Zadanie jest **źle uwarunkowane**, jeśli niewielkie względne zmiany danych powodują duże względne zmiany wyniku. Wielkości charakteryzujące wpływ zaburzeń danych na zaburzenie wyniku to **wskaźniki uwarunkowania**:  
 $|\frac{f(x+h)-f(x)}{f(x)}| \approx |\frac{xf'(x)}{f(x)}| |\frac{h}{x}|$   
**Def.** Niech  $\tilde{y}$  - wynik algorytmu obliczającego  $f(x)$ . Jeśli dla małych  $\Delta x, \Delta y$  mamy  $\tilde{y} + \Delta y = f(x + \Delta x)$ , tzn. wynik jest lekko zaburzony dla lekko zaburzonych danych, to algorytm jest **numerycznie poprawny**.  
Jeśli  $\tilde{y} = f(x + \Delta x)$  (wynik dokładny dla lekko zaburzonych danych), to algorytm jest **numerycznie bardzo poprawny**.

Interpolacja

Postacie wielomianów interpolacyjnych

**Lagrange’a:**  $L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \lambda_k, gdzie \quad \lambda_k = \frac{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x - x_j)}{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x_k - x_j)}$

**Barycentryczna:** Dla  $\sigma_k = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{1}{x_k - x_j}$

$$L_n(x) = \begin{cases} \sum_{k=0}^n \frac{\sigma_k}{x - x_k} y_k \Big/ \sum_{k=0}^n \frac{\sigma_k}{x - x_k} & \text{gdy } x \notin \{x_0, x_1, \dots, x_n\} \\ wpp. & \end{cases}$$

Reszta wielomianu interpolacyjnego

$$f(x) - L_n(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi_x) p_{n+1}(x)$$
$$\max_{-1 \leq x \leq 1} |f(x) - L_n(x)| = \frac{1}{(n+1)!} \max_{-1 \leq x \leq 1} |f^{(n+1)}(x)| \max_{-1 \leq x \leq 1} |p_{n+1}(x)|$$

Spline

**naturalna:**  $s''(a) = 0 \wedge s''(b) = 0$   
**zupelna:**  $s'(a) = f'(a) \wedge s'(b) = f'(b)$   
**okresowa:**  $s'(a) = s'(b) \wedge s''(a) = s''(b)$

**Fakt:**  $\int_a^b \left(s''(x)\right)^2 dx = \sum_{k=1}^{n-1} (f[x_k, x_{k+1}] - f[x_{k-1}, x_k]) s''(x_k)$

$\lambda_k M_k + 2M_k + (1 - \lambda_k)M_{k-1} = 6 * f[x_{k-1}, x_k, x_{k+1}]$   
 $(k = 1, ..., n - 2)$  oraz  $\lambda_k = h_k / (h_k + h_{k+1})$  oraz  $h_k = x_k - x_{k-1}$

Wielomiany Bernsteina

**Def.**  $B_i^n(u) = \binom{n}{i} u^i (1-u)^{n-i}$   
**Własności:**

- $\sum_{i=0}^n B_i^n(u) = 1$
- $B_i^n(u) > 0$
- $B_i^n(u) = (1-u) * B_{i-1}^{n-1}(u) + u B_{i-1}^{n-1}(u)$
- $B_i^n(u) = \frac{n+1-i}{n+1} B_i^{n+1}(u) + \frac{i+1}{n+1} B_{i+1}^{n+1}(u)$
- $\left(B_i^n(u)\right)' = n \left(B_{i-1}^{n-1} - B_i^{n-1}\right)$

Wielomiany Ortogonalne

Czebyszew I rodzaju

$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x$   
 $T_n(x) = 2x T_{n-1}(x) - T_{n-2}(x)$   
 $T_k(x) = \cos(k \arccos x), \quad x \in [-1, 1]$   
zera  $T_{n+1} \quad (k = 0, 1, \dots, n): \quad t_k = \cos\left(\frac{2k+1}{2n+2}\pi\right)$   
ekstrema  $T_n : \quad u_k = \cos\left(\frac{k}{n}\pi\right)$

waga:  $p(x) = (1-x^2)^{-1/2}$

$$\int_{-1}^1 p(x) T_k(x) T_l(x) dx = 0 \quad (k \neq l)$$
$$\int_{-1}^1 p(x) (T_k(x))^2 dx = \begin{cases} \pi/2 & \text{gd}y \ k = 0 \\ \pi & \text{gd}y \ k \geq 1 \end{cases}$$

Normy

Wektorowe

$\|\mathbf{x}\|_p = \left(|x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_n|^p\right)^{1/p}, \quad \|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{|x_i|\right\}$   
Norma musi spełniać 3 warunki:  
 $\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0; \quad \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|; \quad \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

Macierzowe

$$\|\mathbf{A}\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_i |a_{ij}|, \quad \|\mathbf{A}\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_j |a_{ij}|,$$
$$\|\mathbf{A}\|_p = \max_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\|\mathbf{Ax}\|_p}{\|\mathbf{x}\|_p}.$$
$$\|\mathbf{A}\|_E = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{i,j}|^2} \text{ (euklidesowa/Frobeniusa)}$$
$$\|\mathbf{A}\|_2 = \sqrt{\rho(\mathbf{A}^T \mathbf{A})} \text{ (spektralna, } \rho(X) = \max |\lambda(X)|)$$

Aproksymacja

Normy, iloczyn skalarny, błąd

$$\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a,b]} |f(x)|, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b p(x) f^2(x) dx}$$
$$\langle f, g \rangle := \int_a^b p(x) f(x) g(x) dx, \quad \sqrt{\langle f, f \rangle} = \|f\|_2$$
$$E_n(f) := \inf_{W \in \Pi_n} \|f - W_n\|_\infty^T$$

Wielomian optymalny

$$w_n^* = \sum_{k=0}^n \frac{\langle f, P_k \rangle}{\langle P_k, P_k \rangle} P_k, \quad \|f - w_n^*\|_2 = \sqrt{\|f\|_2^2 - \sum_{k=0}^n \frac{\langle f, P_k \rangle^2}{\langle P_k, P_k \rangle}}$$

Wielomiany ortogonalne

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x - c_1, \quad P_k(x) = (x - c_k) P_{k-1}(x) - d_k P_{k-2}(x)$$
$$c_k = \frac{\langle x P_{k-1}, P_{k-1} \rangle}{\langle P_{k-1}, P_{k-1} \rangle}, \quad d_k = \frac{\langle P_{k-1}, P_{k-1} \rangle}{\langle P_{k-2}, P_{k-2} \rangle},$$

Kwadratury interpolacyjne

$$I_p(f) = \int_a^b p(x) f(x) dx \approx \sum_{k=0}^n A_k f(x_k),$$

**Wiel. węzłowy:**  $\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n)$

Kwadratury Newtona-Cotesa

$h = (b - a)/n, \quad x_k = a + kh$

**Wzór trapezów:**  $n = 1, \ A_0 = A_1 = h/2, \ R_1(f) = -\frac{h^3}{12}f''(\xi)$

**Wzór Simpsona:**  $n = 2, A_0 = A_2 = h/3, \ A_1 = 4h/3, \ R_2(f) = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$

**Zł. wzór trapezów:**  $T_n = h \sum_{k=0}^n {}'' f(x_k), \ R_n^T(f) = -\frac{h^3n}{12}f''(\xi)$

**Zł. wzór Simpsona:**  $n = 2m, \ S_n(f) = (4T_n - T_m)/3$

$R_n^S(f) = -(b-a)\frac{h^4}{180}f^{(4)}(\xi)$

**Metoda Romberga:**  $h_k = (b-a)/2^k$

$x_i^{(k)} = a + ih_k, (i = 0, 1, \dots, 2^k), \quad T_{0k} = T_{2^k}(f)$

$T_{mk} = \frac{4^m T_{m-1,k+1} - T_{m-1,k}}{4^m - 1}$

**Reszta Newtona-Cotesa:**

$$I_p(f) - Q_n(f) = \begin{cases} \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \int_a^b \omega(x) dx & \text{gdy } n = 1, 3, \dots \\ \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \int_a^b x\omega(x) dx & \text{gdy } n = 2, 4, \dots \end{cases} \quad \text{gdzie } \xi \in (a, b).$$

Kwadratury Gaussa

$x_k$  - zera wiel. orto.  $P_{n+1}(x), c_k$  wsp. wiod.  $P_k$

$\lambda_k(x) = \omega(x)/[\omega'(x_k)(x - x_k)]$ .

$0 < A_k = \int_a^b p(x)\lambda_k(x)dx = \frac{c_{n+1}}{c_n} \frac{||P_n||^2}{P'_{n+1}(x_k)P_n(x_k)}.$

$R_n(f) = \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(2n+2)!c_{n+1}^2} \int_a^b p(x)[P_{n+1}(x)]^2 dx$

Gauss-Czebyszew

$\int_{-1}^1 p(x)f(x)dx \approx \int_{-1}^1 p(x)I_n(x)dx$

$I_n(x) = \sum_{i=0}^n {}'\alpha_i T_i(x), \alpha_i = \frac{2}{n+1} \sum_{i=0}^n f(t_k)T_i(t_k)$

$Q_n^{QC}(f) = \sum_{k=0}^n A_k f(t_k), A_k = \frac{\pi}{n+1}$

Gauss-Lobatto

$x_k = u_k = \cos\left(\frac{k}{n}\pi\right)$

$\int_{-1}^1 p(x)f(x)dx \approx \int_{-1}^1 p(x)J_n(x)dx$

$J_n(x) = \sum_{j=0}^n {}''\beta_j T_j(x), \beta_j = \frac{2}{n} \sum_{k=0}^n {}''(u_k)T_j(u_k)$

$Q_n^L(f) = \sum_{k=0}^n {}''A_k f(u_k), A_k = \frac{\pi}{n}.$

Algebra numeryczna

Metody iteracyjne

$x^{(k+1)} = B_\tau x^{(k)} + c \quad (k \geqslant 0)$

**Tw.** Metoda iter. jest zbieżna dla dowolnego  $x^{(0)}$ , jeśli  $\rho(B) < 1$ , gdzie  $\rho(B) := \max_{1 \leqslant i \leqslant n} (\lambda_i)$  to promień spektralny macierzy B.

**Metoda Richardsona:**  $B_\tau = I - \tau A, \quad c = \tau b$

**Tw.** Załóżmy, że wszystkie  $\lambda_i$  spełniają:  $0 < \alpha \leqslant \lambda_i \leqslant \beta$ . Wtedy metoda Richardsona jest zbieżna dla  $0 < \tau < \frac{2}{\beta}$ .

**Metoda Jacobiego:**  $B_J = -D^{-1}(L + U)$

**Tw.** Jeśli A jest macierzą ze ściśle dominującą przekątną, tj.

$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}|$ , to wtedy  $\|B_J\|_\infty < 1$  i  $\|B_S\|_\infty < 1$ .

**Metoda Gaussa-Seidela:**  $B_S = -(D + L)^{-1}U$

**Tw.** Jeśli A jest symetryczna i dodatnio określona, to  $\|B_S\|_\infty < 1$ .

$B_\omega = (I - \omega M)^{-1}(\omega N + (1 - \omega)I), \quad M = -D^{-1}L, N = -D^{-1}U$

Teoretycznie przydatne wzory

**Nierówność Cauchy’ego-Schwarza:**  $\left(\sum_{k=1}^n a_k b_k\right)^2 \leqslant \left(\sum_{k=1}^n a_k^2\right)\left(\sum_{k=1}^n b_k^2\right)$

**Inaczej:**  $\langle v, w \rangle \leqslant \|v\|_2 \cdot \|w\|_2$

**Bairstowa:**  $p(z) = a_n z^n + \dots + a_0$  **Związek:**  $b_k = a_k + ub_{k+1} + vb_{k+2}$

Niech ciąg  $a_k$  będzie zbieżny do g. Jeśli istnieją takie liczby rzeczywiste  $p$  i  $C$  ( $C > 0$ ), że  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1} - g|}{|a_n - g|^p} = C$ , to  $p$  jest **wykładnikiem zbieżności ciągu**, a  $C$  – **stałą asymptotyczną błędu**. Dla  $p = 1$  oraz  $0 < C < 1$  zbieżność jest liniowa, dla  $p = 2$  – kwadratowa, dla  $p = 3$  – sześcienna. gdy  $p = 1$  i  $C = 1$  - zbieżność podliniowa, jeśli  $p = 1, C = 0$  - nadliniowa.

$\sin x \pm \sin y = 2 \sin \frac{x \pm y}{2} \cdot \cos \frac{x \mp y}{2}$

$\cos x + \cos y = 2 \cos \frac{x + y}{2} \cdot \cos \frac{x - y}{2}$

$\sin(x \pm y) = \sin x \cdot \cos y \pm \cos x \cdot \sin y$

$\cos(x \pm y) = \cos x \cdot \cos y \mp \sin x \cdot \sin y$

$\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x + y}{2} \cdot \sin \frac{x - y}{2}$